

痢

嘔吐

噎膈

飢逆

吞酸

嘈雜

噯氣

痞滿

腫脹


積聚

虛損

勞極

醫問學正傳

卷之三





新刊京板校正大字醫學正傳卷之三目錄

於本

○痢門十七

論

脉法

丹溪方法

凡三十四條

清六九

溫六九

固湯九

芍藥湯

黃芩芍藥湯

黃連湯

芍藥黃連湯

大黃湯

香連丸

益元散

神効三香散

丹溪活套

祖傳和中飲

經驗三根飲

經驗二防飲

禁口痢法

已試醫驗一條

嘔吐門十八

論

脉法

丹溪方法九十一條

藿香安胃散

和中桔梗湯

木香散

荆黃湯

檳榔散

清鎮丸

白朮湯

金花丸

紫沉丸

小半夏湯

姜汁半夏湯

藿香平胃散

胃苓湯

黃連六一湯

丁香安胃湯

丁附治中湯

加味三陳湯

丁香女胃湯

茯苓半夏湯

丹溪活套

已試醫驗一條

○噎膈門十九

脉法

丹溪方法凡十六條

瓜蒌安寶丸 寬中湯 人參利膈丸 丹溪活套

祖傳經秘方 經驗大力套命丸 已試醫驗一條

○飢逆門二十論 脈法 丹溪方法凡六條

陳皮竹茹湯 橘皮半夏生姜湯 丹溪活套

已試醫驗一條

○吞酸二十一論 脈法 丹溪方法凡七條

萊菔丸 參萸丸 藿香胃散 加減二陳湯

三因麴朮丸 祖傳經驗治吞酸方

○嘈雜噯氣二十二論 脈法 丹溪方法凡八條

三聖丸

○痞滿門二十三 脈法 丹溪方法凡二條

厚朴溫中湯 木香煨氣湯 七氣湯

大消痞丸 失咲丸 消痞湯

黃芩利膈丸

丹溪活套

已試醫驗一條

○腫脹門二十四

論 脉法

丹溪方法 凡八條

禹餘糧丸

繫矩三和湯

紫蘇子湯

木香順氣湯

中滿分消丸

廣木潰堅湯

半夏厚朴湯

破滯氣湯

草苴蔻湯

葶藶木香散

白朮木香散

葶藶膏

二氣散

牽牛丸

三花神祐丸

雞屎醴飲

丹溪活套

祖傳雞屎醴

又經驗方

經驗桃奴丸

自己試醫驗二條

○積聚門二十五

論

脉法

丹溪方法 凡六條

三聖膏

琥珀膏

阿魏丸

大中丸

小溫中丸

婦人腹中有塊說

一方治婦人血塊

又治婦人血塊如盤

塊在皮裏膜外方

倒倉法 已試醫驗

廣木潰堅湯

半夏厚朴湯

三因散聚湯

大七氣湯

千金硝石丸

局方妙香丸

導氣枳壳丸

木香三稜丸

草薢薏苡丸

肥氣丸 伏梁丸

痞氣丸

息奔丸

奔豚丸

○虛損門二十六

論 脉法

丹溪方法一條

老人調養方

四君子湯

四物湯 八物湯

六君子湯

十全大補湯

大補陰丸 補陰丸

加味虎潛丸

滋陰大補丸

補腎丸 補天丸

六味地黄丸

人參固本丸

人參膏 補中益氣湯

益胃升陽湯

濟生芪附湯

參附湯 濟生芪神湯

補氣湯

千金延壽丹

斑龍丸 加減桂枝湯

祖傳經驗方

金儒元傳

鄒長教傳

已試鑒驗一條

○勞極門二十七

論

脉法

丹溪方凡四條

二十四味蓮心散

青蒿飲

白蜡塵

鬼哭飲

散子方

天靈蓋散

射香散

取屍虫秘方

神授散

治癆極禁方

取癆虫方

紫河車丹

柴胡散

驚甲散

貫衆丸

輕胃散

蛤蚧散

蛤蚧飲子


五蒸湯

加戒全套

丹溪活套

灸霍氏四花針法

四花六穴入形圖



新刊京板校正大字醫家正傳卷之三

花溪恒德老人虞 搏天民編集

姪孫虞守愚惟明校正

金陵三山街書肆松亭吳江繡梓

論

痢十七

內經曰溲而便膿血知氣行而血止也愚按經文溲字下必

溲澁而便血膿者言病因也蓋血因氣滯而大小二便俱

不利耳氣行而血止者言治法也故河間闡明其說所謂

和氣則後重自除而用木香按河間曰行血則便膿自愈和氣則後重自除又曰後重則宜

下腹痛則宜和身重則除濕脉弦則去風膿血稠粘以重

藥竭之身冷自汗以熱藥溫之風和東宜汗之驚唐為

痢宜溫之又白在表者發之在裏者下之在上者湧之在

下者竭之身表熱者內疎之小便澀者分利之又曰盛者
和之去者送之過者止之兵法云避其來銳擊其惰歸此
之謂也夫古方以瀉痢滾同論治朱紫混淆殊不知瀉屬
脾而痢屬腎也丹溪曰先水瀉而後膿血者此脾傳腎賊
邪難愈先膿血而後水瀉者此腎傳脾微邪易愈是皆先
哲之格言以為後學之繩墨鑒者其可不詳究乎

脉法

脉經云腸澼下膿血脉沉小流連者生洪大數身熱者死又
曰腸澼筋挛脉小細安靜者生浮大而緊者死

方法

丹溪方法凡
二十四條

丹溪曰痢赤屬血自小腸來白屬氣自大腸來

○原病式曰痢為濕熱甚於腸胃怫鬱而成其病皆熱証也俗
以痢白為寒誤也如熱生瘡癰而出白膿可以白為寒乎

陰陽水火不_レ高_ハ則_ハ下_一盛_ハ則_ハ衰_一若_レ以_レ白_ニ為_レ寒_ニ赤_ニ為_レ熱_ニ則_ハ兼_ニ赤_ニ白_ニ者_ハ乃_レ寒_ニ熱_ニ俱_ニ甚_ニ於_レ腸胃之間_ニ而_レ為_レ病_ニ乎_一况_レ下_レ迫_ニ窘_ニ痛_ニ小_ニ便_ニ赤_ニ澁_ニ而_レ痢_ニ白_ニ者_ハ必_ニ多_ニ有_レ之_ニ為_レ熱_ニ明_ニ矣_一世_ニ有_レ用_ニ辛_ニ熱_ニ藥_ニ而_レ愈_ニ者_ハ蓋_ニ辛_ニ甘_ニ發_レ散_ニ熱_ニ主_ニ出_レ行_ニ故_レ病_ニ微_ニ者_ハ則_ニ鬱_ニ結_ニ開_ニ通_ニ氣_ニ和_ニ而_レ愈_ニ者_ハ病_ニ甚_ニ者_ハ鬱_ニ結_ニ不_レ開_ニ其_レ病_ニ轉_ニ加_ニ而_レ死_ニ故_レ治_ニ痢_ニ者_ハ必_ニ用_ニ寒_ニ以_レ勝_ニ熱_ニ苦_ニ以_レ燥_ニ濕_ニ微_ニ加_ニ辛_ニ熱_ニ佐_ニ之_ニ以_レ為_レ發_レ散_ニ開_ニ通_ニ之_ニ用_ニ如_レ此_ニ固_ニ無_ニ不_レ效_ニ者_一

○仲景治痢可下者率用承氣等湯加減下之_ニ大黃_ニ之寒_ニ其_レ性_ニ善_ニ走_ニ佐_ニ以_レ厚_ニ朴_ニ之溫_ニ善_ニ行_ニ滯_ニ氣_ニ緩_ニ以_レ甘_ニ草_ニ之其_レ飲_ニ以_レ湯_ニ液_ニ灌_ニ滌_ニ腸_ニ胃_ニ滋_ニ潤_ニ輕_ニ快_ニ積_ニ行_ニ即_レ止_ニ局_ニ方_ニ用_ニ砒_ニ丹_ニ巴_ニ硃_ニ類_ニ聚_ニ成_ニ丸_ニ其_レ氣_ニ克_ニ暴_ニ其_レ體_ニ重_ニ滯_ニ積_ニ氣_ニ已_レ行_ニ而_レ毒_ニ氣_ニ未_レ消_ニ猶_ニ暴_ニ賊_ニ手_ニ持_ニ兵_ニ刃_ニ使_ニ之_レ徘徊_ニ瞻_ニ顧_ニ於_レ堂_ニ奧_ニ之間_ニ縱_ニ有_レ愈_ニ病_ニ之_レ功_ニ而_レ腸_ニ胃_ニ清_ニ純_ニ之_レ氣_ニ寧_ニ無_ニ損_ニ傷_ニ之_レ患_ニ乎_一可_レ溫_ニ者_ハ乃_レ用_ニ姜_ニ附_ニ溫_ニ之_レ局

方倒用熱藥為主，瀝藥為佐，用之於下利清白者，猶可。其裏急後重，經所謂下迫者，皆屬火熱，所為加以瀝熱之劑，非殺而何？

○初得一二日間，元氣未虛，必推蕩之。此通因通用之法，用大承氣湯，或調胃承氣湯。下後，看氣血調理，氣用參朮，血用四物。五日後，不可下。此亦大柴胡之氣血虛者，雖一二日而安者，亦不可下。實者，十餘日後，亦有下之

腹痛，以白芍藥、甘草為君，當歸、白朮為佐。惡寒者，加桂；惡熱者，加黃柏。

腹痛因肺金之氣鬱在大腸之間，以苦梗發之。後用痢藥一云實則可下，虛則以苦梗發之。

○初下痢腹痛者，用溫藥，姜、桂之屬，切不可驟用參朮，緩氣虛胃虛皆不可用。

○後重者，積與氣墜下之故，其升兼消尤當，和氣木香、檳榔、九

保和丸之類。

○身熱挾外感者，不惡寒，用小柴胡去人參，發熱惡寒，身首俱

痛，此為表証，宜微汗和解。又蒼朮、川芎、陳皮、芍藥、甘草、生

姜煎服，愚每以上二方併而治痢之挾外感者，亦多獲奇

○發熱不止者，屬陰虛，用寒涼藥必兼溫藥升藥。

○木孔痛，肝門因熱流於下也，木香、檳榔、蒼朮連加炒乾姜。

○仲景法治孔痛，一曰溫之，一曰清之。若久病身冷自汗，脉沉

小宜溫之，暴病身熱脉洪大宜清之。

○下血者，宜涼血活血，當歸、黃芩、桃仁之類，或用朴硝有風邪

下陷宜升提之，蓋風傷肝，肝主血故也。有溫傷血宜行溫

清熱。

○濕熱下痢，小便澀少，煩渴，能食脉洪大而緩，腹痛後重，桂苓

甘露飲送下保和丸二三十粒

○濕多熱少脾胃不和食少腹痛後重夜多利下胃苓湯送下保和丸二三十粒

○氣虛面色痿黃或枯白色人疲倦痢頻併痛後重不食脉細弱或微汗時出黃芪建中湯送下保和丸二三十粒

○濕熱為痢不渴者建中湯加蒼朮茯苓下保和丸

○脾胃不和食少腹脹痛後重脉弦緊平胃散加芍藥官桂葛根白朮茯苓下保和丸

○下痢血氣大虛腹痛頻併後重不食或產後得此証用四君子湯加當歸陳皮下保和丸二三十粒

○下痢白積者用芍藥湯加白朮陳皮甘草滑石桃仁

○下痢赤積身熱一元散加木通炒芍藥炒陳皮白朮煎湯送下保和丸加黃芩丸

○久下痢已數日不能起床不食疲弱之甚者用人參半錢

白朮一錢黃芪半錢當歸七分芍藥一錢炙甘草二分

御米殼醋炒三分地榆五分木香三分宿砂五分

陳皮一錢升麻三分白豆蔻仁三分澤瀉五分

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗溫服ス

○如下墜異常積中有紫黑血而又痛甚者此為死血証用桃

仁細研及滑石行之

○血痢久不愈者屬陰虛四物為主

○下痢如豈汁者濕也蓋脾胃為水穀之海無物不受常兼四

藏故有如五色之相染當先通利此迎而奪之之義如虛

宜審之

○古方用厚朴專為行凝滯之氣滯氣稍行則去之枳殼雖少

緩亦不宜久服只以陳皮和藥可也

○古方多用栗殼治嗽與痢但要先出病根乃收功後藥也
○如力倦氣少惡食此為挾虛証宜用白朮當歸身尾甚者加人參陳皮補之虛回而痢自止

○如久痢體虛氣弱滑泄不止亦當以滋藥止之訶子肉豆蔻白礬半夏牡蠣之類擇而用之然須以陳皮為佐恐太滋亦能作疼又甚者須灸天樞氣海耳穴法見前霍亂門

○如痢已減十之七八穢積已盡糟粕未實用炒芍藥炒白朮炙甘草陳皮茯苓煎湯下固腸丸二三十粒此丸性燥澀有去濕實腸之功若滯氣未盡除者不可遽用

○如痢後糟粕未實或食粥稍多或飢甚方食腹中作疼以白朮陳皮二味煎湯和之自安

○如氣行血和積少但虛坐努積此為無血証倍用歸身尾芍藥生地黃而以桃仁泥佐之陳皮和之血生自安

○如痢後脚弱漸細小用蒼朮二兩白芍藥龜板各二兩半黃柏五兩粥糊丸以四物湯加陳皮甘草煎湯送下

○噤口痢胃口熱甚故也用黃連人參煎湯終日呷之如吐則再強飲但得一呷下咽便好又用田螺搗盪臍中以引下其熱胃中熱結當開以降之人不知此多用溫藥其味以灰濟火以滯益滯也亦有誤服熱毒之藥犯胃者當推明而祛其毒用糞蛆焙乾為末清米飲調下一錢七甚效

○多有時疫作痢傳染相似宜推明運氣之勝復以治之

○小兒痢疾用黃連黃芩大黃甘草煎服赤痢加桃仁紅花白痢加滑石末同煎

○一小兒八歲下痢絕血作食積治蒼朮白朮黃芩白芍藥滑石茯苓甘草陳皮神麴煎湯下保和丸

○凡下痢絀血者如麝腐色者如屋漏水者太孔開如竹筒者

唇如珠紅者俱死○如魚腦髓者身熱脉大者俱半死半
生經所謂身涼脉細者生身熱脉大者死是亦太緊言之
耳不可一途而論也

○一方治熱痢血痢用大黃黃連黃芩黃柏枳殼白芍藥川歸
滑石甘草桃仁白朮等分神麴糊丸如梧桐子大每服五
六十丸白湯下

○清六九治血痢神効

○溫六九治痢及水瀉皆効已上二方並見泄瀉門

肥溪方○固腸丸治濕熱下痢太便下血去腸胃陳積之後用

此以爆下濕而實大腸

樗根白皮不拘多少細切畧炒

右一味研為細末米糊為丸如梧桐子大每服三五十丸
陳米飲送下或用炒芍藥炒白朮炙甘草陳皮茯苓煎湯

按仲景黃芩湯
無大棗

下

○芍藥湯行血則便膿自愈和氣則後重自除此藥是也

白芍藥二斤

當歸尾

黃連

黃芩一斤

大黃七分

甘草

枳實

木香

桂心各五分

右細切作一服水一盞半煎一盞空心服○如初病後重窘迫甚者倍大黃加芒硝一錢○如痞滿氣不宜通加枳實一錢○如藏毒下血加黃柏一錢

問

○黃芩芍藥湯治漏痢腹痛或後重身熱久而不愈脉洪數者及膿血稠粘者

黃芩

芍藥

各二斤

甘草一斤

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服腹痛甚加桂二分稍熱服之

問河

○黃連湯治大便後下血腹中不痛謂之濕毒下血

黃連

當歸各二錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗溫服

問河

○芍藥黃連湯治大便後下血腹中痛者謂之熱毒下血

芍藥

川歸

黃連各一錢大黃三分

桂心一分半甘草三分

右細切作一服水一大盞煎七分溫服

問河

○大黃湯治痢久不愈膿血稠粘裏急後重日夜無度脉沉實人不甚困倦者或初得腹痛甚者窘迫不安者

大黃一兩

右細切作一服用好酒一大盞浸半日煎至一盞半去粗分作二服頓飲之如痢未止再進後服後以芍藥湯和之又再服黃芩芍藥湯以徹其邪此乃湯條邪熱之劑用酒

方局

黃連二十兩用吳茱萸十兩一味木香四兩八錢
各以酒拌濕同炒去茱萸

閭河

桂府膩白滑石 六兩

粉甘草 一两炙

右二味共為極細末每服二錢白水調無時

栗殼去穢蒂醋炙
一兩二錢

陳皮 一兩三錢
肉苁蓉 四錢
延胡 五錢

茯苓去皮

白扁豆四炒各錢

木香

人參各一錢

右為細末每服一錢七清米飲調下食遠

○丹溪活套云痢疾乃外感熱內傷之候也須分表裡治之在表者必惡寒發熱身首俱痛宜以小柴胡湯去人參棗子加蒼朮川芎陳皮生芍藥微汙以散之在裡者必後重窘迫腹痛下積早宜以大小承氣河間酒煎大黃湯之類下之餘和未盡更以芍藥湯香連丸之類以徹其邪穢積已盡而更衣未息者此太腸不行收斂故也宜以固腸丸三香散之類以止澁之噤口者須詳証按法調治切不可輕用粟殼肉苁蓉訶子之類以試之殺入於反掌之間也但凡痢証不問輕重若邪氣正盛而以粟殼之類止遏之雖不死亦成休息痢二三年不能愈也又不可輕用巴豆牽牛等熱毒之藥攻之蓋病因熱毒又得熱毒之劑以火濟火不死何待

○祖傳經驗秘方和中飲治痢疾不分赤白久近服之無有不

效者但發熱噤口不食者不可服

陳皮

白朮

茯苓

芍藥各一錢

草薢仁七分甘草三分

陳倉米二錢砂糖二錢

栗殼錢半炙一烏梅一箇

右細切作一服加生姜三片大棗一枚水二盞煎至一盞去粗溫服

○經驗三根飲治休息痢年久不愈者其効如神

五倍木根

蒼耳草根

臭椿木根刮取白皮

各等分細切每服七錢重加生姜三片大棗一枚大黑豆三十六粒糯米四十九粒水二盞煎至一盞去粗溫服

○經驗二防飲治痢後不謹感冒寒濕或涉水履霜以致兩足

痛痺如刀割虎咬之狀膝腫大不能行動名鶴膝風此

藥神効

人參

白朮

黃芪各一錢 甘草炙半錢

川歸

川芎

為藥 熟地黃各一錢

防風

防已

羌活 牛膝各七分

杜仲姜汁

草薢各一錢 附子腫子尿浸三日去皮

右細切作一服加生薑三片大棗二枚水二盞煎至一盞

去粗空心溫服

○仁齋云下痢噤口不食者雖曰脾虛蓋亦熱氣閉膈心胃間

所致也俗用木香則失之溫用山藥則失之閉惟真料參

苓白朮散加石菖蒲末以道地粳米飲多年陳倉溫調下

或人參茯苓石連子肉入此少菖蒲為末與之宵次一開

自然思食其參苓白朮散本方該有○宿破或小入木香見內傷門

一子年將五十夏秋間得痢疾月餘服藥而小愈穢積已

但盡糟粕不食晝夜五六次入廁兼脫肛不安又半月諸

藥不効子記祖傳一方用池塘中驚一箇如法修事多用
生薑米糲作羹入沙糖一小塊不用鹽醬熟煮吃一二碗
三日不登廁大腸自此實矣肛門亦收而不脫夫此証蓋
因脾土受虛致肺與大腸俱失化源之所滋養是故大腸
不行收令也此母能令子虛耳驚乃介虫屬金而有土性
溫能補脾肺又況肺惡寒先得荊連等寒涼之味已多今
用生薑之辛以補肺金用沙糖之甘以補脾土肺氣既實
其大腸亦隨而實故得以行收令也故其功效如是之驗
焉

○嘔吐 十八

論

內經曰諸嘔吐酸暴注下迫皆屬於火東垣曰夫嘔吐噦三
者俱屬於胃胃者總司也以其氣血多少為異耳嘔者陽明

也陽明多血多氣故有聲有物氣血俱病也吐者太陽也太
陽多血少氣故有物無聲血病也噦者少陽也少陽多氣少
血故有聲無物氣病也河間曰胃膈熱甚則為嘔火氣炎上
之象也吐証有三氣積寒也皆從三焦論之上焦在胃口上
通於天氣主納而不出中焦在中脘上通天氣下通地氣主
腐熟水穀下焦在臍下下通地氣主出而不納是故上焦吐
者皆從於氣氣者天之陽也其脉浮而洪其証食已即吐渴
欲飲水大便燥結氣上衝胃而發痛其治當降氣和中中焦
吐者皆從於積有陰有陽食與氣相假為積而痛其脉浮而
長其証或先痛而後吐或先吐而後痛治法當以毒藥去其
積枳櫛木香行其氣下焦吐者皆從於寒地道也其脉沉而
遲其証朝食暮吐暮食朝吐小便清利大便秘而不通治法
當以毒藥通其秘塞溫其寒氣太便秘漸通復以中焦藥和之

不令太便秘結而自愈也。外有傷寒陽明實熱太甚而吐逆者，有內傷飲食填塞太陰，以致胃氣不得宣通而吐者，有胃熱而吐者，有胃寒而吐者，有久病氣虛胃氣衰甚，聞穀氣則嘔噦者，有脾濕太甚不能運化精微致清痰留飲鬱滯上中二焦，時時惡心吐清水者，宜各以類推而治之，不可執一見也。

脉法

脉經曰：嘔而脉弱，小便復利，身有微熱，厥者難治。跌陽脉浮者，胃氣虛寒，氣在上，噦氣在下，二氣相等，但出而不入其人即嘔而不得食，恐怖即死，寬緩即瘥。脉陽緊陰數，其以食已則吐，陽浮而數亦為吐。寸口脉緊而乾，緊則為寒，乾則為虛，虛寒相搏，脉為陰結，而遲人則噎，關上脉數其人則吐。脉弦者，虛也，胃氣無餘。

朝食暮吐暮食朝吐變為反胃寒在於上醫反下之令脉反弦故名曰虛

寸口脉微而數微則無氣無氣則榮虛榮虛則血不足血不足則胸中冷故吐

方法丹溪方法凡一十條

丹溪曰胃中有熱膈上有痰一陳湯加炒梔子姜炒黃連生姜煎服

○凡嘔吐者切不可下逆之故也

○有久病吐者胃氣虛不納穀也生姜人參黃芪白朮香附治之凡痞滿短氣而嘔宜補中氣止可用調中益氣湯

○肝火出胃逆上嘔吐抑青丸

方見火門

○夏月嘔吐不止五苓散加姜汁入湯調服

○吐虫而嘔用黑錫炒成灰楸榔末米飲調服

○惡心吐清水者有熱有痰有虛皆用生薑隨証佐藥治之

○胃中有熱者二陳湯加姜汁制炒黃連黃芩挾虛者加入參

白朮又云胃虛弱嘔者二陳湯加砂仁藿香白朮

○痰飲為患或因多食生冷脾胃不和以致嘔吐惡心或頭眩

或胃脘懊惱不快或發寒熱二陳湯加丁香烏梅生薑煎

服心下痞而痛者加草薢寇仁

間河○痰熱惡心嘔吐氣盛者道痰湯加宿砂姜炒黃連竹茹

間河○藿香安胃散治胃氣虛弱不能飲食時時嘔吐惡心者

藿香 人參 陳皮各一錢丁香五分

右細切作一服水一盞煎至七分溫服

間河○和中桔梗湯治上焦氣熱上衝食已暴吐脉浮而洪宜先

中桔梗半錢半夏麴二錢陳皮去白枳實炒黃色

白茯苓一錢白朮一錢半厚朴姜汁拌炒一錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗取清汁調木散
二錢空腹服三服後氣漸下吐漸止然後去木香散加芍
藥二錢黃芪一錢半煎服病愈則已如大便秘結食不盡
下以大承氣湯去芒硝微下之再服前藥補之如大便復
結又依前微下之

間河
○木香散

木香

檳榔

各等分為細末前藥調之服

間河

○荊黃湯治暴吐上焦熱氣所衝脉浮而洪者

荊芥穗五升人參二升半甘草一升大黃一升半

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗調檳榔散二錢空

腹服

間河
○檳榔散

換柳三升

木香一升半 輕粉少許

右為細末用前藥調服為丸亦可用水浸蒸餅丸如小豆大每服二十九食後服

問河

○青鎮丸治上焦吐頭痛發熱有汗脉弦

柴胡二兩

黃芩七升半 甘草五升

半夏五升

青代二升半

人參五升

右為細末姜汁浸蒸餅為丸如梧桐子大每服五十九生姜湯送下食後服

問河

○白朮湯治胃中虛損及有痰而吐者

半夏麴五升

白朮二升

換柳二升半 木香一升

甘草一升

茯苓二升

右為細末每服二錢生姜湯調下食前服

問河

○金花丸治吐食脉弦者肝乘於脾而吐乃由脾胃之虛宜

治風安脾

半夏湯一枳實湯一

雄黃一半

右為細末，姜汁和，蒸餅為丸，如梧桐子大小。兒九如黍米，大生薑湯送下。從少至多，漸加服之，以吐為度。無羈絆於脾，故飲食自下。

問

○紫沉丸治中焦吐食，由食積與寒氣相假，故吐而痛，宜服此藥。

半夏二

烏梅肉二

代赭石三

杏仁三

去皮尖另研一

砂仁三

丁香二

沉香一

枳實二

木香一

陳皮五

白芷仁半

白朮一

巴豆霜

另研半

右為細末，入巴豆霜，和勻，醋麪糊為丸，如黍米大。每服五十丸，食後生薑湯下。吐愈則止。小兒另九如芝蔴大，治小

7

○小半夏湯治陽明傷寒不納穀而嘔吐不化者

湯炮七次一兩

生薑二兩

右細切水三盞煎至一盞去粗分作二服服之

○生姜汁半夏湯治胃中似噉不噉似嘔不嘔似噦不噦徹

心憤憤然無奈者一

湯泡洗七次一兩

右細切水一盞半生薑自然汁半盞同煎至一盞溫服仲

景曰嘔多雖有陽明証慎不可下孫思邈曰嘔家多服生

姜乃嘔家之聖藥也氣逆者以辛散之故以生薑為主治

之

○藿香平胃散治內傷飲食填塞太陰嘔吐不化

薝香

厚朴錢

帝一

蒼木

一
鐵
半

陳皮一錢

甘草炙三分 砂仁半錢 研神麴半錢 炒

右細切作一服加生薑五片大棗一枚水一盞半煎至一盞去粗溫服

方局 ○胃苓湯治証同前

平胃散加五苓散加姜棗水煎服

溪冊

○黃連六一湯治因多食煎燂燒餅熱麴之類以致胃脘當心而痛或嘔吐不止已漸成反胃

黃連六錢 甘草炙一錢

右細切作一服水一大盞煎至七分去粗溫服

方局

○丁附治中湯治胃傷寒冷之物致心腹疼痛而嘔噦不止

人參五分 白朮一錢 乾姜一錢 甘草三分 炙

陳皮 青皮 丁香各一錢 附子二錢

右細切作一服加生薑五片大棗一枚水一盞半煎至一

盡去粗溫服

丹

○加味二陳湯治胃中有伏火膈上有稠痰時常胃口作痛及惡心吐清水不快

陳皮

去白一錢

半夏

錢半

茯苓

一錢

甘草

炙三分

梔子

炒一錢

黃連

炒錢半

川芎

一錢

白朮

一錢

乾姜

炒半錢

蒼朮

錢一

香附

一錢

牡荊子

炒另研錢半

按虛者加人參

錢一

右細切作一服水二盞加生薑二片煎至一盞稍熱服如

胃口痛甚入生薑自然汁一合和勻服

東垣

○丁香安胃湯治嘔吐噦胃虛寒所致

丁香半錢

具茱萸

一錢

草豆蔻

一錢

黃芪

二錢

人參一錢

炙甘草

半錢

柴胡

半錢

升麻

當歸身

陳皮

各半錢

黃柏

二分

蒼朮

一錢

東垣

○茯苓半夏湯治脾胃虛弱身重有痰惡心欲吐風和羈絆

於脾胃之間當先實其脾土

白朮一錢

茯苓一錢

半夏一錢

橘紅七分

天麻七分

麥蘖麩炒黃色一錢二分

右細切作一服水一盞半加生姜五片煎至一盞熱服

○丹溪活套云胃中有熱膈中有痰令人時常嘔吐清水作噎

氣吞酸等証用二陳湯加姜炒黃連梔子蒼朮川芎香附

砂仁神麩山查少加木香以行滯氣加姜水煎服

○久病虛者加人參白朮○胃寒者加益智草豈蔻乾姜

挂心之類去黃連梔子又甚者加丁香附子○如脇痛或

脾痛右關脉弦嘔吐不食此木來土之分也本方加人參

白朮升麻柴胡青皮芍藥川芎砂仁神麩之類○如時常

吐清水或口甘不喜食冷涎自下而湧上者此脾熱所致也本方加白朮為藥升麻土炒參連梔子神麴麥芽乾生薑或丸或煎皆可○如時常惡心吐清水心胃作痛得食則暫止飢則甚者此胃中有蠅也本方加苦練根史均子煎服即愈或用黑錫灰煑榔末等分米飲調下

在城黃氏婦將年三十產後因食傷致胃虛不納穀四十餘日矣聞穀氣則惡心而嘔聞藥氣亦嘔求子治子曰藥不能入口又將何法以治之乎懇求不已遂制一方用入參白朮茯苓各一錢甘草二分陳皮藿香砂仁各五分炒神麴一錢十年以上陳倉米一合順流水二大盞煎沸泡伏龍肝研細攪渾放澄清取一盞加姜棗同煎前藥至七分稍冷服此藥遂納而不吐別以陳倉米煎湯時時與之日進前藥二三服漸能吃粥而安後以此法治十數人皆

論

驗アリ

壹膈十九

內經曰三陽結謂之膈子和云三陽者大小腸膀胱也結謂熱結也小腸熱結則血脈燥大腸熱結則不能固膀胱熱結則津液涸三陽既結則前後閉塞下既不通必反而上行所以噎食不下縱下而復出也此陽火不下降而上行也故經又曰少陽所至為嘔湧溢食不下此理明矣又先哲論膈噎反胃大率以血液乾槁其或咽喉窒塞食不能下其槁在吸門或食下則胃脘當心而痛須臾吐出食出痛止其槁在賁門此皆上焦之膈噎也其或食物可下良久復出其槁在幽門此中焦之膈噎也其或朝食暮吐暮食朝吐其槁在蘭門大小腸之間此下焦之膈噎也雖然亦有斯須輕病而為醫

所誤者丹溪論之詳矣謂夫氣之初病其端甚微或因些少飲食不謹或外冒風雨內傷七情或食味過厚偏助陽氣積成膈熱或資稟充實表密無汗或性急易怒相火上炎以致津液不行清濁相干惟氣之為病或痞或痛或不思食或噫腐吞酸或嘈雜痞悶醫者不求其本便認為寒遽以辛香燥熱之劑投之時暫得快以為神方厚味仍前不即七情又復相侵舊病被劫暫開濁液易於攢聚或半月或一月前証復作如此延蔓自氣成積自積成痰此為痰為飲為吞酸之由也良工未遇謬藥又行痰挾痰血遂成窠囊此為痞為痛為嘔吐膈噎反胃之次第也醫者尤謂虛而積寒非尋常草木可療竟以烏附助佐丹劑專意服餌積而久也血液俱耗胃脘乾槁其槁在上近咽之下水飲可行食物難入間或可入食亦不多名之曰噎其槁在下與胃為近食雖可下難盡入

胃良久復出，名之曰嘔。亦曰反胃。太便秘小，若羊屎然，名雖不同，病出一體。又曰：嘔病生於血乾，血陰也。陰主靜，內外兩靜則藏府之火不起，而金水一藏有養，陰血自生，腸胃津液傳化合宜。何噎之有？醫者當知此意，不可妄以燥熱之劑以火濟火，則何以異刺入而殺之也？慎之慎之。

脉法

脉經曰：寸緊尺澁，其人胃滿不能食而吐，吐止者為下之故，不能食，誤言未止者，此為反胃，故尺為微澁也。

寸口脉緊而芤，緊則為寒，芤則為虛。虛寒相搏，脉為陰結而遲。其人則噎，閉上脉數，其人則吐。脉弦者，虛也。胃氣無餘，朝食暮吐，暮食朝吐，變於胃，反寒在於上，醫反下之，令脉反弦，故名曰虛。

跌陽脉浮而澁，浮則虛，澁則傷脾。脾傷則不磨，朝食暮吐，暮

食朝吐宿穀不化名曰胃反脉緊而澁其病難治

脉澁而小血不足 脉大而弱氣不足

方法凡十一條

丹溪曰大率属血虛氣虛有痰

戴氏曰氣虛者脉必緩而無力血虛者脉必數而無力痰者脉必沉或伏而大有氣滯結者寸關沉而澁

○張雞峯曰噎當是神思間病惟内觀以自養可安此言深中病情

○尿如羊屎者不治大腸無血故也年高者不治年五十餘則不可治矣

蠶氏曰氣血俱虛者則口中多涎

○治法用童便韭汁竹瀝姜汁牛羊乳一本有氣虛入四君子

湯血虛入四物湯切不可用香炒藥宜薄滋味

○下法用黃連三錢煨汁山查肉二錢保和丸二錢同為末糊丸麻子大胭脂胚子為衣人參湯入竹瀝下五十九

○丁方用馬鮑兒燒存性陳米湯調服野田瓜此方多有
○云馬鮑兒燒存性一錢好棗肉四枚平胃散二錢溫酒調服食即可下然後隨病源調理

○丁方用其葉黃連貝母瓜蒌子牛轉草丸服

○丁方用韭汁二兩牛乳一盞生薑半兩搗汁和勻頓服効

○有氣結者用開導之劑有陰火上炎者作陰虛治有積血者當消息去之韭汁能下膈上瘀血

肥上皆○古方用人參以補肺御米以解毒竹瀝以清痰乾姜

以養血粟米以實胃蜜以潤燥姜以去穢有治寒者必為當時有實因於寒者用之也挾寒者問或有之令人悉因痰氣久誤於醫傳變而成其無寒也明矣

方局

○瓜蒌實丸治膈噎胸膈痞痛徹背脇喘急妨悶
瓜蒌實別法硃枳殼去穢煨半夏湯洗桔梗煨各一兩

右為細末姜汁米糊為丸如梧桐子大每服五十九生姜湯送下

東垣○寬中進食丸滋形氣喜飲食方見內傷門

東垣○人參利膈丸治膈噎胃中不利大便結燥痰嗽喘滿脾胃壅滯推陳致新治膈氣之聖藥也

木香

檳榔各七錢半

人參

當歸

藿香

甘草

枳實

各一兩

大黃

酒浸蒸熟

厚朴

姜制一兩

右為細末滴水為丸如梧桐子大每服五十九溫水下

○丹溪活套云凡膈噎及胃痞用二陳湯加姜汁竹瀝童便韭

汁之類為主治○如胃中覺有熱悶本方加土炒黃連黃

芩瓜蒌仁桔梗之類○如血虛瘦弱之人本方合四物湯

少加杏仁泥紅花童便韭汁之類仍不可缺○如飲酒人

本方加砂糖、麝屎入內服。○如朝食暮吐、暮食朝吐、或食下、須臾即吐者，此胃可容受而脾不能傳送也。或大小腸秘結不通，食返而上奔也。本方加酒蒸大黃、桃仁之類，以潤之。脾不磨者，本方多加麥蘖、麴神麴之類，以助化之。○如氣虛肥白人，膈噎者，本方合四君子湯，亦加竹瀝、姜汁為要藥也。○有因七情鬱結成氣噎者，本方加香附、撫芎、木香、枳、檉、括、萎、仁、砂仁之類。○凡膈噎大便燥結，用大黃乃急則治其標之劑也。仍用四物湯加童便、韭汁、多飲牛羊乳為上策也。但不可以人乳代之，蓋人乳內有飲食烹飪之火及七情之火存於中，故不可代服也。

○祖傳經驗秘方潤腸膏治膈噎大便燥結，飲食良以復出及朝食暮吐、暮食朝吐者，其功甚捷。

新取威靈仙、五兩、開花者

生薑四兩、搗汁

真麻油二兩

白砂蜜

四兩煎沸掠出上沫

右四味同入銀石器內攪勻慢火煎候如饒時時以筋挑食之下料未愈再服二料決効

○經驗大力奪命丸治膈噎不下食及翻胃等証

杵頭糠

牛轉草

各半斤糯米一斤

右為細末取黃母牛口中涎沫為丸如龍眼大入鍋中慢火煮熟食之加沙糖二三兩入內丸尤佳

○一方治膈噎久不納穀者

隔年炊飯乾不拘多少

右一味以急流順水煎黃糜爛取濃汁時時與之待能食後以調脾進食生血順氣之藥調治而安

○猶溪金賢九里年五十三夏秋間得噎証胃脘痛食不下或食下良久復出太便燥結人黑瘦殊甚求予治診其脉右

手關前弦滑而洪關後畧沉小左三部俱沉弦尺帶孔子
曰此中氣不足木來侮土上焦濕熱鬱結成痰下焦血少
故大便燥結陰火上衝吸門故食不下用四物以生血用
四君子以補氣用二陳以祛痰三合成劑加姜炒黃連炒
枳實括萎仁少加砂仁又間服閏腸丸或服丹溪降痰丸
半年服前藥百餘貼病全安

○梅林駱氏婦予妻孀也年四十九身材畧瘦小勤於文工得
膈噎証半年矣飲食絕不進而大便結燥不行者一數日
小腹隱隱然疼痛求予治診之六脉皆沉伏予以生桃仁
七箇令細嚼杵生韭汁一盞送下片時許病者云膏中畧
見寬舒以四物湯六錢加括萎仁一錢桃仁泥半錢酒蒸
大黃一錢酒紅花一分煎成正藥一盞取新溫羊乳汁一
盞合而服之半日後下宿糞若午明日腹中痛止漸可進

論

稀粥而少安後以四物湯出入加減合羊乳汁服五六十貼而安

飢逆

二十

顛書飢與飢通氣上逆作聲之名也古方皆以飢為效逆諸書又多誤以效為效逆孫真人又誤以噦為效逆飢於立切亦有書為吃逆者皆誤也

內經曰諸逆衝上皆屬於火丹溪曰飢病氣逆也以其氣自臍下直衝上出於口之名也東垣謂火與元氣不兩立又謂火為元氣之賊古方悉以胃弱言之而不及火且以丁香柿蒂竹筴陳皮等劑治之未審孰為降火孰為補虛入之陰氣依胃為養胃土損傷則木來侮之矣謂之土敗木賊也陰為火所乘不得內相木挾相火之勢故其氣直衝清道而上言胃弱者陰弱也虛之甚也病者見此似為危証依法而治之者尚不能保其工一而况誤醫者乎雖

然亦有因實而為飭者不可不審或因飲食太過填塞胃中而氣不得升降者或有痰閉於上火起於下而氣不得伸越者有為傷寒熱病陽明內實過期而失下清氣不得升濁氣不得降以致氣不宣通而發飭者凡若此者皆實証也醫者宜專心致意察審虛實而調治之不可妄為處治以天人之天年也幸甚

脉法

脉浮而緩者易治弦急而按之不足者難治

脉結或促或微皆可治 脉代者危

右關脉弦者木乘土位難治

方法

丹溪方法凡六條

丹溪曰大率有痰有氣虛有虛火上衝視有餘不足治之
○痰與食在上者吐之入參若稀涎散之類

○不足者補之人參白朮煎湯下大補丸

○痰用陳皮半夏氣虛用人參白朮陰火用黃連黃柏滑石或

吐或補隨証施治

肥上皆○鯢逆自利滑石甘草黃柏芍藥人參白朮陳皮加竹

瀝服ス

○痢疾發醜用人參白朮煎湯調益元散頻服自止

婦○陳皮竹筴湯治傷寒餘熱未解氣虛發醜

甘草炙一錢人參二錢陳皮三錢青竹筴四錢

右細切作丁服加生薑三片大棗一枚水煎服ス

○橘皮半夏生薑湯治氣虛有痰發醜

陳皮 半夏 乾生薑 人參 通草 枳

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗溫服ス

方○六君子湯治痰挾氣虛發醜

陳皮一錢

半夏一錢半

茯苓一錢

甘草五分

人參一錢

白朮一錢半

右細切作一服加大棗二枚生薑三片新汲水煎服

○丹溪活套云凡傷寒發熱有四証不可不辨有中氣不足脈虛微氣不相續而發熱者宜用補中益氣湯加生脉散黃柏以降虛火或少加附子服之立愈有陽明內實矢下而發熱者宜大承氣湯下之而愈有渴而飲水太過成水結胸而又發熱者宜小陷胸湯或用小青龍湯去麻黃加附子治冰寒相搏發熱大效有傳經傷寒熱証醫者誤用姜桂等熱藥助起火邪痰火相搏而為咳逆者宜用黃連解毒白虎湯及竹瀝之類治之

○祖傳經驗灸咳逆法

乳根二穴直乳下一寸六分婦人在乳房下起肉處陷中

論

灸七壯即止其効如神

又氣海一穴直暗下一寸半灸三七壯立止

東陽李氏子病傷寒陽明內實醫與補藥治而後發餓十日
盤松周氏子診其脈長而實大與大承氣湯大下之熱退而
復召予診脈六脈皆沉細無力人倦甚以補車益氣湯作
大劑加附子一錢一日三貼兼與灸乳根氣海三度當
日飽止脈亦充而平夫

吞酸

三十一

內經曰諸嘔吐酸皆屬於熱惟李東垣獨以為寒誠下偏
之見也河間原病式曰酸者肝木之味也由火盛制金不
能平木則肝木自甚故為酸也如飲食熱則易於酸矣是
以肝熱則口酸也或言為寒者但謂傷生冷硬物而喜噯
醋吞酸故俗醫主於溫和脾胃豈知人之傷於寒也則為
病熱蓋寒傷皮毛則腠理閉密陽氣拂鬱而為熱証故傷

寒熱在表而以麻黃湯熱藥發散使腠理開通汗泄熱退而愈也凡內傷冷物者或但陰勝陽而為病寒或寒熱相搏拂鬱而為病熱亦有內傷冷物而反病熱得汗泄熱退身涼而病愈也或微而止為中酸俗謂之醋心法宜溫藥散之亦猶傷寒解表之義若久喜酸不已則不宜溫宜以寒藥治之後以涼藥調之結散熱去則氣和矣所以中酸不宜食粘滑油膩者謂能令氣鬱不通暢如食物在器覆蓋熱而自酸宜食糲食菜蔬能令氣之通利也曰寒曰熱於斯明矣李者謹之

脈法

脈弦而滑 兩手或浮而弦或浮而滑或沉而遲或沉而洪或洪而數或沉而遲胸中有寒飲洪數者痰熱在膈間時吐酸水欲成胃反也

方法 丹溪方法凡七條

○茱萸丸

吳茱萸去梗多湯泡
黃連土炒一兩

陳皮去白 黃芩陳壁土炒各五錢
蒼朮米泔浸七錢半

右為細末神曲糊丸如菽豆大每服二三十九津唾嚥下
一左茱萸連二味隨時令寒熱迭為佐使寒月倍茱萸熱月依本方
蒼朮茯苓為補助湯漫蒸餅為小丸吞之

○治酸必用茱萸順其性而析之

○食鬱有痰二陳湯加南星黃芩之類

○加味平胃散治吞酸因食鬱所致

生料平胃散加炒神麴炒麥芽姜棗同煎

○酸味宜節厚味必蔬食自養則病易安

○吐清水用蒼朮陳壁土炒茯苓滑石炒白朮陳皮煎服

○參黃丸上可治吞酸下可治自利又云治濕而氣滯者濕熱甚者用之為嚮導

六一散

一料吳茱萸一兩制

右為飯丸服

東垣

○霍香安胃散治脾胃虛弱飲食入胃嘔吐作酸不待腐熟

霍香

丁香

人參各二錢陳皮五錢

右為細末每服二錢加生姜水煎溫服

溪冊

○加減二陳湯治痰飲為患嘔吐頭眩心悸或因食生冷硬

物脾胃不和時吐酸水

丁香半錢

半夏半錢陳皮各二錢茯苓一錢半

甘草七分半

右細切作一服加生姜三片水煎服

○三因齏木丸

治中脘宿食啗酸蟄心痛吐清水

神麴炒三兩

蒼木一兩

神麴炒三兩

陳皮去白一兩

右為細末，生薑汁別煮神麴糊為丸，如梧桐子大，每服七十九姜湯送下。

○祖傳經驗治吞酸方

用黃連、吳茱萸各一兩，右以黃連細切，同茱萸以井花水浸七日，去連，將茱萸焙乾，每日清晨以米湯下四十九粒。

嘈雜暖氣 二二二

論

內經曰：胃為水穀之海，無物不受。若夫濕麵魚腥水菓生冷，以及烹飪調和粘滑難化等物，恣食無節，朝傷暮損，而成清痰稠飲，滯于中宮。故謂嘈雜暖氣，吞酸痞滿，甚則為翻胃，嘔噎即此之由也。夫嘈雜之為証也，似飢不飢，似痛不痛，而有懊懣不自寧之况者，是也。其証或兼暖氣，或兼痞滿，或兼惡心，漸至胃脘作痛，實痰火之為患也。治法以南星半夏橘紅

之類以消其痰。參連梔子石膏知母之類以降其火。蒼朮白朮為藥之類以健脾行濕壯其本元。又當忌口。鄭愈無有不

安者也。

脈法 右寸關脈緊而滑 兩寸弦滑胸中有留飲

寸脈橫者膈上有積積也。○右關弦急甚者木乘土位欲作胃及難治。

方法 丹溪方法凡八條

丹溪曰此為食鬱有熱炒梔子姜炒黃連乃必用之藥也

○肥人宜二陳湯少加撫芎蒼朮白朮梔子

○若濕痰氣滯不喜食用三補丸加蒼朮倍香附

○三聖丸治嘈雜神効

白朮 四兩

黃連 五錢

橘紅 一兩

右為細末神麴糊丸如菴豆大每服五十九津唾下或姜湯下

○木連丸治嘈雜

白朮四兩

黃連四兩半

右為細末神麴糊丸如黍米大津唾下

○軟石膏丸治噎氣嘈雜

南星炮製半夏洗湯泡軟石膏煨香附童便梔子炒

右各等分為細末粥丸如梧桐子大每服五十九姜湯下

○麴朮丸治中脘有飲則嘈宿食則酸方見吞酸門

○六抵嘈雜是痰因火動令人心嘈似飢非飢有積有熱也宜

用山梔子黃連煨汁為君南星半夏陳皮為臣熱多加青黛

若食鬱有熱梔子與姜炒黃連不可無

論

痞滿門 二十三

內經曰脩化之紀其病痞又曰大陰所至為積飲痞膈夫痞
滿之證東垣論之詳矣謂太陰濕土主壅塞乃土來心下為
痞滿也傷寒下之太早亦為痞滿乃寒傷榮血而然心主血
邪入於本故為心下痞仲景以瀉心湯用黃連瀉心下之土
邪功效甚速非止傷寒為然至於酒積雜病下之太過亦作
痞滿蓋下多則亡陰也亡陰者謂脾胃水穀之陰亡也故胃
中之氣因虛而下陷于心之分野故心下痞宜升胃氣以益
稟兼之若全用利氣之藥導之則痞尤甚痞甚而復下之氣
愈不降必變為中滿鼓脹皆非其治也又有虛實之異如實

痞太便秘者厚朴枳實主之虛痞大便利者芍藥陳皮主之
如飲食所傷而為痞滿者宜消導其胃中窒塞之氣上逆元
元欲吐者則宜吐之所謂在上者因而越之是也學者宜詳
究焉

脉法

脉經曰痞脉浮堅而下之緊反入裏因作痞

脉濡弱弱反在關濡反在顛微反在上澁反在下微則陽氣
不足澁則無血陽氣反微中風汗出而燥煩澁則無血厥而
且寒陽微不可下下則心下痞堅

右關脉多弦弦而遲者必心下堅

此肝木氣不舒結滯閉

方法

丹溪方法凡二條

丹溪曰痞滿與脹滿不同脹滿內脹而外亦形痞則內澁痞
悶而外無脹急之形也蓋由陰伏陽鬱氣血不運而成位

填_二心下之中腹滿痞塞皆土邪之所為耳有因誤下裏氣虛邪乘虛而蟄於心之分野有因食痰積不能施行而作痞者有濕熱太甚土來心下而為痞者_上

○用黃連黃芩枳實之苦以泄之厚朴生姜半夏之辛以散之人參白朮之甘溫以補之茯苓澤瀉之鹹淡以滲之大柴胡與濕同治使上下分消可也

○厚朴溫中湯治脾胃虛弱心腹脹滿疼痛時發時止_ラ

厚朴_煨 汁拌 陳皮_{去白} 各一兩 茯苓 草薢_各

甘草 木香_{各半錢} 乾生薑 一錢 右細切水煎服

垣東 ○木香順氣湯治腹脹心腹滿悶

木香 益智 陳皮 蒼朮

厚朴_{姜製} 青皮_{各四分} 茯苓 澤瀉_{各六分} 半夏_{各六分}

乾生薑 柴胡_{各三分} 當歸 人參_{各五升} 麻

方局

垣東

柴胡各一錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服

○冊痞有痰挾血成窠囊者用桃仁紅花香附大黃之類治之
○七氣湯治吐情所傷憂思鬱結府藏氣不和乎心腹痞悶

半夏 茯苓 厚朴錢半 紫蘇葉一錢

右細切作一服加生姜三片水一盞半煎至一盞溫服

○大消痞丸治一切心下痞及年久不愈者

乾生姜 神麴炒 甘草炙各二錢 朱苓二錢半

澤瀉 厚朴姜汁炒 砂仁各三錢 半夏湯泡七次去皮膽

陳皮去白 人參各四錢 枳實五錢去穰麴炒

黃連陳壁土黃芩各六錢 姜黃 白朮各一兩

右為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服五十九至百丸空心白湯下

垣東

○失笑丸一名枳實消痞丸治右關脉弦心下虛痞惡食懶倦開胃

進食

乾生薑一錢甘草炙

麥蘖麴炒

白茯苓

白朮各二錢

半夏麴

人參各三錢

厚朴姜制四錢

枳實麴炒黃色

黃連各五錢

右為細末蒸餅為丸如梧桐子大每服七八十九白湯下

垣東

○消痞湯一名枳實消痞湯治因憂氣鬱結中脘腹皮裏微痛心下

痞滿不思飲食

川歸

枳實麴炒各陳皮

生薑

木香各六分

柴胡七分甘草炙

草薢各一錢麴包煨

半夏半一錢

紅花一分

右細切作二服加生薑三片水二盞煎至一盞溫服ス

○黃連消痞丸治心下痞滿壅滯不散煩熱喘促不安

垣東

澤瀉

姜黃 各一錢 乾生薑 二錢 甘草 炙

茯苓

白朮

各三錢 陳皮 五錢

朱芩 去黑皮 五錢

枳實

炒黃色 七錢

半夏

湯泡七次 九錢

黃連

一兩

黃芩

二兩 炒

右為細末蒸餅為丸如梧桐子大每服五十丸白湯下

黃芩利膈丸除胃中熱利膈上痰

生黃芩

炒黃芩 各一兩 半夏

黃連 各五錢

澤瀉

五錢 南星

枳殼 炒去

陳皮

去白 各三錢

白朮

二錢 白礬 一錢

今加蘿蔔子

五錢 炒

小皂角

一錢

右為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服五十丸白湯

下忌酒濕麪魚腥

○丹溪活套云凡心下痞滿須用枳實黃連○如肥人心下痞

內有濕飲宜蒼朮半夏礬砂茯苓滑石之類○如瘦人心
下痞乃鬱熱在上焦宜枳實黃連以導之葛根升麻以發
之○如人飲食後因胃風寒飲食不消而作痞滿宜吳茱
萸縮砂藿香草豆蔻之類溫以化之○如脾氣虛弱轉運
不調飲食不化而作痞者宜白朮山查神麴麥芽之類以
消之○又曰痞滿之証不一有傷寒下早而作痞者枳殼
桔梗湯小陷胸湯之類○有因酒食填塞胸中而作痞者
保和丸東垣枳實導滯丸木香化滯湯之類○傷寒下多
則亡陽而痞者四物湯加參苓白朮升麻柴胡少佐以陳
皮枳殼之類除之○或大病後元氣未復而胸滿氣逆者
補中益氣湯陳皮枳朮丸木香枳朮丸之類○夫痞滿之
証不可執一全在活法詳脉証虛實而調之可也

山頭沉三十一丈年三十餘身材肥盛夏秋間因冒差丈量

田地辛苦至冬間得瘡滿証而脇氣攻胸中飽悶不能卧
欲成脹滿証歷數醫者皆與疎氣耗散之藥皆不効土月
初旬召予診治兩手關前皆浮洪而弦濇兩關後脈皆沉
伏予曰以膈上有稠痰脾土之氣敦阜肝木鬱滯而不伸
當用吐法木鬱達之之理也奈何值冬月降沉之令未可
行吐法且先與豁痰疎肝氣瀉脾胃敦阜之氣用平胃散
加半夏茯苓青皮川芎草龍胆香附砂仁柴胡黃連瓜蒌
子等藥病退之十有三四待次年二月初旬為行倒倉法
平安

腫脹 二十四

論

內經曰諸濕腫滿皆屬於脾又曰諸腹脹大皆屬於熱夫脾
虛不能制水水漬妄行故通身面自手足皆浮而腫名曰水

腫或腹大如鼓而面目四肢不腫者名曰脹滯又名鼓脹皆
脾上濕熱為病腫輕而脹重也丹溪曰心肺陽也居上腎肝
陰也居下脾居中亦陰也屬土經曰飲食入胃游溢精氣上
輸於脾七氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱水精四布
五經並行是脾具坤靜之德而有乾健之運故能使心肺陽
降腎肝之陰升而成天地交之泰是為平人令也七情內傷
六淫外侵飲食不節勞傷致虛脾土之陰受傷轉輸之官失
職胃雖受穀不能運化故陽自升陰自降而成天地不交之
否清濁相混隧道壅塞濕鬱為熱七又生溫七熱相生遂成
脹滿經曰鼓脹是也以其外雖堅滿中空無物有似於鼓膠
固難治又名蠱脹者若虫侵蝕有蠱之義理宜補脾又須養肺
以制木使脾無賊邪之慮滋腎以制火使肺得清化之令卻
鹽味以防助邪斷妄想以保母氣遠音藥戒暴怒無有不妥

醫者不察急於獲効病者苦於脹滿喜行利藥以求通快殊不知寬得一日二日復脹愈甚真氣已傷去死不遠矣俗謂氣無補法者以其痞滿壅塞以難於補不思正氣虛而不能運行和滯着而不出所以為病經曰壯者氣行則愈怯者著而成病氣虛不補和何由退病何由安且此病之起固非一年根深蒂固欲取速効自求禍耳知王道者可與語此其或受病之淺脾胃尚壯積滯不固者惟可畧與疎導而不可峻與利藥也

愚按先生此論詳明殆盡誠千古不易之定識也及視東垣脹滿論又以論藏寒生滿病立說引脈經胃中寒則脹滿之語以為之証愚恐南北風土寒熱不同難以一余而論雖然愚嘗按丹溪法活入多矣是以東垣之論不與胎合故不敢採其言以為後人之惑也

脉法

鍼經曰其脉大堅以瀉者脹也

脉經曰關上脉虛則内脹

遲而滑者脹

脉盛而緊者脹

虛而緊澹者脹

或弦而遲或浮而數皆脹也

丹溪曰水腫脉多沉伏病陽水無陽証脉必沉數○病陰水兼陰証脉必沉遲○煩滿小便赤澀大便秘結此為陽水不煩滿大便溏小便少而不赤澀此為陰水

脉沉而滑為風水脉浮而遲弦而緊皆為腫也

水病腹大如鼓脉實者虛者死洪大者生微細者死

腹脹便血脉大時絕劇脉小疾者死

中惡腹大四肢腫脉大而緩者生浮而緊者死

緊而榮衛俱絕面浮腫者死

唇腫齒焦者死卒唇腫面蒼黑者死

掌腫無紋者死臍腫凸出者死

缺盆平者死

陰囊楚俱腫者死

脉絕口張足腫者死
足跌腫膝如土者死

万法丹溪方注

丹溪曰古方惟禹餘糧丸制肝補脾殊為切當然亦須隨時
隨証加減二友人得脹疾自制此藥服之予曰溫熱藥多
且煅煉之火尚存宜自加減彼不聽服之一月口鼻出血
骨立而死

○朝寬暮急血虛暮寬朝急氣虛朝暮急氣血俱虛

○治腫脹大法宜補中行溫利小便以人參白朮為君蒼朮陳
皮茯苓為臣黃芩麥門冬為使以制肝木少加厚朴以消
腹脹氣不運加水香木通氣下陷加升麻柴胡提之血虛
加補血藥痰盛加利痰藥隨証加減用之無不効者

○盧氏醫鏡以水腫隸於腎肝胃而不及脾又肺金盛而生水

水溢妄行豈理也哉夫脾土受病肺為之子固不能自盛而生水然肺金氣清而能生水則滋長腎陰奉行降令為生化之源何病腫之有今為腫之水乃腐濁之氣滲透經絡流注谿谷灌入隧道血亦因之而化水欲藉脾土以制之道腎氣以利之殊不知脾病則金氣衰木寡於畏而來侮土脾欲不病不可得矣治法宜清心經之火補養脾土全運化之職肺氣下降滲道開通其敗濁之氣稍清者傷回而為氣為血為津液敗濁之甚者在土為汗在下而為溺以漸而分清矣

○腰已上腫者宜發汗腰已下腫者宜利小便此仲景之法

○東垣曰宜以辛散之以苦瀉之以淡滲利之使上下分清其濕正所謂開鬼門潔淨府開鬼門者謂發汗也潔淨府者利小便也

○產後浮腫必大補氣血小佐以蒼朮茯苓使水自降大劑白
朮補脾壅滿者用半夏陳皮香附監之有執當清肺金麥
門冬黃芩之屬

肥土諧○熱水腫用山梔子仁炒為米飲調下三五錢若胃

腕熱病在上者連殼用

方○禹餘糧丸治中滿氣脹喘滿及水氣脹

蛇含石煨三兩針砂五兩禹餘糧針砂炒

已上三味為主其次量入虛實入下項藥

木香 牛膝 蓬莪朮 白蔞

桂心 川芎 茴香 白芷仁

三稜 羌活 茯苓 乾姜

青皮 陳皮 附子 當歸鎔五

右為末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服五十九空心溫

酒下

方局 ○ 繫矩三和湯

陳皮 皓

紫蘇

甘草 各七分

厚朴 製

檳榔

白木 各一錢

海金沙 四分

木通 三分

右細切作一服

加生姜三片水煎服

○ 濟生紫蘇湯專治憂慮過度致傷脾肺心腹脹滿喘促治

鳴氣走瀉瀉有聲大小使不利脉虛而緊

紫蘇子 研一錢

白木 二錢

人參 一錢

大腹皮 淨洗

草菓仁

半夏

厚朴

木香

陳皮

枳壳 炒

甘草 各五分

右細切作一服

加生姜三片大棗一枚水煎溫服

垣

○ 木香順氣湯治濁氣在上則生脹

木香 三分

厚朴 四分

青皮

陳皮

益智

茯苓

澤瀉

乾生姜

半夏

各貳分

川歸

分五

升麻

分一

吳茱萸

湯泡二分

柴胡

分一

蒼朮

分五

白朮

錢一

草豈蔻

分三

右細切

作一服

水二盞

煎至一盞

溫服

此非寒脹類秘

東

○中滿分消丸治中滿鼓脹氣脹水脹熱脹

此非寒脹類秘

黃芩

去朽細切酒拌

黃連

枳實

麴炒黃色

半夏

湯泡七次去

姜黃

白朮

朱苓

去黑皮各一錢

乾生薑

人參

各三錢半

甘草

砂仁

各二錢

厚朴

姜制五錢

知母

酒洗

白茯苓

陳皮

去白各三錢

澤瀉

右為細末

蒸餅糊丸

如梧桐子大

每服百丸

煨熟白湯或

淡姜湯下

○廣木潰堅湯治中滿腹脹內有積塊堅硬如石令久坐卧

東

○廣木潰堅湯治中滿腹脹內有積塊堅硬如石令久坐卧

○廣木潰堅湯治中滿腹脹內有積塊堅硬如石令久坐卧

○廣木潰堅湯治中滿腹脹內有積塊堅硬如石令久坐卧

○廣木潰堅湯治中滿腹脹內有積塊堅硬如石令久坐卧

○廣木潰堅湯治中滿腹脹內有積塊堅硬如石令久坐卧

○廣木潰堅湯治中滿腹脹內有積塊堅硬如石令久坐卧

○廣木潰堅湯治中滿腹脹內有積塊堅硬如石令久坐卧

○廣木潰堅湯治中滿腹脹內有積塊堅硬如石令久坐卧

○廣木潰堅湯治中滿腹脹內有積塊堅硬如石令久坐卧

○廣木潰堅湯治中滿腹脹內有積塊堅硬如石令久坐卧

○廣木潰堅湯治中滿腹脹內有積塊堅硬如石令久坐卧

不寧二便澀滯上氣喘促或通身虛腫

厚朴制姜

黃芩

黃連

益智

草薺剉

當歸各五

半夏分

廣木

升麻

紅花

吳茱萸各二

生甘草

柴胡

澤瀉

神麴炒

青皮

陳皮各三

渴加乾葛分四

右細切作一服加生薑三片水二盞煎七分溫服食遠忌酒醋濕麪二服之後中滿減半止有積塊未消再服後藥

○半夏厚朴湯

紅花

蘇木各半

木香

青皮各二

吳茱萸

乾生薑

黃連各一

肉桂

蒼朮

白茯苓

澤瀉

柴胡

陳皮

生黃芩

草薺剉

生甘草各三分

京三稜

當歸稍

朱苓

升麻

各四分

神麴炒六分

厚朴

姜制八分

半夏

湯泡一分

桃仁

七箇去皮尖研如泥

昆布

如渴

加乾姜

三分

右細切作

一服水

三盞煎至

一盞稍熱服

服此藥

一貼之

後前証又減

一半却於

前藥中加減服之

東垣

○破滯氣湯

化滯散

名木香

破滯氣

治心腹滿悶

一

甘草

炙二分

白檀香

藿香

陳皮

大腹子

白豆蔻

白茯苓

桔梗

各一

砂仁

人參

青皮

檳榔

木香

姜黃

白朮

各四分

右細切作

一服水

一盞半煎至

一盞去粗溫服

不拘時候

東垣

○草豆蔻湯

治腹中虛脹

澤瀉

一分

木香

三分

神麴

細

半夏

泡

枳實煨

草豈寇

黃芪不卷腹

益智

甘草各五

青皮

陳皮各六

茯苓

當歸各七

右細切作一服加生薑二片水一大盞煎至一盞溫服冬月加黃芪六七分春夏止服正藥食遠

問河

○葶藶木香散治濕熱內外甚水腫腹脹小便赤澀大便滑泄此藥下水溫消腫脹止瀉利小便之藥聖也

葶藶子

茯苓去皮

朱苓去皮

白木各二錢半

木香半錢

澤瀉

木通

甘草各五錢

辣桂二錢半

白滑石二兩

右為細末每服三錢白湯調下食前服

問河

○白木木香散治喘嗽腫滿欲變成水病者不能卧不敢多食小便閉而不通者

白朮

木猪苓

去皮

澤瀉

甘草

木通

赤茯苓

各五分

木香

檳榔

各三

陳皮

官桂

二分

滑石

錢二

右細切作一服加生姜三片水一盞半煎至一盞溫服

問○二氣散治水氣蠱脹滿悶

白丑

黑丑

各二

右為細末外用大麥麩四兩同二處拌勻做燒餅臨卧用

茶清一盞下

降氣為驗

問○牽牛丸治一切濕熱腫滿等証

黑丑

黃芩

大黃

椒目

滑石

各等分

右為細末酒煮麩糊為丸如梧桐子大每服五丸至七丸

生姜湯下食後服看虛實加減丸數

問○二花神祐丸治中滿腹脹喘嗽淋瀝一切水濕腫滿濕熱

腸垢陳積變生諸疾久病不已黃瘦困倦氣血壅滯不得
宣通或風熱燥鬱肢體麻痺走注疼痛風痰涎嗽頭目眩
運瘡疾不已癥瘕積聚堅滿痞悶酒積食積一切痰飲嘔
逆及婦人經病不快帶下淋瀝無問赤白併男婦傷寒濕
熱腹滿實痛久新瘦弱俗不能辨兼馮新舊腰痛併一切
下痢及小兒驚疳積熱乳癖腹滿並宜服之

甘遂

大戟各五錢

大黃兩一

芫花

醋拌濕炒五錢

輕粉

包一錢研黑丑二兩取頭末一兩淨

右為細末同輕粉拌勻滴水為丸如小豉大初服五丸每

服五丸溫水下日三服加至快利為度利後却又常服病

去乃止設病愈後惟老弱久病虛人勿服平人常服保養

宜通氣血消進飲食病痞悶極甚者便多服則頓攻不開

阿

轉加痛悶宜初服二九每服加二九至快利為度以意消
息小兒九如麻子大隨強弱大小增減九數三四歲者三
四九依前法服

○宣明雞屎醴飲出素問論治鼓脹日食則不能暮食痞滿

壅塞難當

大黃

桃仁去皮尖乾雞屎

右各等分為細末每服二錢水一盞生薑三片煎湯調下
食遠臨卧服

○丹溪活套云凡腹脹須用姜制厚朴肥人腹脹必用利濕蒼
木茯苓滑石海金沙之類○色白人腹脹必是氣虛用入
參白朮白茯苓之類○瘦人腹脹是熱必用黃連黃芩梔
子厚朴之類○如因有故蓄血而腹脹者用桃仁紅花甚
者用抵當湯丸之類○如因食積而腹脹者保和丸加水

香換柳阿魏之類○有熱鬱而脹者木香換柳丸之類下
之○有寒積鬱結而脹者局方丁香脾積丸東垣三稜消
積丸之類○如因外寒鬱內熱而腹脹者用霍香官桂升
麻乾葛之類○如因多怒鬱氣而脹者宜用蒼木撫芎香
附青皮芍藥柴胡及龍薈丸之類○凡腹脹初得是氣脹
宜行氣疎導之劑木香換柳枳殼青皮陳皮厚朴之類○
久則成水脹宜行溫利水之劑

○祖傳經驗雞屎醃治鼓脹氣脹水脹等証

雞屎一升

右一味研細炒焦色地上出火毒再研極細百沸湯三升
淋汁每服一大盞調木香換柳末各一錢日三服空腹服
以年為期

○又經驗方治腫脹或通身水腫或腹大堅滿

三稜

莪朮醋炒用陳皮去

青皮

砂仁

羌活

防已

澤瀉

連翹

檳榔各三

甘遂二錢

椒目

水香

乾漆炒

白丑

黑丑各二錢

大黃各

雙頭連

雙頭連

雙頭連

右研為細末

麪糊為丸

如梧桐子大每服三錢重空心溫酒送下以利為度病退即止藥忌甘草松菜鹽醬

○又經驗桃奴丸治婦人或室女月經不通漸成脹痛及男子

墜馬跌撲損傷以致瘀血停積成血蠱病皆能治之

桃奴洗搗上乾杵小秦

也十二月收用

猥鼠糞兩頭尖者是

蟾蜍糞也

五靈脂

玄胡索

肉桂

香附子

五靈脂

砂仁

桃仁去皮尖

各等分

右為末每服三錢溫酒調下

○予族八兄素能飲酒年五十得腫脹病通身水腫腹脹尤

予族八兄素能飲酒年五十得腫脹病通身水腫腹脹尤

予族八兄素能飲酒年五十得腫脹病通身水腫腹脹尤

予族八兄素能飲酒年五十得腫脹病通身水腫腹脹尤

予族八兄素能飲酒年五十得腫脹病通身水腫腹脹尤

予族八兄素能飲酒年五十得腫脹病通身水腫腹脹尤

予族八兄素能飲酒年五十得腫脹病通身水腫腹脹尤

○梅林妻姪孫駱智一得腫脹証亦令戒前四事用前法服藥
四五十貼而愈頗安五年一日嘆曰人不吃鹽薑與死何
異遂開鹽十數日後舊病大作再來求治不許又告欲行
倒倉法予曰脾虛之甚此法不可行於今日也踰月腫脹
而死予用丹溪之法治腫脹愈者多矣不能盡述特書此
二人不守禁忌者以為後人病此者之戒云

論

積聚 二十五

內經曰積聚留飲痞膈中滿溫積霍亂吐下癥瘕堅硬腹痛
皆大陰濕土乃脾胃之氣積聚之根也難經曰積者陰氣也
聚者陽氣也故陰沉而伏陽浮而動氣之所積名曰積氣之
所聚名曰聚故積者五臟所生聚者六腑所成也夫所謂積
者陰氣也其始發有常處其痛不離其部上下有所終始左
右有所窮處謂聚者陽氣也其始發無根本其痛或隱或見
上下無所留止痛發無所定位是故肝之積名曰肥氣在右
脇下如覆杯有頭足久不愈令久發欬逆痰癰連歲不已心
之積名曰伏梁起臍上大如臂上至心下久不愈令人煩心
脾之積名曰痞氣在胃脘右側覆大如盤久不愈令人四肢
不收發黃疸飲食不為飢膺肺之積名曰息奔在右脇下大

如覆杯久不愈令人洒淅寒熱喘咳發肺壅腎之積各奔脈
 在小腹上至心下若脈狀或上或下無時久不愈令人喘逆
 骨痿少氣東垣曰鍼經云其成積者蓋厥氣生足悅悅生脛
 寒脛寒則血脉凝澁故寒氣上入腸胃所以腹脹腹脹則腸
 外之汴沫迫聚而不得散日以成積矣或盛食多飲則脉傷
 若起居不節用力過度則陽絡脉傷陽絡脉傷則血外溢血
 外溢則衄血陰絡脉傷則血內溢血內溢則便血腸胃之絡
 脉傷則血溢於腸外腸外有寒汁沫與血相搏則氣聚而成
 積矣或外中於寒內傷於憂怒則氣上逆氣逆則六輸不通
 溫氣不行疑血蘊裏不散津液凝澁滲着不去而成積矣又
 曰生於陰者盡憂思傷心重寒傷肺忿怒傷肝醉以入房汗
 出當風則傷脾用力過度入浴則傷腎此內外三部之所生
 病也故難經中說五積各有其名如肝積曰肥氣在左脇下

如杯而臍左有動氣按之牢者痛者是無是非也餘積皆然
治者當察其所痛以知其應有餘不足可補則補可瀉則瀉
毋逆天時詳藏府之高下如寒者熱之結者散之客者除之
番者行之堅者削之按之摩之醢以輒之苦以瀉之全其真
氣而補益之隨其所利而行之節飲食慎起居和其中外可
使必已不然徒以大毒之劑攻之積不能除反傷正氣終難
復也可不慎與

脉法

細作經脈經有此四字

脉經曰脉來細而附骨者積也在寸口積在胸中微出寸口
積在喉中在關上積在臍傍上關上積在心下微下關積
在小腹又微積注氣衝脉出在右積在右脉出在左積在
左脉兩出積在中央各以其部處之也
脉來小沉而實者脾胃中有積聚不下食食則吐

肺積脉浮而毛按之辟易

心積脉沉而芤上下無常處

肝積脉弦而細

腎積脉沉而急

脉沉重而中散者因寒食成積

脉左轉而沉重者氣鬱積在胸中

脉右轉出不空寸口者內有肉癥也

方法丹溪方凡六條

丹溪曰塊乃有形之物氣不能成形痰與食積死血也在中為瘕飲在右為食積在左為死血大法臠以軟之堅以削之行氣開痰為主

○治積塊方用海石三稜莪朮香附肥土俱用醋煮桃仁紅花五靈脂

之類為丸石醪白水湯下

○黃蜀葵根煎湯入人參白朮青皮陳皮甘草稍牛膝煎成膏入細研桃仁玄明粉各少許熱飲之二服當見塊下病重

者補接之後加減再行

○石醵去痰積食積洗滌垢膩有功

○瓦龍子能消血塊次消痰瓦龍子即蚌壳也盧尚青移鎮嶺南改蚌名瓦龍子以其壳上有紋

如瓦屋故名之耳出與表異錄

能一

○積塊不可專用下藥徒損其氣病亦不去當消道使之鎔化其死血塊去須大補

○三聖膏貼積塊

用末化石灰半斤為末瓦上炒微紅提出候熱稍減入大黃末二兩炒熟仍提出入桂心末五錢畧炒以米醋熬成膏厚攤烘熱貼之

○琥珀膏 用大黃朴硝各一兩為末以大蒜搗膏貼之

○阿魏丸治肉積成塊

阿魏

山查各一兩

連翹

黃連六錢

右以下三味為細末以阿魏用米醋煮糊為丸如梧桐子大每服五十丸脾胃虛者以白朮三錢陳皮茯苓各一錢煎湯送下○一方加半夏一兩以脾乾同煮石礮三錢○又一方以醋煮神麴糊為丸無連翹○又一方既兼諸方而又有瓜蒌貝母南星風化硝胡黃連萊服子麥蘗麴姜汁浸蒸餅為丸治諸般積聚用者更宜詳之

○大溫中丸○小溫中丸俱治食積成痞塊面色痿黃肌膚虛腫飲食無味等証黃疸門

○凡婦人腹中有塊多屬死血

○一方治婦人死血食積痰飲成塊在兩脇動作啻鳴嘈雜眩

運身熱時作時止上

黃連一兩○一兩以吳茱萸半兩同炒去茱萸

萊服子半兩台半兩号一兩 梔子二錢

莪木醋

麥麴

桃仁去皮尖各五錢香附童便浸

山查各一兩

右為細末蒸餅為丸如梧桐子大每服五十九丸姜湯下

○一方治婦人血塊如盤有孕難服峻藥

香附醋炙桃仁皮尖海石醋炙白木兩

右為細末神麴糊丸服

○凡痞塊在皮裏膜外須用補氣藥及香附開之兼二陳湯先

須斷厚味為要

○倒倉法用肥嫩黃牝牛肉二三十斤切成小片去筋膜長流

水者糜爛以布漚去渣滓取淨汁再入鍋中慢火熬至琥珀色則成劑矣

令病者預先斷絕食淡前一日不食晚飯設密屋一間明亮而不通風處行之置穢桶及木瓦盆貯

吐下之物一磁瓶盛所出之瀉令病者入室以汁飲一杯

少時又飲一杯積數十杯寒月則重湯溫而飲之在其吐
利病在上者欲其吐多病在下者欲其利多病在中者及
在上復在下者欲其吐利俱多全在活法而為之緩急多
寡也視所出之物必盡病根乃止吐利後必渴甚不得與
湯以所出之溺飲之名輪迴酒非惟可以止渴抑且可以
蕩滌餘垢行後倦睡覺飢生與稠米飲次與淡稀粥三日
後方可與小菜羹次與厚粥軟飯調養半月或一月自
覺精神煥發形体輕健沉痾悉能痊矣其後須忌牛肉數
年夫牛坤土也黃土之色也以順為性而効法乎乾以為
功者牡之用也肉者胃之藥也熟而為液無形之物也橫散
入肉絡由腸胃而滲透肌膚毛竅凡用無不入也積聚久
則形質成依附腸胃道薄曲折處以為積泊之窠白阻礙
氣血津液薰蒸燔灼成病自非刮腸刮骨之神妙可以盡

兩九散，窺犯其藩，墻戶牖乎肉液之散，益腸胃受之，其厚皆倍於前，有似乎腫，其廻薄曲折，處肉液充滿流行，有如洪水泛漲，其浮槎陳朽，皆推逐蕩漾順流，而不可停留，在表者因吐而汗，其清道者自吐而湧，濁道者自泄而去，凡屬滯碍，一洗而盡，牛肉全重，厚和順之性，盎然渾潤澤，枯槁補益，虛損寧無精神，渙發之樂乎？正似武王克商，散財發粟，以賑殷人之仰望也。其方得於西域之至人，凡人於中年後行，一二次亦欲疾養壽之，下助也。

夫倒倉法，全藉自飲輪迴酒十數杯，以祛逐餘垢，迎接調勻新布，榮衛使藏氣育膜，生意敷暢，有脫胎換骨之功也。多嫌其穢，因致中綴而功虧一簣，若非明物理，通造化者，其肯視為羹醢良味乎？此段乃丹溪與人書簡所論也

愚按內經謂脾胃者倉廩之官，五味出焉，大腸者傳道

之官變化出焉小腸者受盛之官化物出焉今詳此法
名為倒倉謂傾倒倉廩之陳腐也其論中反覆叮嚀之
意無非只為腸胃中痰積膠固及化生諸般奇形之虫
誠恐痼疾難療愚嘗屢試明驗惟脾胃與大小腸有食
積痰飲而為腹痛痞瘕食癰黃疸痞滿惡心噯氣嘈雜
吞酸等証行之無不應手獲効其餘一應氣血虛損與
夫及胃膈噎鼓脹癆瘵太風真病已成及肥白氣虛之
人或一切証候脉虛軟無力者切不可輕試以自招咎
庶丹溪有謂咯血吐血久病嘗用此法而愈者蓋必其
胃中痰火太盛而真氣壯實未虧亦在丹溪之高見親
手用之則可今人效顰而妄以似是而非者行之是乃
徒取誚於他人而反謗以丹溪之法不堪信也慎之慎
之

治生方
 ○大七氣
 湯治積
 聚狀如
 癥瘕隨
 氣上下
 發作有
 時心腹
 疼痛上
 氣塞塞
 小腹脹
 滿
 益智
 陳皮
 京三稜

陳○廣木清堅湯治有積塊堅硬如石形大如盤令人坐卧不
 安中滿腹脹方見腫脹門

陳○半夏厚朴湯治証同前方見腫脹門

○三因散聚湯治九氣積聚狀如癥瘕隨氣上下發作有時心

腹疼痛攻刺腰脇小腹脹大小便不利

半夏
 枳櫚
 川歸各四分
 陳皮

杏仁去皮尖另研
 桂心
 茯苓各一錢
 甘草炙

附子泡
 川芎各五分
 枳殼各一錢
 厚朴制

吳茱萸湯泡去梗乾
 大黃酒拌濕蒸半錢或一錢大便利即去之

右細切作二服加生姜三片水二盞煎至一盞溫服

○千金硝石丸止可磨塊不令人困須量虛實用之

硝石六兩
 大黃八兩
 人參
 甘草各三

右為細末以三年陳米醋二升置磁器中以竹片作準每

蓬木 香附子 炒各一 兩半 桔梗 肉桂 藿香葉 甘中灸 青皮各 右吹咀 每服五 水煎 異本有 此方從 非恒德 續集

入一升作一刻先入大黃不住手攪使微沸盡一刻乃下
 餘藥又盡一刻微火熬使可丸如雞子黃大每服一丸白
 湯化下或丸如梧桐子大每服三五丸服後下如雞肝
 或如米泔赤黑色等物乃下後忌風冷宜軟粥將息
 ○局方妙香丸治久年陳積方見火門

○導氣枳壳丸治氣結不散心胸痞滿逆氣上攻分氣逐風功
 莫盡述

枳壳去殼

木通

青皮

陳皮鹽去

桑白皮

萊菔子

白丑

黑丑

義木煨

茴香

京三稜泡

右各等分為細末姜汁調麪煮糊為丸如梧桐子大每服
 二十九煎橘皮湯下

○木香三稜丸治一切氣悶胸膈痞滿榮衛不和口吐酸水

嘔逆惡心飲食不化脇肋疼痛無間久新並皆治之

青木香

破故紙

茴香

黑丑

甘遂

芫花

木戟

京三稜炮

蓬莪朮

川練子

胡蘆芭

巴戟已上各一兩

巴豆不祛油

陳倉米三合與芭豆一處同炒黑

砂仁半一兩

右細切用好米醋二升除砂仁木香外餘藥入醋中浸下

宿入鍋內煮醋盡乾為度同木香砂仁為細末醋煮麵糊

為丸如菽豆大每服五丸或七丸食後服皆虛實大小加

減丸數隨湯水任下

○東垣草豆蔻丸治酒積或傷寒冷之物胃脘痛咽膈不通

草豆蔻煨暴

白木各一兩

大麥蘖

神麴焙

黃芩

半夏各半

枳實炒二兩

陳皮

青皮

乾生薑各二兩 炒薑各二兩

右為極細末湯浸蒸餅為丸如棗豆天每服一百丸熟水
下

愚按此方乃飲酒過度恣食寒涼之物有瘰癧積飲在
腦腹間作痛者之所宜也

○肥氣丸治肝之積名曰肥氣在左脇下如覆杯有頭足久不
愈令人發欬逆瘰癧連歲不已

厚朴姜制

黃連去心

柴胡兩一

川椒四

巴豆霜分五

乾姜分五

川烏分二

皂角去皮炙

白茯苓半錢

廣木錢二

人參錢二

甘草炙錢

昆布錢半

右件除茯苓皂角巴豆霜另研末外諸藥共為極細末和
勻煉蜜為丸如梧桐子大初服二九二日加一九二日加二
九漸漸加至大便微澀再從二九起加服之周而復始積

減大半勿服

堧○伏梁丸治心之積名曰伏梁起臍上大如臂上至心下又

不愈令人煩心

黃連半一兩

厚朴制

人參銖五

黃芩銖三

桂枝銖

乾姜泡

菖蒲

巴豆霜各五

紅豆剉分

川烏頭分五 茯神

丹參炒銖

右件除巴豆霜外為細末另研包巴豆霜旋入末和勻煉

蜜丸如梧桐子大服如土法淡黃連湯下暴無此字

堧○痞氣丸治脾之積名曰痞氣在胃脘右側覆大如盤久不

愈令人四肢不收發黃疸飲食不為肌膚

厚朴制

黃連銖

茱萸銖三

黃芩銖二

白茯苓

人參

澤瀉銖

川烏分五

川椒分五

茵陳炒

乾姜泡

砂仁銖半

白本分

巴豆霜分

桂皮分

陳

○息齋丸治肺之積名曰息齋在右脇下大如覆杯久不愈

令人洒浙寒熱喘咳發肺壅

厚朴八錢

黃連三錢乾姜泡

白茯苓

川椒炒

紫苑錢半川烏泡

桔梗去苦

白芷寇

陳皮錢京三稜泡

麥門冬

人參錢

青皮分巴豆霜分

右件除茯苓巴豆霜各另研旋入外為細末和勻煉蜜丸

如梧桐子大服如上法淡姜湯送下已上四方秋冬加厚

朴減黃連四分之二

○奔豚丸治腎之積名曰奔豚發於小腹上至心下者豚狀或

上或下無時久不愈令久喘逆骨痿少氣及治男子內結
止疝女人瘕聚帶下

厚朴姜制 黃連銕

白茯苓

澤瀉

菖蒲銕 川烏泡

丁香各五

苦練酒煮

玄胡索一錢 全蝎

附子炮

獨活銕

肉桂分 巴豆霜五

右件除芭豆霜茯苓各另研為末旋入外為細末和勻煉
蜜丸如梧桐子大淡鹽湯下服如上法

虛損二十六

論

內經曰飲食飽甚汗出於胃驚而奪精汗出於心持重遠行
汗出於腎疾走恐懼汗出於肝搖體勞苦汗出於脾又曰父
視傷血父卧傷氣父坐傷肉父立傷骨父行傷筋若夫七情

五志之火飛越男女聲色之慾過淫是皆虛損之所由也機
要曰虛損之疾寒熱因虛而感也感寒則損陽陽虛則陰盛
損自上而下一損損于肺皮聚而毛落一損損于心血脉虛
少不能榮于藏府婦人則月水不通三損損于胃飲食不為
肌膚治宜以辛甘淡過於胃則不可治矣感熱則損陰陰虛
則陽盛損自下而上二損損于腎骨痿不能起于床三損損
于肝筋緩不能自收持三損損于脾飲食不能消尅治宜以
苦酸鹹過於脾則不可治矣又曰心肺損而色弊腎肝損而
形痿難經曰治損之法損其肺者益其氣損其心者補其榮
血損其脾者調其飲食適其寒溫損其肝者緩其中損其腎
者益其精是皆虛損病因治法之大要也學者詳之

脉法

脉經曰脉來軟者為虛

緩者為虛

微者為虛

弱者為虛 弦者為中虛 脉來細而微者血氣俱虛

脉小者血氣俱少

要畧曰脉亢者為血虛

脉沉小遲者脫氣

又曰血虛脉大如葱管 又曰脉大而亢者脫血

方法

丹溪曰天為陽而運於地之外地為陰而居乎中天之大氣
舉之曰實也屬陽而運於月之外月缺也屬陰稟日之光
以為明人受天地之氣以生天之陽氣為氣地之陰氣為
血故陽常有餘而陰常不足氣常有餘而血常不足也又
曰經曰精不足者補之以味味陰也補精以陰求其本也
然味乃如穀菽菓菜出於天賦自然冲和之味故有食久
補陰之功非醢醢烹飪調和偏厚之味出於人為者也經
曰陰之所生本在五味非天賦之味乎曰陰之五官傷在

五味非人為之味乎善攝生者不可謂味以補精而遂恣於口腹以自速其禍也又曰形不足者溫之以氣溫養也溫存以養使氣自充氣充則形完矣曰補曰溫各有其旨局方悉以溫熱藥佐輔名曰溫補豈理也哉又曰人年老或虛損精血俱耗陰不足以配陽孤陽幾於飛越天生胃氣尚爾留連又藉冰穀之陰故羈縻而定耳局方用溫劑劫虛蓋脾得溫而食進故亦暫可夫質有厚薄病有淺深設或失手何以收效吾寧稍遲計出萬全溫劑補虛決不敢用

○丹溪治老人虛損但覺小水短少即是病進宜以人參白水為君牛膝芍藥為臣陳皮茯苓為佐春加川芎夏加黃芩麥門冬秋冬加當歸身倍生薑二日或一貼或二貼小水之長若舊乃止此老人養生之捷法也

此丹藥養母之方也

方局○四君子湯治氣虛

人參半錢

白朮

茯苓銘二

甘草錢一

右細切作二服水煎如自汗或小水利者去茯苓加黃芪二錢無汗小水不利者只依本方

方局○四物湯治血虛

川歸錢二

川芎

芍藥銘各一

熟地黃二錢

右細切作一服水煎服春倍川芎夏倍芍藥秋倍地黃冬倍當歸

○八物湯治氣血兩虛

四君子合四物湯共為二劑如上法加減煎服

○六君子湯治氣虛挾痰方見饒逆門

○局方十全大補湯治氣血俱虛而挾寒暑

人參

黃芪

甘草

白茯苓

當歸

白朮

白芍藥

肉桂

熟地黃

芍藥各等分

右細切每服一兩重加生薑三片大棗一枚水二大盞煎

至三盞溫服詳前論

○大補陰丸降陰火補腎水

黃柏鹽酒拌新瓦

知母去毛酒拌濕

熟地黃酒洗焙乾用

龜板酥炙黃

右細末猪脊骨髓和煉蜜為丸如梧桐子大每服五九空

心姜鹽湯下

溪○補陰丸一名虎潛丸

黃柏半斤如

熟地黃各三兩

白芍藥煨

陳皮

牛膝各二兩

虎脛骨一兩

瑣陽酥

當歸各半

丹

○加味虎潜丸

人參

當歸酒洗

虎脰骨酥

破故紙少

熟地黃兩

右為細末煉蜜和猪脊骨髓為丸如梧桐子大每服五六

十丸温酒或姜盐湯下

○滋陰大補丸

川牛膝去

山茱萸去

茴香炒

黃芪

山藥略

龜板酥

杜仲姜汁拌

熟地黃兩

右為細末煉蜜和猪脊骨髓為丸如梧桐子大每服五六

十丸温酒或姜盐湯下

○滋陰大補丸

山藥略半

五味子

遠志去心甘草

芍藥煨

瑣陽酥

兔絲子

五味子

杜仲姜汁拌

右為細末煉蜜和猪脊骨髓為丸如梧桐子大每服五六

十丸温酒或姜盐湯下

○滋陰大補丸

杜仲姜汁拌

白茯苓

遠志去心甘草

黃柏鹽酒

枸杞子

兔絲子

五味子

杜仲姜汁拌

右為細末煉蜜和猪脊骨髓為丸如梧桐子大每服五六

十丸温酒或姜盐湯下

○滋陰大補丸

杜仲姜汁拌

白茯苓

遠志去心甘草

黃柏鹽酒

枸杞子

兔絲子

五味子

杜仲姜汁拌

右為細末煉蜜和猪脊骨髓為丸如梧桐子大每服五六

十丸温酒或姜盐湯下

○滋陰大補丸

杜仲姜汁拌

白茯苓

遠志去心甘草

枸杞子銘五熟地黄兩二

右為細末紅棗肉和煉蜜為丸如梧桐子大每服七十丸
淡鹽湯或溫酒空心下與上虎潛丸相間服之佳所謂補
陰和陽生血益精潤肌膚強筋骨性味清而不寒溫而不
熱非達造化之精微者未足以議於斯也

丹○補腎丸

黃柏

龜板兩二

杜仲各依前制

牛膝

陳皮兩二

乾姜五錢

五味子一兩夏用之

右為細末姜汁糊或酒糊為丸服溫酒或白湯空心下

○補天丸

紫河車

一具即產後胞衣也古方不分男女世傳男用女

可待但求肥盛婦人無病者俱可用初勝似為有理若不
淨去筋膜以養氣盛之外以繼糊使不泄氣焙乾要用
一時以米醋浸一宿焙乾用

右以前補腎丸藥為末同河車再研極細酒糊為丸或新
取紫河車蒸熟同前藥末搗爛為丸亦可

○虛勞者當以骨蒸藥佐之一云氣虛加補氣藥血虛加
補血藥

○一方用側柏葉烏藥葉俱以酒浸九蒸九曝亦同紫河
車為丸名補腎丸

方局 ○六味地黃丸治腎經虛損久新憔悴盜汗發熱五藏齊損

瘦弱虛煩骨蒸痿弱下血咯血等証

乾山藥

兩四

山茱萸

牡丹皮

白茯苓

兩三

熟地黃

兩八

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十九白湯下

方局 ○人參固本丸

天門冬

去心

麥門冬

去心

生地黃

兩二

人參

去心

兩二

熟地黃兩

右各焙乾同磨為末勿犯鉄器煉蜜為丸或只以天門冬熟地黃二味量酒浸搗膏同三味末拌千餘下丸如梧桐子大每服五七十九空心姜鹽湯下忌蘿蔔

新○人參膏

人參一味不拘多少去蘆細切量水於銀石器內慢火煎如稠錫磁器盛貯每服一匙白湯點服

陳○補中益氣湯治飲食失節勞役所傷暴傷元氣惡寒發熱証似傷寒者方見內傷門

陳○益胃升陽湯血脈益氣古聖人之法也先補胃氣以助生發之氣故曰陽生陰長諸甘藥為之先務藥世皆以為補殊不知其能生血從陽而引陰也故先理胃氣益人之身穀為寶也

柴胡

升麻

各二分半

炙甘草

當歸身酒

陳皮略五

人參

秋嗽用

炒神麴各七分半

黃芪錢一

白朮半錢

生黃芩

分二

右細切作二服水二盞煎至一盞溫服○如腹中痛每服

加白芍藥五分中桂二分如渴或口燥加葛根三分

氏嚴

○芫附湯治陽虛氣弱虛汗大出不止肢體倦怠

川附子炮

黃芪

蜜炙各二錢

右細切作二服加生薑三片大棗一枚水一盞半煎至一

盞溫服

氏嚴

○參附湯治真陽虛之上氣喘急自汗盜汗短氣頭旋眼花

人參兩

川附子

炮去破

右細切分作二服加姜水煎溫服

生絡○扶神湯治六脉虛羸咳則心痛喉中介介或種或痛

茯神

人參

遠志

通草

麥門冬

黃芪

桔梗各六

甘草

五味子各二

右細切一作一服加生薑一片水煎服ス

端方

○補氣湯治氣虛脉浮而軟怔忡無特

黃芪各二

人參

甘草各一

麥門冬各二

桔梗各七

右細切一作一服加生薑三片水二盞煎至二盞溫服ス

○千金延壽丹治諸虛百損怯弱欲成癆瘵及大病後虛損不

復元人於中年後常服可以卻疾延年

五朮子

兔絲子另煮爛川牛膝

杜仲麥汁拌炒

川歸

山藥

天門冬

麥門冬

生地黃

熟地黃各兩

肉從容各二

人參

白茯苓

大茴香

澤瀉

地骨皮

鹿茸

菖蒲者即

花椒

巴戟法

遠志

覆盆子

枸杞子

栢子仁各五升

右共磨為細末勿犯鉄器蒸搗煉蜜為丸如梧桐子大每服一百丸空心温酒或姜鹽湯下○如不便澹小便不利加車前子二兩○如精滑或夢遺加赤石脂山茱萸肉各五錢忌蘿蔔菜妙方也

青囊集方

○班龍丸治真陰虛損及老人虛人常服延年益壽

鹿角膠妙子成鹿角霜

兔絲子酒浸栢子仁取仁

熟地黃各半白茯苓

補骨脂各四

右磨為細末酒煮米糊為丸或以鹿角膠入好酒洋化為

丸如梧桐子大每服五十九丸空心姜鹽湯下昔蜀中有

老人貨此藥於市自云壽三百八十歲矣每飲曰尾間不

禁滄海竭丸轉金丹都護說惟有班龍頂上珠能補玉堂
関下血當時有學其道者傳得此方彼老人化為白鶴飛
去不知其所終

○桂枝加龍骨牡蠣湯治六脉孔動微緊男子失精女人夢
交及盜汗自汗等証

桂枝

白芍藥 藥錄三 甘草 藥錄二 龍骨

牡蠣 藥錄三

右細切加姜棗水煎愚恐上証不可用姜

○祖傳經驗秘方治心虛手振

川歸身

汾甘草

生地黃各一兩半 川芎一兩

遠志去心兩分

酸棗仁

栢子仁各三兩 人參一兩

辰砂五兩

金鉤二十

射香錢一

琥珀錢三

茯神錢七

膽南星錢五

半夏錢五

石菖蒲錢六

右為極細末蒸餅為丸如棗豆大辰砂為衣每服七八十
九津唾嚥下或姜湯送下

○本邑在城金儒元國子生也年五十餘身畧瘦十年前得內
傷挾外感証一醫用發表疎利之劑十數日後熱雖退而
虛未復胸中痞滿氣促眩暈召予治以補中益氣湯間與
東垣消痞丸陳皮枳朮丸等藥調理而安但病根未盡除
而住藥故眩暈或時而舉不甚重來允至此年因往杭城
跋涉辛苦又兼色慾之過還家眩暈大作歷數醫皆與防
風羌活荆芥南星半夏蒼朮等去風散溫消痰之劑病愈
重一日十數次厥去片時復甦凡動或轉側即厥不知不
事舉家惶惶叫哭召予治診其六脉皆浮洪而濡予曉之
曰此氣血太虛証幸脉不數而身無太熱不死但恐病愈
後而有數年不能下擲行動病者曰只要有命卧亦甘心

與大補氣血之藥倍人參黃芪或加附子引經合大劑一
日三貼又煎人參膏及作紫河車丸補陰丸之類間服如
此調理二月餘服煎藥二百餘貼丸藥三五料用人參五
六斤其証漸不厥飲食如故但未能行動耳次年聞王布
政汝言往京師道經蘭溪以舟載去彼俟候求診王公曰
此証陰虛風痰上壅因誤服參芪多故病久不愈立方以
天麻菊花荆芥川芎等清上之藥亦未見效佳藥後越五
六年方得起而步履如初儒元不思昔日病劇而藉參芪
等藥之功遂以王公之語歸咎於予用藥之誤噫彼時若
非峻補何以得一儒元見王公耶嗚呼此誠得魚忘筌得
兔忘蹄也可勝嘆哉

○東陽邑庠鄒掌教先生一証發大汗戰鼓慄振掉片時許發
燥熱身如火燒又片時許出大汗如雨身體若冰冷而就

發寒戰如前寒後又熱熱後又汗二病繼作而晝夜不息
庠生盧明夫與作癰証治不效召予診其右寸陽脉數而
浮洪無力陰脉畧沉小而亦虛左三部比右差小而亦浮
軟予曰此陽虛証也用補中益氣湯倍參芪減升柴一半
加尿浸生附子一錢半炒黃柏三分乾姜薄桂各五分太
棗一枚同煎服一服而病去二分二服而減半四服寒熱
止而身尚有微汗減去桂附乾姜一半服二貼全愈

勞極 二十七

論

內經曰陰虛上內熱又曰陰氣者靜則神藏躁則消亡飲食
自倍腸胃乃傷又曰有所勞倦形氣衰少穀氣不盛上焦不
行下脘不通而胃氣熱七氣薰胸中故內熱是故欲養陰而
延生者心神宜恬靜而毋躁擾飲食宜適中而無過傷風寒

暑濕之謹避行立坐卧之有常何勞怯之有哉今也嗜慾無節起居不時七情六慾之火時動乎中飲食勞倦之過屢傷乎体漸而至乎真水枯竭陰火止炎而發蒸七之燥熱或寒熱進退似瘡非瘡古方名曰蒸病或二十四種或三十六種名雖不同証亦少異大抵不過咳嗽發熱咯血吐痰白濁白淫遺精盜汗或心神恍惚憂與鬼交婦人則月閉不通日漸羸漸成勞極之候夫病此者始多求先姑息日久直至發熱不休形体瘦甚真元已脫然後求醫治瘵雖倉扁復生莫能救其萬一良可嘆哉雖然一人未足憐也况其侍奉親密之人或同氣連枝之屬董陶曰久受其惡氣多遭傳染名曰傳屍又曰喪屍曰飛屍曰遁屍曰殭殭曰屍注曰鬼注蓋表其傳注酷虐而神妙莫能以則之名也雖然未有不由氣體虛弱勞傷心腎而得之者初起於一人不謹而後傳注數十

百人甚而至於滅族滅門者誠有之矣然此病最爲可惡其
熱毒鬱積之久則生異物惡虫食入臟府精華變生諸般奇
狀誠可驚駭是以勞傷于肝膽者則爲毛虫如刺蝟毛虫之
屬食入筋膜勞傷于心與小腸者則爲羽虫如燈蛾蚊蠅食
鳥之形食入血脉勞傷于脾胃者則爲裸虫如嬰孩蚯蚓之
類食入肌肉勞傷于肺與大腸者則爲介虫如龜蟹蝦蟹之
狀食入膚膏勞傷于腎與膀胱者則爲鱗虫如魚龍蛟蜃之
形食入骨髓或挾相火之勢亦如羽虫之酷者鴉集之類爲
狀不一不可勝紀凡人覺有此証便宜早治緩則不及事矣
治之之法一則殺其虫以絕其根本一則補其虛以復其真
元分經用藥各有條理務如庖丁解牛動中肯綮無有不安
者也若待病勢已劇元氣已脫雖依古法取虫滋補患者不
無一生但亦可絕後人之傳注耳學者詳之

脈法

脈經曰男子平人脈大為勞極虛亦為勞

男子勞乏為病其脈浮大手足煩春夏劇秋冬瘕陰寒精自出足痠軟不能行少陰虛滿

人年五十六十其病脈大者臂俠背行痛苦腸鳴馬刀挾癭者皆為勞之得

男子平人脈虛弱微細者喜盜汗自出也

男子面色薄白血渴及亡血卒喘心悸其脈浮者裏虛也

男子脈虛沉弦無寒熱短氣裏急小便不利面色白時時目

瞑此人喜衄小腹滿此為勞使之然

男子脈微弱而遊為無子精氣清冷也

夫朱精家小腹強急陰頭寒目眶痛目弦髮落脈極虛孔遲為消穀亡血失精

脉得諸孔動微緊男子失精女入夢鬼交通

脉沉小遲者名脫氣其人疾行則喘喝手足逆寒腹滿甚則

瘕泄食不消化

脉弦而大弦則為減大則為乳減則為寒乳則為虛虛寒相

搏此名為革婦人則半產漏下男子則亡血失精

方法

丹溪方法
凡四條

丹溪曰此陰虛之極痰與血病多有重者其傳死一証不可

云無太法四物湯加童便竹瀝姜汁

○身瘦屬火因火燒燬也肉脫甚者難治

○氣血虛甚發熱成勞者補天九加骨蒸藥佐之

骨蒸藥知母
黃柏地骨皮

麥門冬秦元青蒿散
石膏竹葉烏梅之類

○傳屍勞寒熱交攻久嗽咯血日益羸瘦先以三拗湯次以蓮

心散

丹溪方 ○二十四味蓮心散

川歸

黃芪

甘草炙

鼈甲醋炙

前胡

柴胡

獨活

羌活

防風

防己

茯苓

半夏

黃芩

陳皮

阿膠炒成

官桂

芍藥

麻黃根不去

杏仁研

蓮肉此味當用蓮花內鬚

南星

川芎

枳殼半錢炒各

芫花醋炒黑

右細切作一服加生薑三片大棗一枚水一盞煎至三盞去粗溫服須待吐有異物芫花漸減少蓋芫花反甘草所以殺蟲炒之所以斷熱去寒妙處在此

丹溪 ○青蒿飲子治癆瘵

青蒿一斗

童便三升

右以文武火熬約童便減去二斗去蒿再熬至一升入猪

膽汁七箇或加辰砂煨柳末三五錢再熬數沸并草未收之每服抄一匙清湯點服極妙

冊○白礬塵一味大殺瘰癧虫可入丸藥散中用

天靈蓋耐炙黃色 蟹甲耐炙黃色 柴胡去苗各二錢半 木香一錢二分

鼓心耐炙黃色 青蒿半握 阿魏錢一 桃仁二十枚另研去皮

安息香錢一 貫衆二錢半 甘草一錢生用

右十一味細切并為粗末先以童子小便二升隔夜浸露星月至四更時煎至八分去粗分作三服每服調後散子一貼五更初溫服即穩卧至三點時又進一服至日出時覺腹中欲利如未利又進一服已利勿服

○散子方用檳榔二錢半 辰砂一分半 射香一錢 另礬

赤脚蜈蚣以竹筒盛姜汁浸焙乾一條

烏雞糞二錢半先將雞於五日煎以

右以五味研為細末和勻分為三貼各入煎藥內服
凡合上藥宜於六甲建日或除日合之服前藥必利下
惡物併虫以盆盛之急用火燒殺之或油煎殺之其病
人所穿衣服及薦褥盡易燒之食葱粥將息以復元氣
服藥後或夢人哭泣相別是其驗也如取下虫視其色
青赤黃者可愈黑色者難療也雖虫老病不可療亦能
絕後人之傳注耳合此藥時不可容孝子婦人雞犬見
之及不可令患者知之與聞其氣息虫聞氣變化難取
也

青囊方

○治勞察取虫經驗天靈蓋散

天靈蓋二指大用白檀香煎湯洗一錢炙黃色射香三錢研另辰砂一錢研

栴櫚五箇阿魏二錢研
井遂二錢珠者二

安息香

三細研銅刀

右七味各研極細和勻每服二錢後湯調下

薤白

二七青蒿握

甘草

五寸葱白

桃枝

柳枝

桑枝

酸石榴枝

梅枝

七寸配東南者

右九味用童子小便四升於銀石器內以文武火煎至

一升去粗分作三盞調前藥末服五更初服一盞服後

如覺欲吐以白梅肉噙止之五更盡覺臟府鳴須轉下

虫及惡物黃水若一服未下如人行五七里又進一服

至天明又進一服如瀉不止用龍骨黃連等分為末熟

水調下五錢或吃白粥補之此藥男病女煎女病男煎

不可令患者知及不孝子僧人雞犬見之

○射香散治男子婦人骨蒸發熱五勞七傷等証

醫方正傳

卷之三

七

天靈蓋

半一錢 柴胡

兩一

犀角屑

兩一

甘草

三寸

東引桃枝

東引柳枝

東引桐枝

青蒿

各一握

阿魏

另研一錢

薤白

葱白

射香

半二錢

右細切

杵為麤末

用童便

二升半

浸藥

一宿

明日

早煎

至一升半

去粗分作二服

再服

入枳殼細末

三錢

溫服

五更初進

一服

約人行五七里

再進一服

若惡心

元九

欲吐嚼白梅

止之三服

後瀉出惡物

果虫或身如蟻行

不可名狀

後用葱粥

止之忌風一月

及忌食油膩濕麪

鹹酸并牛羊雞猪大肉魚腥

并遠重病不過二服全安

脩合此藥時

男病女煎

女病男煎

忌猫犬雞鷄鴨驢馬

僧尼孕婦孝子

見之凡取虫後須

以後大補疾神散補

之

之

之

青囊

○取

屍虫

神仙秘方

青桑枝

柳枝

梅枝

桃枝

石榴枝

拾七莖俱長七
昔取東引者

青蒿

葱白

阿魏

一錢
安息香一錢
另研

右除阿魏安息香二味外餘藥用童小便一升半者煮

一半去粗將藥汁阿魏安息香細研用煎十數沸分作

二服調

辰砂末

換柳末

各五射香
另研

右三味亦分作二服入煎湯五更初進一服三點時又

進一服至巳午晚必取下虫其紫紅者可治青黑者不

治但可絕後人之傳注耳取虫後進軟粥溫和將息忌

食生冷毒物仍服帝九子法凡合此藥不可令患者先

知氣味亦不得令滿大孕婦孝子僧尼等不祥人見之

○神授散此方得之於河南郡王府濟世既久功不可述也

川椒
二斤
梗
畧炒
出牙
者

○右勞極禁方無比丸

一名各紫河車丸一名調鼎方

○傳屍勞瘵之証二月可愈其

愈者真齊世之寶也根一管治一婦人用花被二分苦煉
氣未盡脫絕者不須多方服食但能早用此藥無有不
心酒下或米湯下凡得傳屍勞病氣血未甚虛損元
為丸如梧桐子大每服二三十丸漸加至八九十丸
右一味為細末每服二錢空心米湯送下或用酒米糊

紫河車男一具初生者佳或無病壯年婦人者亦可一說
米醋浸一宿焙乾用

草龍胆

甘草炙各二錢

鱉甲醋炙半兩

桔梗

胡黃連

大黃酒拌濕蒸

苦參

黃柏

知母去毛

貝母去心

秋石另研不

必用煎煉者但

洗叙各人上中各二錢

犀角屑研上

蓬莪朮

硝石各一錢

敗鼓皮心草

謂鼓心通靈能

逐飛屍一注故用之
米醋炙黃二錢半

右共為細末煉蜜為丸如梧桐子大辰砂為衣每服二
十丸加至三十丸溫酒送下腸熱食前膈熱食後服

青囊

秘傳取勞虫藥方

啄木禽一隻右用硃砂四兩精猪肉四兩將肉切作片子
其硃砂杵如菉豆大塊一味拌勻饒食一晝夜食肉盡
為度以鹽泥固濟其禽在內剛火煨一夜來日不見太
陽取出不得打破埋入地中二尺許一晝夜取出去鹽
泥銀石器內研為細末以無灰酒入射香少許作一服
調下置患者在帳中四下緊閉用鉄鉗等候其虫必從
口鼻中出即以鉗鉗入沸油中煎殺之如虫出之後便
進局方嘉禾散一服軟粥得息

青囊

紫河車丹治飛屍鬼注虛勞羸瘦喘嗽痰氣等証其法

取首生男子胞衣以皂角水洗淨次放銅銚子內以米醋擦洗控乾做一小篋籠于盛之圍以紙密糊之不令泄氣以烈火焙乾加入後藥

人參半一兩

白朮兩一

木香

白茯苓各半兩

茯神

川歸

熟地黃略一

乳香四錢另研

沒藥四錢另研

硃砂二錢另研

射香二分

右為細末和勻酒糊為丸如梧桐子大每服五十九煎人參湯送下日三服空腹服之煉蜜為丸服亦可

○治虛勞柴胡散

柴胡

人參

茯苓

桔梗

芍藥

川歸

青皮去白

麥門冬各二分

甘草一分

右細切作一服杵細水一盞煎七分溫服

方青囊 ○治虛勞驚中散

驚中大者一箇醋煮柴胡去聲

川歸

甘草炙

桔梗

芍藥

人參各

射香分五

杏仁去皮尖

胡黃連各二

官桂半兩

地骨皮

宜黃連錢半

真酥三兩

木香兩

白沙蜜兩

右為細末用青膏一片童便五升熬膏高汁約二升

去粗入酥蜜再熬成膏候冷入藥末攪和為丸如梧桐

子大每服十五丸溫酒送下米飲亦可日進三服如秋

冬時更入桃柳心七箇與前柴胡散同煮間服之

○去三屍九虫貫衆丸

貫衆五分

乾桑三分

厚朴三分

白蘞蘆二分

雄黃三分

狼牙四分

桐子大

右件培乾炒令黃色研為細末煉蜜為丸如梧桐子大

雷丸四分

赤虫殺

雄黃三分

狼牙四分

桐子大

右件培乾炒令黃色研為細末煉蜜為丸如梧桐子大

右件培乾炒令黃色研為細末煉蜜為丸如梧桐子大

右件培乾炒令黃色研為細末煉蜜為丸如梧桐子大

新汲水下五九三服後漸加至十九服之二十日百病皆愈三屍九虫盡滅更無傳生之患耳

○治勞嗽輕骨散

烏梅

龍胆草

胡黃連

貝母

知母

鱉甲細

桔梗

秦艽

柴胡

甘草炙

梔子

人參

青蒿酒

阿膠炒成

杏仁去皮

右件各等分晒乾為末用好京墨一塊以井花水磨調前藥末作餅子如大指頭大透風處陰乾二七日每用一餅以井花水磨化又用沒藥五分磨成一盞更加黃栢末二錢同煎數沸傾入盞內頻頻打轉於五更時輕輕起服服後就睡仰臥甚者不過三服

○治勞嗽蛤蚧散

白茯苓

銚一兩去皮細切入

桑白皮

銚二兩以真

知母

二兩去毛用

醋炙

杏仁

六兩去皮尖及杏仁者

甘草

三兩醋炙三五

貝母

二兩用醋

蛤蚧

雄雌一對醋炙內浸透慢火乾再

乳香

真者四十兩切作散子大塊入銚內溶成汁入極

稀不

堪用 人參 一兩用醋炙三五

右為末每服二錢水一盞煎至七分和粗服忌油膩生

冷毒物如久患嗽者初服此藥必闕嗽加甚須勤服以

則可安湏自保養為妙

青囊方

○治勞熱蛤蚧飲子

蛤蚧一對洗淨酒醋浸炙

黃芩兩

麻黃

根節去

胡黃連

秦艽去

甘草生

生地黃

酒浸

熟地黃酒

青蒿

人參

柴胡去

知母酒洗

貝母

杏仁

去皮尖及双仁者另炒以上各五錢

鱉甲

醋炙一兩酒

桔梗

草龍胆

木香

錢二

右為細末每服二錢加為梅姜棗煎服

△附蒸病

冊○古今錄驗五蒸湯

人參

知母

黃芩錢一

竹葉七片

生地黃

乾葛錢一

茯苓錢一

甘草錢半

石膏二錢

梗米一合

右細切先以水三盞煎小麥二合至二盞去麥煎藥至

一盞溫服隨証加減于後

○實熱加黃芩

黃柏

黃連

大黃

○虛熱加烏梅

秦艽

柴胡

蛤蚧

牡丹皮

青蒿

鱉甲

○肺蒸鼻乾加

加梅

天門冬

麥門冬

紫苑茸

大腸蒸乾加右鼻孔

加大黃

芒硝

皮蒸唾血

加石膏

桑白皮

膚蒸皆目赤

加牡丹皮

氣蒸遍身氣熱加喘促

加人參

黃芩

梔子

○心蒸乾

加黃連

生地黃

木通

小腸蒸下唇

加赤茯苓

生地黃

桂心

血蒸髮

加生地黃

當歸

生地黄

童便

脉蒸唾白加滯語

加生地黄

當歸

生地黄

○脾蒸居

加白芍藥

木瓜

苦參

胃蒸舌下

加石膏

粳米

大黃

芒硝

乾葛

肉蒸食無味而嘔

○肝蒸眼

加川芎

加白芍藥

前胡

膽蒸白眼

加柴胡

括萎

筋蒸甲焦

加川歸

川芎

三焦蒸作熱

加石膏

竹葉

○腎蒸兩耳

加生地黃

寒水石

石膏

知母

膀胱蒸右耳

加澤瀉

茯苓

滑石

腦蒸頭眩

加生地黃

防風

羌活

骨蒸齒黑腰痛足逆

加生地黃

加生地黃

地骨皮

鱉甲

當歸

牡丹皮

髓蒸中熱

加生地黃

當歸

天門冬

醫蒸肢細肢腫

加石膏

黃柏

胞蒸小便赤黃

加澤瀉

茯苓

生地黃

活石

沉香

○丹溪活套云勞極之証五藏必歸重於一經假如足脛痠疼腰背拘急遺精白濁面色黧黑耳輪焦枯脉沉細數知其邪在腎也宜以四物湯加知母黃柏五味子麥門冬天門冬澤瀉杜仲肉桂之類煎入童便韭汁竹瀝服○其或心神驚惕怔忡無時盜汗自汗心煩熱悶口舌生瘡咯血面赤脉洪而數知其邪在心也宜以前方去杜仲澤瀉肉桂加茯神胡黃連蓮心遠志菖蒲硃砂之類○其或咳嗽喘促衄血嗽血皮膚枯燥鼻塞聲沉時吐痰沫脉微虛而瀼數知其邪在肺也宜以四物湯加少參麥門冬五味子知母貝母桔梗桑白皮地骨皮款冬花紫苑馬兜鈴百合白部之類煎入童便竹瀝姜韭汁服○其或脇痛目赤面青頰赤多怒虛陽不斂夢與鬼交甚則卵縮筋急脉弦而數

知其邪在肝也宜以四物湯加竹茹草龍胆柴胡黃芩青
皮竹葉之類○其或面色萎黃唇焦燥飲食無味腹痛
腸鳴瀉利四肢倦怠脉虛濡而數知其邪在脾也宜以四
君子湯加酒炒白芍藥蓮肉薏苡乾山藥猪苓澤瀉白扁
豆之類○凡腎蒸勞熱元氣未脫者灸崔氏四花六穴無
有不安者也

○灸崔氏四花穴法

先二穴令患者平身正立取一細繩蠅之牙於男左女右脚底
貼肉堅踏之其繩前頭與大拇指端齊後頭循當脚根中
心向後引繩從脚脰肚貼肉直上至曲脊中大橫紋截斷
橫紋即委中穴又令患者解髮分兩邊令見頭縫自顙門平分至
腦後却平身正坐取向所截繩一頭令與鼻端齊引繩向
上正經頭縫至腦後貼肉垂下循脊骨引繩向下至繩盡

處當脊骨中以墨點記之是墨點不又取一繩子今患人
口將繩子按於口上兩頭至吻却鈞起繩子中心至鼻柱
根下如公此便齊兩吻截斷將此繩展令直於前量脊骨
上墨點處橫量取平勿令高下其量口繩子先中稍當
量却以中稍墨點記處按於脊骨中先點處兩頭是穴也

兩頭以白圈記之

以上是第一次點二穴

次

二穴今患人平身正坐稍縮臂膊取一繩繞項向前雙垂頭

與鳩尾齊

間畫處也雙頭齊截斷却翻雙繩頭向後以繩

子中心按於喉嚨結骨上其繩兩頭雙垂循脊骨以墨點

記之

是墨點不

又取一繩子令患人合口橫量齊兩吻截斷

還於脊骨上墨點橫量如法繩子兩頭以白圈記之

白圈是灸處

以上是第一次點二穴通前共四穴同時灸各三壯

壯累灸至一百餘壯候灸瘡將瘡又依後法灸二穴

又次二穴以第三次量口吻繩子於第二次雙繩頭盡處墨點
上當脊骨直上下豎點其繩子中心放在墨點上於上下
繩頭盡處以白圈記之白圈是灸處也

以上是第三次點穴也通前共六穴也擇取離日
及火日灸之丁應虛勞發熱痿痺等証灸之立愈真
濟世之妙法也

四花六穴人形圖式



白圈是穴黑點不是穴

