

便濁遺精

五

淋閉

九

秘結十六

黃疸

廿

瘡瘍

廿七

癰疽

六十五


破傷風

七十三

醫學正傳

卷之六







京板校正大字醫學正傳卷之六目錄

○便濁門 五十六

論

脉法

丹溪方法

九十九條

於本

治便濁九藥方

半苓丸

燥濕痰白濁方

萆薢分清散

水陸二仙丹

祖傳經驗秘真丹

○淋閉門

五十七附關格

論 脉法

丹溪方法 九九

參苓琥珀湯

老人氣虛淋閉方

通關丸 即補腎丸

賢疽湯

二陳加升提藥方

虛癆便濁方

妙香散

治濁固本丸

定志珍珠粉丸

已試醫驗一條

琥珀散

小便黃澁方

清肺飲子

小薊湯

八正散

埤珠粉丸

張子元氣血兩虛

秘真丸

九龍丹

丹溪活套

傷寒後脫陽方

下焦無血小便澁方

導氣除燥湯

八正散

八正散

八正散



牛膝膏

茯苓湯

倒換散

葵子散

濟生葵子散

琥珀散

鐵脚丸

廣濟雞蘇飲子

又方治小便不通

集驗治小便淋瀝方

石膏散

祖傳經驗方

治小便溺血方

又治溺血方

治沙淋莖痛方

孕婦轉胞方

又治血淋方

關格難經法語

附用溪關格方法

九三條

祖傳經驗方

已試醫驗一條

○秘結門五十八

論脉法

丹溪方法九二條

脾約丸

通幽湯

潤燥湯

潤腸丸

麻黃白朮湯

升陽瀉熱湯

活血潤燥丸

潤腸湯

潤體丸

脩急大黃丸

枳殼丸

枳實導滯丸

已試醫驗二條



○黃疸門 五十九

論

脉法

丹溪方法五條

治黃疸方

又治氣實黃疸方

小溫中丸

大溫中丸

調胃承氣湯

治黃疸法語

凡四條

大黃栢桅芒硝湯

又治疸法証

凡四條

硝石礬石散

治酒疸方

茯苓湯

治穀疸方

胃苓湯

腎疸湯

茵陳五苓散

茵陳茯苓湯

梔子大黃湯

半溫半熱湯

茵陳蒿湯

茵陳大黃湯

梔子栢皮湯

茯苓滲濕湯

小茵陳湯

茵陳四逆湯

葶藶苦參散

當歸白朮湯

抵當湯

見傷寒門

針砂丸

綠礬丸

棗礬丸

祖傳經驗褪金丸

已試醫驗一條

○瘡瘍門 六十

論

脉法

丹溪方法

凡二十二條



取刺骨法

升陽益胃散

治背疽

當歸羌活湯

治腦疽

栳榔散

飲膽口

千金托裏散

治背疽

卅溪治背疽方

卅溪治附骨疽法

羌活防已湯

治附骨疽

托裏黃芪酒煎湯

黃連消毒飲

治附骨疽

黃芪柴胡湯

治附骨疽

卅溪治腎癰方法

內托羗活湯

治癰

卅溪治內疽方法

卅溪治肺癰方法

入治肺癰方法

黃昏湯

治肺癰

葶藶大棗瀉肺湯

蓄葉湯

治肺癰

桔梗湯

治肺癰

又治肺癰方

又治肺癰方法一條吐膿血如肺癰方祖傳經驗治肺癰方

卅溪治腸癰方法

千金論腸癰法語

要畧治陽癰方

腸癰灸法

意苡附子敗醬散大黃牡丹湯已試醫驗一條

卅溪治乳梗方法

治乳癰方

又治乳癰方法

升麻托裏湯

程石香治妳岩法

十六味流氣飲

單黃青皮湯

橘葉散

丁香散

治妳頭破裂



丹溪治囊癰方法

癰疽入囊方

野紫蘇治囊癰方

丹溪治便毒方法

又治便毒方

又便毒成膿方

石香程氏便毒方法

蘇方木散治便毒

玉燭散治便毒

牡蠣大黃湯治便毒

丹溪治瘰癧方法

又治瘰癧方法

治血少馬刀瘡方

程石香論治瘰癧方法

蟾酥膏治瘰癧

綠雲膏治瘰癧

金寶膏治瘰癧

龍珠膏治瘰癧

救苦化堅湯

柴胡連翹湯

消腫湯

柴胡通經湯

散腫潰堅湯

升陽調經湯

連翹散堅湯

龍泉散

三聖丸

立驗大聖散

玉屑妙靈散

六丁神散堅二十一日

濟生破結散治瘰癧

南星散治瘰癧

又治瘰癧方法

龍珠膏見前條

流氣飲見前條

丹溪治瘰癧氣方法

丹溪治結核方法

又治臂核方

耳後頂門有核方法



程石香論疔腫方法

返魂丹

拔疔法

奪命丹

雄黃丸

化毒丸

獨蟾丸

雄射湯

二活散

取疔散

解毒丸

賀監先生解毒丸

萬病解毒丸

千金漏蘆湯

取疔腫方

破毒散

灸疔腫法

祖傳經驗秘方

活鬼丹

治惡瘡方

治諸惡瘡方

又治諸惡瘡方

又治惡瘡方

天泡瘡方

條二

脚上沙瘡方

裏外腫瘡方

條四

桃花散

主肌內

火燒湯泡瘡方

又治火燒湯泡瘡方

下疳瘡方

條二

頭瘡方

金絲瘡方

手癰瘡方

沙瘡方

瘡痒不可忍方

疥瘡方

白癰風癰方

風癰疔瘡方

癰瘡方

身虛痒方

又遇身虛痒方

秘傳一擦光方

又治疥瘡及癰頭方



五香連翹湯

內托復煎散

白芷升麻湯

托裏散

又托裏散

烏金散

黃芪六一湯

治一切瘡癰方

內托護心散

小五香湯

復元通氣散

金銀白芷散

正鐵穢散

大鉄穢散

三消散

雲母膏

太乙膏

神異膏

祖傳萬槌青雲膏

又經驗治癰腫方

猓簽散

又治緒般癰腫神効方

○癰風門 六十一

論

脉法

丹溪方法凡五條

換肌散

醉仙散

通天再造散

愈風丹

一家治癰疾法

又一家治癰疾法

又治手指攣曲法

加減通聖散

神仙紫花丸

治跌撲傷損方

治骨損方

元戎接骨丹



論損傷宜補氣血

治金瘡方

又治金瘡方

治損傷腹痛方

當歸導滯湯

雞鳴散

沒藥乳香散

杖丹膏藥方

河間沒藥散

○破傷風門 六十二

論 脉法

丹溪方法一條

菴活防風湯

白朮防風湯

小芎黃湯

大芎黃湯

發表雄黃散

大蜈蚣散

大菴活湯

防風湯治破傷風

小蜈蚣散

左龍丸

小菴活湯

養血當歸地黃湯

雄黃散治表藥

地榆防風散

白朮湯

江鰮丸

祖傳經驗秘方

已試醫驗一條

附翻花瘡



新刊京板校正大字醫學正傳卷之六

花溪恒德老人虞 搏天民編集

姪孫虞守愚惟明校正

金陵三山街書肆松亭吳江繡梓

便濁遺精

五十六

論

內經曰諸轉反戾水液渾濁皆屬於熱夫便濁之証因脾胃之濕熱下流滲入膀胱故使便溲或白或赤而渾濁不清也原病式曰如夏月天氣熱甚則水液渾濁林木流津是也血虛而熱甚者則為赤濁此心與小腸主病屬火故也氣虛而熱微者則為白濁肺與大腸主病屬金故也丹溪曰大案多是濕痰流注宜燥中宮之濕又曰治宜燥濕降火兼升舉之法此皆至要之語也外有遺精滑泄之候與濁相類不可一例而推夫遺精者多夢與鬼交而泄名曰夢遺或隨溲溺而



出謂之精滑亦有思想無窮所願不遂而得之者治宜安心神以降火又有因好色太過房勞致虛而得之者治法宜滋水藏以復真陰是皆千古不易之定論也學者詳之

脉法

兩尺脉洪數必便濁朱精

女人尺脉濇而弱者或洪數而促者皆為便濁白帶

心脉短小因心虛所致必遺精便濁

方法

丹溪方法  
凡十九條

丹溪曰便濁屬濕熱有痰有虛赤屬血由小腸屬火故也

白屬氣由大腸屬金故也

○大率皆是濕痰流注宜燥中宮之濕赤者乃是濕傷血

○胃中濁氣下流滲入膀胱

○肥白人多痰



○治宜<sub>難</sub>濕降火兼升提之大法二陳湯加二木升柴赤者加白芍藥煎服

○一人便濁嘗有半年或時夢遺形瘦作心虛主治以珍珠粉丸和定志丸服效見怔忡門

○夢遺主熱精滑主濕熱止則流通故也

○內傷氣血虛不能固守當補以八物湯加減吞搗木根丸

○太法用青代海石黃柏

○精滑用知母黃柏降火牡蠣蛤粉燥濕白濁因法治

○一方用良姜三錢芍藥黃柏炒焦各二錢搗根白皮一两伍

水為末糊丸每服三十丸

○思想而得病在心治當安心神以帶補丁法用溫膽湯去竹茹加入參遠志蓮肉酸棗仁茯神煎服

○丁方治便濁丸藥



檮白皮

黃栢炒

青黛

乾姜炒

滑石

煨粉炒

神麴糊為丸服之

戴氏曰黃栢治溫熱肺氣下降使陰血生且能益制

○二陳湯治濁加升提之藥使大便潤而小便長

○珍珠粉丸治精滑白濁等証

黃栢

真蛤粉各一 珍珠三兩 一方無此味而有

右為朱水和丸如梧桐子大每服一百丸空心溫酒下

或加檮根白皮滑石青代等藥

○半苓丸治白濁

神麴

半夏燥溫

猪苓分水

麴丸服

○虛勞者用補陰藥胃弱者兼用人參及升麻柴胡升胃中之

清氣

○張子元氣血兩虛有痰濁陰火痛風

醫方正傳卷之五張子元氣血兩虛便濁有痰痛風時作



人參 一兩

白木 半兩

熟地黄

黃柏 炒黑色二兩

山藥

海石

瑣陽 各半兩

乾姜 半兩 甕存

南星 煨一兩

龜板 二兩

右為細末酒麴糊為丸如梧桐子大每服一百丸姜鹽湯下

湯下

○燥濕痰治白濁方如肝脉弦者須以青黛瀉肝大槩不可純

涼藥盧氏曰病因溫熱藥誤矣然亦不可輕用寒涼藥故

○妙香散治心虛遺精白濁

射香 一錢 研 人參 五分

木香 二錢 半煨 茯苓

茯神 五錢 黃芪

遠志 去心炒 桔梗

甘草 各二錢 辰砂 二錢 另研

山藥 二兩 姜汁炙

右為細末每服二錢溫酒調服不拘時

○秘真丸治思想無窮所願不遂意淫于外入房太甚宗筋



弛縱發為筋痿及為白淫及白物隨瘦而下或夢與陰人通泄耳

白龍骨另研訶子皮五枚者縮砂仁半兩硃砂一兩另研以  
右為細末麝糊為丸如菴豆大每服一丸空心溫酒下  
冷水亦可不可多服大秘或用葱白茶湯下

楊氏家傳

○葶藶分清飲治真元不足下焦虛寒小便白濁頻數無  
度漩面如油光彩不定漩脚澄下凝結如膏糊之狀

石菖蒲

烏藥

益智仁

川草薢

白茯苓

各一錢甘草稍半錢

右細切作一服水一盞半入鹽一錢煎至一盞空心服

東垣○治濁固本丸

蓮花鬚

黃連炒各二兩

白茯苓

砂仁

益智

半夏

黃柏炒各一兩

甘草炙三兩



猪苓五兩 為末蒸餅為丸空心溫酒下五十九

新○九龍丹治精滑

枸杞子

金櫻子

山果子收名蓮肉

佛座鬚蓮花也熟地黄

灰寶

白茯苓

川歸各等分

右為米酒麪糊為丸如梧桐子大每服五十九或酒或  
鹽湯送下如精滑便濁者服二三日溺清如米飲食倍  
常行步輕健婦人厭產者二三服便往孕

錄○水陸工仙丹治遺精白濁夢泄脫精等証

金櫻子半斤

灰寶二斤

右以灰寶去壳杵為細末取金櫻子黃熟者用器盛於  
水中杵去刺又於石臼中杵碎去核淨再杵細絞取自  
然汁煎熬成飴糖和灰寶末為丸如梧桐子大每服五



七十九空心姜鹽湯送下

○定志珍珠粉丸治心虛夢泄

人參

白茯苓 各三兩 遠志 去心

石菖蒲 各二兩

海蛤粉

黃柏 炒焦色 各三兩 樗根皮 兩

青黛 二兩

右為細末麪糊為丸青黛為衣如梧桐子大每服五十丸空心姜鹽湯下

○丹溪活套云赤白濁乃胃中痰積下流滲入膀胱宜用二陳湯加升麻柴胡防風之類以提之肥白人屬濕熱加蒼朮白朮炒黃柏黃荊子之類或有挾寒者本方加炒乾姜肉桂甚者加附子○有心虛不能固守及平素虛寒之人本方加蓮薢石菖蒲益智炒乾姜牡蠣龍骨之類○氣虛者本方加黃芪白朮人參或加附子之類○赤者多者血虛瘦弱之人得之宜四物湯加酒知母酒炒黃柏煎湯送下



珍珠粉丸○赤白濁小腹疼痛不可忍者宜作寒治東垣  
酒煮當歸丸最妙方見婦人門

○祖傳經驗秘真丹治好色腎虛遺精夢泄白淫白濁等証

鬼絲子

韭子

栢子仁各一兩

龍骨

牡蛎

山茱萸去核取肉

赤石脂各半兩

補骨脂一兩 遠志

巴戟

覆盆子

拘杞子

黃栢鹽酒炒黑 山藥各七錢半

芡實

杜仲各五兩

姜汁炒 絲斷

金櫻子半青黃者去皮核取肉焙乾 鹿角膠一兩半炒成珠

乾姜一兩

黑色

鹿角膠

一兩半炒成珠

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服一百丸空心姜

鹽湯下

○蓮塘未顯二里病遺精潮熱不起床三月矣召予治脉之左

右寸關皆浮虛無力兩尺洪大而軟與補中益氣湯加熟



論

地黄知母黃柏地骨皮煎吞下珍珠粉丸外做小筏籠一箇以籠陰莖勿使搭肉服藥三十餘貼一月平安

淋閉門

附關格五十七

內經曰飲食入胃游溢精氣上輸於脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱夫膀胱者主足太陽寒水之化其體有下口而無上口者也長生在申是故西方肺金以為之母而資其化也肺金清肅則水道通調而滲營於下耳然肺金又藉脾土健旺以資化源而清氣得以上升而歸於肺以運行也故經又曰清陽出上竅濁陰出下竅故清陽不升則濁陰不降而成淋閉之患矣先哲以滴水之器譬之上竅閉則下竅不出此理甚明故東垣使灸百會穴丹溪使吐以提其氣之橫格是皆開上竅之法也原其為病之由皆膏粱之味溫熱



之物或燒酒炙肉之類鬱遏成痰以致脾土受害乏力不能  
運化精微清濁相混故使肺金無助而水道不清漸成淋閉  
之候或謂用心太過房勞無節以致心腎不交水火無制清  
陽不升濁陰不降而成天地不交之否皆先哲之法言也古  
方有五淋之別氣砂血膏勞是也若夫氣淋為病小便澀滯  
常有餘瀝不盡砂淋為病陰莖中有砂石而痛溺不得卒出  
砂出痛止膏淋為病溺濁如膏勞淋為病遇房勞即發痛引  
氣衝血淋為病遇熱則發甚則溺血候其鼻準色黃者知其  
為小便難也東垣分在氣在血而治之以渴與不渴而辨之  
耳如渴而小便不利者熱在上焦氣分肺金主之宜用淡滲  
之藥茯苓澤瀉琥珀燈心通草車前子葵麥蘗蓄之類以清  
肺金之氣瀉其火以滋水之上源也不渴而小便不利者熱  
在下焦血分腎與膀胱主之宜用氣味俱陰之藥知母黃柏



之類滋腎丸是也除其熱泄其閉塞以滋膀胱腎水之下元也治淋之法無越於此學者不可不知

### 脉法

脉經曰少陰脉數婦人則陰中生瘡男子則為氣淋脉細而數○脉盛大而實者生虛細而澁者死

### 方法

冊溪方法九九條

○冊溪曰淋雖有五皆屬於熱宜解熱利小便山拖子之類不可發汗汗之必便血

○老人氣虛淋閉參朮中帶木通拖子之屬

○有腎虛極而淋者當補腎精而利小便不可獨用利水藥

○有死血作淋者用牛膝膏用之云牛膝膏能損胃不食宜斟酌

○一方治淋用益元散加梔子仁木通或用梔子一合炒為末白湯調下夏月以苗香煎湯調益元散服効



○痰熱膈滯中焦淋澀不通二陳湯煎大碗頓服探吐之以提其氣

○淋澀有血因火燥下焦無血氣不得降而滲泄之令不行也宜補陰降火以四物湯加知母黃柏或用四物湯煎下滋

腎丸

○陰莖痛乃厥陰氣滯煎熟用甘草稍蓋欲緩其氣耳

○小便因熱鬱成淋不通用赤茯苓澤瀉車前子麥門冬肉桂滑石木通甘草稍氣虛者加黃芪木香淋痛加黃柏生地黄夏月煎調益元散

○參苓琥珀湯治小便淋澀莖中痛相引脇下痛不可忍

人參

茯苓

各五

川練子

去核

生甘草稍

玄胡索

各七

琥珀

柴胡

川歸尾

澤瀉

各三



右細切作一服水一盞半加燈心十數莖煎至一盞服  
○琥珀散治五種淋澁疼痛小便有膿血出証

琥珀

浸藥

海金砂

蒲黃各一兩

右為細末每服三錢空心前萱草湯調下

○傷寒後脫陽小便不通用生薑自然汁調茴香末敷貼小

腹上又服益智茴香丸調益元散送下

○老人氣虛而小便不通四物湯加黃芪人參吞滋腎丸下

焦血氣乾者死

○小便黃用黃栢如澁數加澤瀉若濕熱流注下焦而小便黃

赤澁數用梔子澤瀉切當濕多者宜用滑石利之

○下焦無血小便澁數而黃者用四物湯加黃栢知母牛膝其

草梢

○通關丸 即滋腎丸 治不渴而小便閉澀在下焦血分



黃柏酒洗焙乾

知母酒洗焙乾各一兩

肉桂五分

右為細末熟水如梧桐子大每服一百九空心白湯下服後須頻兩足令藥易下行也如小便已利華中如刀刺痛當有惡物下為驗

東垣○清肺飲子治渴而小便閉澀不利和熱在上焦氣分

燈心一分

通草二分

澤瀉

瞿麥

琥珀各半錢

篇蓄

木通各七錢

車前子研

茯苓去皮

猪苓去皮各一錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞空心稍熱服之○導氣除燥湯治小便閉塞不通乃血澀致氣不運而竅澀也

茯苓去皮

滑石各一錢

知母去毛酒浸炒

澤瀉各一錢黃柏二錢酒炒

右細切作一服水二盞煎至一盞空心稍熱服之



陳○腎疸湯治腎疸目黃甚至渾身黃小便赤

羌活

防風

藁本

獨活

柴胡各五

升麻

一錢肥上治

白茯苓二分

澤瀉三分

猪苓

四分

白朮五分

蒼朮

一錢肥上

黃柏三分

人參

三分

葛根五分

神麴

六分

甘草五分

右細切作一服水二盞煎至一盞食前稍熱服

陳○小薊湯治下焦熱結血淋

生地黄

小薊根

通草

滑石

梔子仁

蒲黃

炒

淡竹葉

當歸稍

生藕節

甘草

稍各五

右細切作一服水煎空心服

補○八正散治大小便俱閉



大黃

瞿麥

木通

滑石

藟蒿

車前子

梔子仁

甘草 各等分

右細切每服五錢重入燈心七莖水煎服

○牛膝膏用川牛膝一合細切以新汲水五大盞煎耗其四入

射香少許空心服或單以酒煮亦可

東垣○茯苓湯治胃疽陽明積熱食已輒飢面色黃瘦胃滯脇脹

小便閉澀

赤茯苓

陳皮 去白

澤瀉

桑白皮 各三分

赤芍藥

白朮

人參

官桂 各二分

石膏 八分

病甚者加大黃朴硝各一錢

右細切作一服加生姜五片水一盞半煎至一盞溫服

問○倒換散治無問久新癰閉大小便不通小腸急痛肝門腫

痛

大黃 通減半

荆芥穗 大便不通減半各等



右各別研為細末每服二錢溫水調下臨時加減服

間河○葵子散治小便不通

黃蜀葵子研細

赤茯苓各二錢

右作一服水一盞煎二三沸食前服

○濟生葵子散治膀胱實熱小便不通方見疝氣門

間河○琥珀散治五淋

滑石二錢

木通

當歸

木香

蔚金

篇蓄各一錢

琥珀

右作一服為末用蘆葦葉同煎水一盞半煎數沸食前溫

服

間河○鐵服丸治大小便不通神效

大皂角燒存性

右一味不拘多少煉蜜為丸如梧桐子大每服七十九白



湯下

外臺 ○廣濟鷄蘇飲子治小便不通

鷄蘇 二兩

生地黄

通草 各四兩

滑石

杏仁

去皮尖 各二兩 冬葵子 一兩

石葦 各一兩 去毛

右七味細切以水六升煎至二升半去粗分三服空心進一服如人行四五里又進一服必通

外臺 ○又方治小便不通

冬葵子

滑石 各三兩

通草

赤茯苓 各一兩

茅根 二兩

芒硝 半兩 取汁

右細切以水六升煎至二升去粗納芒硝分作三服連進

即通

○集驗方治小便淋瀝不通

滑石 半斤

石葦 三兩

通草 四兩

榆莢



外臺

河間

○石葦散治小便不利莖中作痛

石葦去毛二兩

瞿麥 一兩

滑石 五兩

車前子 三兩

冬葵子 二兩

右為細末每服方寸匕三服

○祖傳經驗秘方治小便淋閉莖中作痛神效

石葦去毛

滑石

瞿麥

菟蓄

冬葵子

木通

王不留行

地膚草

各等分

右為細末每服三錢白湯調下

○又經驗治小便溺血立效

金陵草一名旱蓮草一名黑草

車前草

俗名蝦蟆衣

右二物各等分杵自然汁每服半茶盞空腹服



○又方治前証用壯年無病人頭髮不拘多少燒灰存性以側柏葉搗汁入糯米糊為丸如梧桐子大每服一百丸白湯下或四物湯下尤妙

又方治沙淋乃莖中有砂作痛

石首魚腦骨

即五白鱗火煨出火毒

滑石研半兩

右共研為細末分作二服煎水通湯調下未愈再服數劑必待砂出盡乃安

○又方治孕婦轉胞小便不通及男子小便不通皆効

冬葵子

半兩

山梔子

半兩

木通錢三

滑石研半兩

右作一服水一盞半煎八分溫服外以冬葵子滑石梔子為末田螺肉搗膏或生葱汁調膏貼臍中立通

○又方治血淋

側柏葉

藕節

車前草

各等分



右三味同搗取真汁調益元散神効

△附關格証

難經曰關則不得小便格則吐逆○脉兩寸俱盛曰關格

其証嘔逆而小便不通者是也

按素問謂人迎大四倍於氣口名曰格氣口大四倍於人迎名曰四逆也蓋有格而不關者亦有關而不格者又或有人迎氣口俱盛而吐逆不

丹溪曰寒在上而熱在下故多死法當吐以提其氣之橫格

不必在出痰也用二陳湯探而吐之吐中便有降

有氣虛不運者補氣藥中升降用補中益氣湯加枳櫛使清氣升而濁氣降也

○治關格証吐逆而小便不利急宜先灸氣海天樞等穴各三

七壯其吐必止然後以益元散等藥以利小便

○祖傳經驗秘方治關格吐逆小便不通用霍香平胃散合五



卷加美寒煎服立効

子長老脩德翁年七十秋間患小便不通二十餘日百  
方不効後得一方取地膚草搗自然汁服之遂通雖至  
微之物而有廻生起死之功故錄於此以為濟利之一  
助云地膚草俗云白地芎是也



論

必吉門

五十八

內經曰北方黑色入通於腎開竅於二陰藏精於腎夫腎主  
五液故腎實則津液足而大便滋潤腎虛則津液竭而大便  
燥結原其所由皆房勞過度飲食失節或恣飲酒漿過食辛  
熱飲食之火起於脾胃淫慾之火起於命門以致火盛水虧  
津液不生故傳道失常漸成結燥之証是故有風燥有熱燥  
有陽結有陰結有氣滯結又有年高血少津液枯涸或因有  
所脫血津液暴竭種種不同固難一例而推馬經云腎惡燥  
急食辛以潤之以苦泄之陽結者散之陰結者溫之大法治  
燥者潤之以大黃當歸桃仁麻子仁郁李仁之類風燥者加  
以防風羌活秦艽皂莢之屬九以煉蜜取其潤燥以助傳導  
之勢故結散而踈通矣仍多服補血生津之劑助其真陰固



其根本庶無再結之患切勿以巴豆牽牛等峻劑攻下雖暫  
得通快必致再結愈甚反釀成病根膠固卒難調治或有血  
虛脈大如葱管發熱而大便結燥者慎不可發汗汗之則重  
亡津液閉結而死此鑒殺之耳活人書有脾約証謂胃強脾  
弱約束津液不得四布但輸膀胱故小便數而大便難制脾  
約丸以下脾之結燥使腸潤結化津流入胃而愈丹溪曰然  
既曰脾約必陰血枯稿內火燔灼熱傷元氣故肺受火邪而  
津竭必竊母氣以自救夫金耗則土受木傷脾失轉輸肺失  
傳化宜其大便閉而難小便數而無藏蓄也理宜滋養陰血  
使陽火不熾金行清化脾土健旺津液入胃大小腸潤而通  
矣今以此丸用之於熱甚而氣實與西北人稟賦壯實者無  
有不妥若用之於東南方人與熱雖盛而氣血不實者雖得  
暫通將見脾愈弱而腸愈燥矣須知在西北以開結為主在



東南以潤燥為要學者其可不知此矣

脉法

脉多沉伏而結 陽結脉沉實而數 陰結脉伏而遲或結

老人虛人便結脉雀啄者不治

方法冊溪方法  
九二條

冊溪曰有虛有風有濕有火有津液不足者有寒者有氣結

者切不可例用芒硝大黃及巴豆牽牛等利藥

○久病腹中有實熱大便不通宜用潤腸丸微利之不宜用峻

利之劑

○脾約丸麻仁一兩半用生絹袋盛百沸湯連袋泡浸湯冷

次日曝乾蘗之粒粒皆完枳實黃色厚朴姜制

芍藥各三大黃四兩酒蒸杏仁去皮尖炒另

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九丸溫水下



通

○通幽湯治大便難，幽門不通，上衝，吸門不開，噎塞，不便，燥閉，氣不得下，治在幽門，以辛潤之。

炙甘草

紅花各一

生地黄

熟地黄各半

升麻

桃仁泥

當歸身

右細切，作一服水一盞半煎至一盞，去粗調枳殼細末，半錢食前稍熱服。

東○潤燥湯

升麻二分

生地黄二分

熟地黄

當歸稍

大黃酒濕煨

生甘草

桃仁泥

麻仁各一錢

紅花五分

右除桃仁麻仁另研細，外餘細切，作一服水一盞半入桃仁麻仁煎至一盞，去粗空，心稍熱服。

東○潤腸丸治脾胃中伏火，大便閉澀，或乾燥閉塞，不通，全不



魚養及風結血閉皆能治之

桃仁

湯泡去皮

麻仁去壳各

當歸稍

大黃酒溫煨

羌活

各半

東垣

○麻黃白朮湯治大便不通五日一次小便黃赤渾身腫面  
上及腹尤甚其色黃麻木身重如山沉困無力四肢痿軟  
不能舉動喘促不安

青皮去

桂枝

酒黃連各二

人參

蒼朮

白朮

厚朴剉

柴胡

諸苓各四

酒黃栢

陳皮去白



升麻

半生

升麻

各三

吳茱萸

白茯苓

澤瀉

各五

白豈寇

炒神曲

各六

麻黃

去節

杏仁

四個

右細切

分作二服

每服水二盞

先煎

麻黃

冷沸掠去沫

入諸藥

同煎至一盞

去粗

稍熱服

東垣

○升陽瀉熱湯

治

膈噎

不通

逆氣

裏急

大便不行

青皮

槐子

各二

生地黄

熟地黄

黃栢

各三

當歸身

甘草

稍各四

蒼朮

五分

升麻

七

黃芪

一錢

桃仁

十箇

右細切

作一服

入桃仁

泥水

二盞

煎至一盞

食前熱服

東垣

○活血潤燥丸

治

大便風秘

血秘

常燥結

多

當歸

稍五錢

防風

三錢

大黃

酒煨

皂角仁

燒存性

五錢

桃仁

二兩

去

麻仁

二兩

半去



東垣

○潤腸湯治大便結燥不通

右除桃仁麻仁另研外共為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十丸白湯下三兩服後須以麻子仁羹粥每日早晚食之大便須日久再不結燥也此丸藥以礞礮盛之紙包封毋令見風

生地黄

生甘草各五分 大黃三錢

熟地黄

當歸稍各五分

升麻

桃仁

麻子仁鎔一

紅花二分

東垣

○潤體丸能潤血燥治大便不通

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗空心服

麻仁

當歸稍

生地黄

桃仁

枳壳各等分

右為細末煉蜜為丸服



東垣○備急大黃丸治胃中停滯寒涼之物大便不通腹滿方見西傷門  
河間○枳壳丸治三焦約大小便不通穀氣不得下行

枳壳二兩 陳皮一兩 枳櫛半兩 木香二錢半

黑丑四兩 杵頭末 一半生用 一半炒熟

東垣○枳實導滯丸治傷熱物大便不行氣滯胃腹作痛方見內  
右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服十五丸姜湯下

○本邑趙德秀才之母年五十餘身材瘦小得大便燥結不通飲食少進小腹作痛召予診治六脉皆沉伏而結澀予作血虛治用四物湯加桃仁麻仁煨大黃等藥數服不通反加滿悶與東垣枳實導滯丸及備急大黃丸等藥下咽片時即吐出蓋胃氣虛而不能受留性速之藥耳遂以備急大黃丸外以黃蠟包之又以細針穿一竅令服三九蓋以蠟墮者制其不犯胃



氣故得出。幽門達大小腸取効也。明日下燥屎一升。許繼以四物湯加減作湯使容潤腸。丸如此調理。月餘得大便如常飲食進而平安。

予族姪有一通判之子因出痘大便閉結不通。見醫云便實為佳兆。自病至痘瘡愈後不如廁者九二十五日肛門連大腸不勝其痛。呌號聲達四隣。外醫及予二三人議藥調治。用皂角末及蜜煎導法服以大小承氣湯及枳實導滯丸。備急丸皆不効。計無所出。予曰此痘瘡餘毒鬱熱結滯於大小腸之間。而然以香油一大盞令飲。自朝至暮亦不効。予盡一計令待婢口含香油以小竹筒一箇套入肛門以油吹入肛內。過半時許病者自云其油入腸內如蚯蚓漸離上行。再過片時許下黑糞一二升止困睡而安。



論

黃疸

五十九

內經曰中央黃色入通於脾又曰諸濕腫滿皆屬脾土夫黃疸為病肌肉必虛腫而色黃蓋濕熱鬱積于脾胃之中久而不散故其土色形于面與肌膚也蓋脾主肌肉肺主皮毛母能令子虛母病子亦病矣是故有諸中者必形諸外耳其証有五曰黃汗曰黃疸曰酒疸曰穀疸曰女勞疸雖有五者之分終無寒熱之異丹溪曰不必分五同是濕熱如禽麴相似正經所謂知其要者一言而終是也外有傷寒熱病陽明內實當下而不得下當汗而不得汗當分利而不得分利故使濕熱沸鬱內甚皆能令人發黃病也先哲制茵陳五苓散茵陳湯茯苓滲濕湯之類無不應手獲効故曰治濕不利小便非其治也又曰濕在上宜發汗濕在下宜利小便或二法並



用藥上下分消其濕則病無有不安者也學者詳之

脉法

脉經曰凡黃候寸口脉近掌無脉口鼻黑色並不可治

脉沉渴欲飲水小便不利者必發黃也

酒疸者或無熱靖言了了腹滿欲吐鼻燥其脉浮者先吐之  
沉弦者先下之

酒疸下之久久為黑疸目青面黑心頭如噉黃蘗之狀大便

正黑皮膚四肢不仁其脉浮弱頭黑微黃故知難治

穀疸寸口脉微而弱微則惡寒弱則發熱當發不發骨節疼

痛當煩不煩而極汗出跌陽脉緩而遲胃氣反強飽則煩

滿上則發熱客熱消穀食已則飢穀強肌瘦名曰穀疸

陽明病脉遲者食難用飽上則發寒熱頭眩者必小便難此

欲作穀疸雖下之腹滿如故



趺陽脉緊而數數則為熱熱則消穀緊則為寒食則滿也  
尺脉浮為傷腎趺陽脉緊為傷脾風寒相搏食已則眩穀氣  
不消胃中若濁濁氣下流小便不通陰被其寒熱流膀胱  
身體盡黃名曰穀疸

方法

丹溪方法九五條

丹溪曰不必分五同是濕熱如奮翹相似輕者小濕中丸重

者大濕中丸熱多加黃連濕多者茵陳五苓散加食積藥

戴氏曰食積者量其虛實下之其餘但利小便便清  
利則黃自退或曰黃疸宜用倒倉法又曰黃疸倦怠  
胃不利食小用胃苓湯  
小便赤加滑石

○一方治黃疸

黃芩

黃連

枳子

茵陳

猪苓

澤瀉

蒼朮

青皮

草龍胆各五

穀疸加三稜莪朮縮砂陳皮神麴



右細切作一服水煎服之

○又方治氣實傷濕渾身發黃宜吐法

撫芎

梔子

桔梗各二

右細切作一服加姜煎入薑汁服探吐之

○小濕中丸治黃疸與食積又可制肝燥脾脾虛者須以白木

作湯使

針砂十兩醋炒七次令通紅另研

苦參夏加冬減

山查各二

茱萸加一兩冬減各半片

白朮五兩

川芎夏減

神麴各半片

香附米一升童便浸一宿

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服七八十丸食前

鹽湯下○一方無白朮山查苦參茱萸有梔子

○大濕中丸

針砂十兩如陳皮

蒼朮

青皮



厚朴制

三稜醋煮

莪朮醋

黃連

苦參

白朮各五兩

生甘草二兩

香附浸一宿

右為細末醋糊為丸一方無黃連苦參白朮一方又無

人活○調胃承氣湯方見傷寒門

叔和曰腹滿舌瘦煩燥不得睡屬黃家又曰病黃疸發熱煩喘胸滿口燥者以發病時火劫其汗兩熱相傳然黃家所得從溫故一身盡發熱而黃如壯熱者熱在裏也當下之安用調胃承氣湯

○又曰黃疸之病當以十八日為期治之十日以上為差又劇者為難治○又曰病疸而渴者其病難治疸而不渴者其病易治發於陰部其人必嘔發於陽部其人振寒而發熱也師曰諸黃家病但宜利小便假令脉浮當以汗解之宜桂枝加荳湯又名黃芪建中湯方見傷寒門



和叔

○又曰男子黃小便利自當與小建中湯○又曰黃疸腹滿小便不利而利自汗出此為表和裏實當下之用大黃黃柏梔子芒硝湯

和叔

○大黃黃柏梔子芒硝湯

黃柏

芒硝

大黃各四

梔子三枚

右細切作一服水一盞半煎至二盞溫服

和叔

○又曰黃疸病小便色不變欲自利腹滿而喘不可除熱必噦必噦者宜服小半夏湯方見傷寒門

和叔

○又曰夫病酒發黃疸必小便不利其候心中熱足下熱是其証也又心中懊懣而熱不能食時欲吐名曰酒疸又曰酒疸心中熱欲嘔者吐之即愈又曰酒疸黃色心中實熱而煩

脾熱作吐

和叔

○又曰額上黑微汗出手足心熱薄暮則發膀胱急小便自



利名曰女勞疸腹如水狀不治

和叔

○又曰黃家日晡所當發熱而反惡寒此為女勞得之膀胱急小腹滿一身盡黃額上黑足下熱因作黑疸其腹脹如水狀大便必黑時溇此女勞之病非水也腹滿者難治硝石礬石散主之

和叔

○硝石礬石散

右以二石各等分燒燬為末每服貳錢以大麥粥汁和服日三服取汗愈若小腸滿急小便不利用滑石石膏各二錢入粳米一撮同煎服之

和叔

○治酒疸用小柴胡湯加茵陳豈豉大黃黃連葛根煎服効可

河間○茯苓湯治胃疸消穀善飢面色痿黃心中煩熱胃脇脹滿

小便赤澁

方見淋秘門

冊○一方治穀疸以柴胡穀芽枳實厚朴梔子大黃等分水煎



服効

局方○胃苓湯治脾胃不和黃腫如小便赤澀加滑石五苓散合  
東垣○腎疸湯治腎疸目黃或渾身黃小便赤澀平胃散是也

升麻

羌活

防風

藁本

獨活

柴胡各半錢

蒼朮一錢

豬苓四分

葛根五分

澤瀉三分

黃芩二分

甘草二分

神麴炒三分

黃柏二分

白朮五分

人參三分

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗溫服

活人○茵陳五苓散治傷寒或伏暑發黃小便不利煩渴等証

本方倍加茵陳入姜棗煎服之

活人○茵陳茯苓湯治發黃脉沉細數四肢冷小便澀煩躁而渴

茯苓

桂枝

猪苓各一錢

滑石一錢半

茵陳二錢



右細切作一服水一盞半煎至一盞服如脉未出加當歸一錢半

人活

○梔子大黃湯治酒疸心中懊懣或熱而痛

梔子十四枚

大黃一兩

枳實五枚

豈豉一升

右作一服用水五升煎至二升分三服

人活

○半溫半熱湯治酒疸身黃無熱靖言了了腹滿欲嘔心煩

足熱或有癥瘕心中懊懣其脉沉弦緊細

半夏

茯苓

白朮各七

前胡

枳殼黃芩炒

甘草炙

大戟各五

黃芩

茵陳

當歸各三分

右細切作一服入生姜三片水二盞煎至一盞溫服

人活

○茵陳蒿湯治身熱鼻乾汗出陽氣上奔小便赤澀不利濕

熱發黃



茵陳蒿

一兩

大梔子

三枚

大黃

三錢半

右細切

作一服水三盞煎至盞半溫服

○茵陳大黃湯治傷寒大熱發黃面目俱黃小便赤澀

人活

茵陳蒿

梔子

柴胡

黃柏

黃芩

升麻

大黃

各一兩

草龍胆

三分半

右細切

作一服水一盞半煎至一盞溫服

人活

○梔子柏皮湯治身熱不去大便利而煩熱身黃

梔子

黃柏

黃連

各三錢半

右細切

作一服水一盞半煎至一盞溫服

人活

○茯苓滲濕湯治黃疸寒熱嘔吐而渴欲飲冷水身目俱黃

小便不利不惠飲食

方見濕証門

人活

○小茵陳湯治發黃脉沉細而遲遍身冷

附子

一枚

甘草

炙一兩

茵陳

二兩



右細切作三服每服用水二盞煎至一盞溫服

人活○茵陳四逆湯治發黃脉沉細而遲肢體逆冷腰以上自汗

甘草

炙

乾姜

炮

附子

一枚

茵陳二兩

右細切分作四服水煎服

人活○葶藶苦參散治濕熱內甚小便赤澀大使時秘飲食少進

諸藥不効因為久黃

苦參

黃連

瓜蒂

黃柏

大黃

各一

葶藶子二兩

右為細末每服一錢七清米飲調下以吐利為度隨時

看虛實消息加減

人活○當歸白朮湯治酒疸發黃心下有痞瘕堅滿身體沉重妨

害飲食小便赤黃此因內虛飲食生冷脾胃痰結所致

白朮

茯苓

當歸

黃芩



茵陳各三分

前胡

枳實

甘草炙

杏仁各六分

半夏八分炮透

右細切作一服加生姜三片水一盞半煎至一盞溫服  
○抵當湯治傷寒熱鬱瘀血內結身黃脉沉細狂言譫語小便自利大便黑方見傷寒門

集驗

針砂丸治穀疸酒疸濕熱發黃等証

針砂半斤醋炒紅

蒼朮四兩米泔浸

香附四兩重便浸

神麴炒微黃

茵陳姜汁炒

麥蘗取麴炒

芍藥

當歸酒洗去頭

生地黄

川芎

青皮去穢炒各一兩五分

陳皮去白

枳朮醋煮

三稜醋煮各二兩

梔子去壳炒

姜黃

升麻

乾漆各半兩炒烟尽

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服六七十丸姜湯送下



集驗○綠礬丸治黃腫病最捷

五倍子半斤炒黑綠礬四兩針砂四兩醋神麴半斤炒  
右為細末生薑汁煮紅棗肉為丸如梧桐子大每服六  
七十丸溫酒下不能飲酒米湯亦可終身忌食蕎麥麴  
犯之再發難治

鑑室○東礬丸治食勞身目俱黃者

綠礬半斤火煨通紅

右研細紅棗肉為丸如梧桐子大每服五十丸或酒或  
姜湯下

○祖傳經驗根金丸治黃腫絕妙

蒼朮半斤

白朮各二兩

甘草炙半兩

厚朴

姜汁拌炒

陳皮去白

針砂醋炒

香附童便浸

神麴

炒黃色

麥蘖炒

有塊加

三棱醋煮

莪朮

醋煮各一兩半



○右為細末麪糊為丸服忌魚腥濕麪生冷水菓等物  
一男子年三十餘得穀疸症求予治以胃苓湯去桂加茵陳  
數十貼黃退自以為安不服藥十數日後至晚目盲不見  
物予曰此名雀目蓋濕痰盛而肝火有餘也用獺猪肝炙  
熟和夜明砂作丸服之目遂明如故來謝予曰未也不早  
服制肝補脾消痰之劑必成蠱脹不信半月後腹漸脹  
瘡滿復來治予仍以胃苓湯倍二朮加朮通麥門冬煎湯  
下褪金丸一月平安



瘡瘍六十

內經曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火又曰膏粱之變足生大丁榮氣不從逆於肉理乃生癰腫東垣謂榮氣即胃氣也蓋胃氣調和則榮衛之氣皆順流而無逆於肉理耳若失飲食失節肥甘過傷以致濕熱蘊積于腸胃之間燒爍府藏煎熬真陰此經之所謂陰之五宮傷在五味味馬發熱久而增氣故濕熱之氣聚於下焦陰火熾盛蓄於八脉八脉沸騰逆於經絡氣凝血滯故其滋養精微之氣不能如常榮於肉理是以結聚而成癰腫矣經曰熱勝則肉腐是也法當視其所發之地各從其經而處治焉夫發於身之表者其名一十有七曰腦發腎脉曰背發中属督脉曰髤發陽經曰鬚發手足陽曰眉發手足陽曰腋



發陽經曰穿當發督衝任曰腿發表足三陽曰肝癱足經曰  
喉癱任經曰膈癱任經曰乳癱內明經曰腎癱  
陽經曰驕馬癱明經曰囊癱明經發於腔子之內者其名有  
四相疽曰肺癱明經曰腸癱明經曰胃脘癱明經夫十  
二經有氣血多少之不同癱疽淺深之有異是故為治之法  
或疎散或消毒或針烙或內托或外消或瀉利或補益是故  
腫瘍為實宜瀉利潰瘍為虛宜補益浮露而淺者為癰宜外  
消藏伏而深者為疽宜內托此千古不易之定議也雖然其  
証有善而易治者為順惡而難治者為逆其為眼白睛黑目  
緊小者一逆也不能飲食納藥而嘔食不知味二逆也傷痛  
渴甚三逆也膊項轉動不便四肢沉重四逆也聲嘶色脫唇  
鼻青黑面目四肢浮腫五逆也煩燥時咳腹痛甚泄利無度  
小便如淋六逆也膿血大洩欣腫尤甚膿水臭敗莫近七逆



也喘麤氣短恍惚嗜臥八逆也未續先黑陷下青唇黑便汚九逆也又如噫氣痞塞喘咳身冷自汗目瞪耳聾恍惚驚悸語言錯亂皆是惡証若夫動息自寧飲食知味一順也便利調勻二順也神彩精明語聲清明三順也膿潰腫消色鮮不臭四順也體氣和平五順也凡五順見三則吉九逆見六則危矣先哲垂訓班班可攷學者其可不詳察乎

### 脉法

脉經曰脉數身無熱內有癰也二云腹無積聚身無熱脉數此為腸中有膿意涉附子敗醬湯主之

諸浮數脉應當發熱而反洒淅惡寒若有痛處當發癰膿脉微而遲反發熱弱而數反振寒當發癰腫

脉浮而數身體無熱形黑嘿胃中微燥不知痛之所在此人

當發癰腫



脉滑而數數則為熱滑則為實滑則主榮數則主衛榮衛相  
逢則結為癰熱之所過則為膿也

羽林婦炳醫者脉之知婦人腸中有膿為下之即愈蓋寸口  
脉滑而數滑則為實數則為熱滑則為榮數則為衛衛數  
下降榮滑上升榮衛相干血為濁敗小腹痞堅小便或澀  
或時汗出或復惡寒膿為已成設脉遲緊聚為瘀血下之  
則愈

腸癰之為病其身體甲錯腹皮急按之軟如腫狀

夫腸癰者小腹腫按之則痛小便數如淋時時發熱自汗出  
復惡寒其脉遲緊者膿未成可下之當有血脉洪數者膿  
已成不可下也天黃牡丹湯主之

方法

丹溪方法九

丹溪曰癰疽因陰陽相滯而生蓋氣陽也血陰也血行脉內



氣行脉外相並周流寒與濕搏之則凝滯而行遲為不及  
熱與火搏之則沸騰而行速為太過氣得和而鬱津液稠  
粘為痰為飲積久滲入脉中血為之濁此陰滯於陽也血  
得和而鬱緣道阻隔或溢或結積久滲出脉外氣為之亂  
此陽滯於陰也百病皆由於此又不止於癰疽而已  
癰疽因積毒在藏府當先助胃吐氣使根本堅固而以行經  
活血藥為佐參以經絡時令使毒氣外發施治之早可以  
內消此內托之意也

疎○或問內托之法予曰河間治腫愀于外根盤不深形証在  
表其脉多浮病在皮肉非氣盛則必侵于內急須內托宜  
復煎散除濕散鬱使胃氣和平如或未已再煎半料飲之  
如大便閉及煩熱少服黃連湯如微利及煩熱已退却與  
復煎散如此使榮衛俱行邪氣不能內傷也



溪丹

○外科精要謂排膿內補十宣散治未成者速散已成者速

潰誠哉是言也若用之於小瘡癰與冬月亦可轉重就輕移深居淺若潰瘍與夏月用之其桂朴之溫散佐以防風白芷吾恐雖有參芪難為倚仗此見世人用此不分輕重時令經絡前後正若盲人騎瞎馬半夜臨深池危哉

溪丹

○諸經惟少陽厥陰二經生癰疽宜預防之以其多氣少血

也血少而肌肉難長瘡久未合必成死証苟不知此遽用驅逐利藥以伐其陰分之血禍不旋踵

溪丹

○腫瘍內外皆應宜以托裏表散為主如欲用大黃者宜戒

猛浪之非

溪丹

○潰瘍內外皆虛宜以補接為主如欲用香散者宜戒虛虛

之失

○外科精要

一書惟務紀錄精方應酬輕小証候耳



溪丹

○癰疽始發即以艾多灸之可使輕淺騎竹馬灸法最妙蓋

艾火暢達拔引鬱毒此從治之意惟頭為諸陽所聚艾炷宜小而少若身上必痛灸至不痛不痛灸至痛亦有因艾而死者蓋虛甚孤陰得絕其脉必浮數而大且不鼓精神必短而昏無以抵當火氣宜其危也○按河間灸刺法曰九瘡瘍須分經絡部分血氣多少腧穴遠近從背出者當從太陽經五穴選用至陰通谷束骨臑會中是也從髀出者當從少陽經五穴選用竅陰來谿臨泣陽輔陽陵泉是也從髀出者當從陽明經五穴選用厲兌內庭陷谷衝陽解谿是也從腦出者則以絕骨一穴治之各穴點法俱見銅人針灸經茲不再具

溪丹

○蟬針之法可施於輕小証候吮出惡血若積毒在藏府者

徒竭其血於外無益也



○外施貼藥亦發表之意精要謂貼冷藥有神效夫氣得熱則散得冷則斂何謂神效經曰發表不遠熱是也輕小瘡

也

○外科用針烙得膿後服神仙追毒丸此藥能下積取毒無取膿之功若血氣壯實則膿自出當以和氣活血藥佐參芪補劑服之

○腫瘍用手按之熱則有膿不熱則無膿

○膿出而反痛者此為虛也宜補之亦有穢氣所觸而作痛者宜和解之風冷所逼者宜溫養之

○疽發深不痛者胃氣大虛必死肉多而不知痛也

○腫瘍時嘔者當作毒氣上攻治之潰後當作陰虛補之若年老潰後發嘔不食又宜參芪白朮膏峻補隨証加佐使藥河間謂瘡瘍嘔者濕氣侵于胃也宜倍白水



○癰疽發渴乃血氣兩虛用參芪以補氣當歸地黃以養血或忍冬九黃芪六一湯皆効

○加味十全大補湯治癰疽潰後補氣血進飲食實爲切要凡膿血出多陰陽兩虛此藥有起死之功但不分經絡不載時令醫者觸類而長之可也或見腫平痛實遂以爲安慢不知省無補接調養之功愈後虛証復見因而轉爲他病而危劇者多矣

○蒲公英化熱毒消惡腫散結核有奇功田間路側皆有之三四月開黃花似菊花味甘衍義補遺云四時常花花能散毒繫節葉間折之有白汁出者是能解食毒散滯氣可入陽明太陰二經同忍冬藤煎以少酒佐而服之搗爛置之亦妙

○白蠟屬金稟收斂堅凝之氣外科之要藥也生肌止血定痛



接骨續筋補虛當與合歡皮同入長肉膏藥用之有神効  
但未試其可服否若合歡皮常服之驗矣

○草麻子性善收能追膿取毒亦要藥也

○癰疽已破未破用皂角刺能鑽引至痛處

### △取刺骨法

肥上精○取久疽久痔漏中朽骨用烏骨雞脛骨以信硃  
實之鹽泥固齊火煨通紅地上出火毒用骨研細飯粒如  
粟米大以皮紙撚送入竅内外以拔毒膏藥封之其骨自  
出

### △惡瘡發背腦疽等証方法

東○升陽益胃散治一切惡瘡發背腦疽等証

羌活一分 獨活五分 防風五分 藁本一錢半

知母一錢 生地黃一錢 黃芩一錢 黃連半錢



黃柏五分

當歸三錢

防風稍五分

連翹一錢

人參五分

黃芪一錢半

生甘草一錢

陳皮五分

當歸稍五分

蘇木五分

炙甘草半錢

酒防已五分

澤瀉七分

桔梗一錢

右細切分作二服每服用水二大盞浸半日前煎至一盞

滴酒數十點去粗臨卧溫服忌飲水再作膿効遲初患

二三日者服之立消作膿者立潰隨病上下食前後服

一人患腦疽第八日腫硬如拳即日服此藥一劑次

日便平復腫勢消更不疼痛又服半劑七日全愈如常

明之言凡瘡皆陰中之陽陽中之陰二証而已我治此

瘡陽藥七分陰藥三分名曰升陽益胃散勝于宣也老

人宜之亦名復煎散或加乳香沒藥各一錢尤妙

○當歸羌活湯治腦疽証



黃芩 酒炒 黃連 酒炒 各黃柏 酒炒 澤瀉 五分

連翹 一錢 當歸身 二錢 防風 羌活 各一錢

甘草炙一錢 山梔子 一錢 獨活 七分 藥本 七分

右細切作一服水二盞先浸一時許入酒一匙煎至八

分去粗食後稍熱服日進二服三日盡六服俱將藥清

汁調下後項栴榔散

栴榔散大欬瘡口

栴榔 木香各三錢

右為細末用前藥調下或欬瘡口用之次無痰痛以蠟

油調塗瘡口生肌飲肉甚速別無惡肉瘡口易合平後

膏梁熱瘡所宜用也貧人寒地及寒濕外來之寒瘡禁

不可多用

△背疽方法



○千金托裏散治背疽併諸惡瘡如三日以裏未耐灸反利大  
便者則可消矣

羌活

一錢半

防風

酒洗半

防風稍

五分

藁本

一錢半

當歸身

三錢

當歸稍

半錢

連翹

三錢

黃芩

三錢

酒洗

黃耆

一錢半

人參

一錢半

炙甘草

一錢

生甘草

半錢

陳皮

半錢

蘇木

五味子

酒黃柏

酒防已

各半

桔梗

梔子

生地黃

酒洗各一錢

酒大黃

三錢

酒黃連

一錢

木香

一錢

麥門冬

二錢

右細切

分作二服

每服用水

三大盞

浸半日

煎至一盞

稍熱服

後一服如前併粗再煎服忌冷水此方如覺病

即便忙服

無不効者

若瘡勢已發

三四日或成膿則不

消也

崔經歷

二次發背疽皆得此方而愈

省也

○丹溪

治背疽方用

大黃

防風

羌活

甘草

節生

地黃

當歸身



母白芷赤芍藥皂角刺黃芩作大劑煎服氣虛加入參黃芪瘡潰後亦宜加之

△附骨疽方法

○丹溪曰附骨疽者皆因久得厚味及勞役與酒後涉勞得此陽滯於陰之証也又曰環跳穴痛不止防生附骨疽以蒼朮為君佐以黃柏之苦行以青皮冬加桂枝夏加條芩體虛者加杜仲牛膝以生甘草為使作大料煎入姜汁食前飲之痛甚者吮前藥十數貼發不動少加麻黃一二貼又不動者恐疽將成急掘地坑以火煨坑通紅沃以小便令患赤體坐於坑中以蓆或綿衣圍抱下體使熱氣薰蒸腠理開氣血通暢而愈

陳垣

○羌活防已湯治附骨疽初發太陽厥陰太陰分者

羌活

川芎

蒼朮

防已



木香

連翹

射干

甘草

白芍藥

木通

當歸尾

蘇木 各七分

右細切水酒各一大盞煎至七分食前服美膳壓之

東垣

○托裏黃芪湯治骨疽初發於足少陽七明分者

柴胡

一分

一歲

連翹

八分

肉桂

八分

黍粘子

八分

黃芪

八分

當歸尾

一歲

黃柏

四分

升麻

四分

甘草

炙四分

白芷

一歲

右細切作一服酒一盞水一盞半煎至一大盞空心服

美膳壓之

東垣

○內托黃芪酒煎湯治瘡生腿外側或因寒濕得附骨疽於

足少陽經分微侵足陽明經堅破漫腫行步作痛或不能

行

柴胡

六錢半

連翹

八分

肉桂

八分

大力子

炒



黃芪 各四錢 當歸尾 八錢 黃柏 五分 升麻 七分

甘草 炙五分 白芷 二錢

右細切水酒各一盞煎至一盞食前溫服

陳○黃連消毒飲治附骨疽

黃連 一錢 黃芩 黃柏 各半錢 生地黃 四分

知母 四分 羌活 一錢 獨活 四分 防風 四分

藁本 五分 當歸尾 四分 桔梗 五分 黃芪 二分

人參 二分 甘草 三分 連翹 四分 蘇木 二分

防己 五分 澤瀉 二分 陳皮 三分

右細切作一服水煎服一老人年七十因寒濕地氣得

附骨疽於左腿外側少陽膽經之分微侵足陽明經分

闊六七寸長一小尺堅硬漫腫不辨肉色皮澤但行步

作痛以指按至骨大痛與此藥一服即止次日堅軟腫

消而愈

疎 ○內托黃芪柴胡湯治附骨疽

生地黃<sub>一分</sub> 黃柏<sub>一分</sub> 肉桂<sub>二分</sub> 羌活<sub>五分</sub>  
當歸<sub>稍</sub> 土瓜根<sub>酒洗</sub> 柴胡<sub>稍</sub> 絡<sub>一連翹</sub> 一錢三分  
黃芪<sub>二錢</sub>

右細切作一服酒一盞水二盞煎至一盞去粗空心熱服賈德茂小男於大腿近膝股內出附骨疽不辨肉色漫腫光澤木硬瘡勢甚又其左脚乃肝之髀上也更在足厥陰肝經之分少侵足太陰脾經之分其脉左三部細而弦按之洪緩微有另與此藥而安

△腎癰方法

○丹溪曰腎癰者腎居小腹之後在下此陰中之陰道遠位僻雖曰太陽多血然氣運不到血亦罕來中年後尤慮患此



絕有腫痛忝之脉証但見虛弱便與滋補血氣可保終吉  
若無積補之功其禍多在結茹之後或半年已來乃病多  
致失手慎之慎之

○內托羌活湯治是太陽經中左右尺脉俱緊按之無力

腎生癰堅硬腫痛太作

羌活

黃柏

酒炒各二錢

防風

藁本

當歸尾

各一肉桂

三分

連翹

甘草炙

蒼朮

陳皮

各五分

黃芪

一錢半

右細切作一服水二盞酒一盞煎至一盞去粗稍執空心服以衣覆蓋癰上使藥力行去衣

內疽方法

○丹溪曰內疽者皆因飲食之火挾七情之火相鬱而發飲食者陰受之七情者藏府受之宜其發在腔子而頭向內非

手腸胃有膜也宜以內托之藥托出于外以針開之而愈  
先用四物湯加桔梗香附生薑煎服膿出後亦用四物湯  
調理而安

△肺癰方法

○丹溪肺癰先須發表千金方曰病咳唾膿血其脉數實或口  
中咳習中隱隱痛脉反滑數者為肺癰其脉緊數為膿未  
成緊去而但數者膿已成也

○要畧治肺癰先以小青龍湯一貼以鮮裏之風寒邪氣欲後  
以葦廬大棗瀉肺湯桔梗湯葦葉湯隨証用之以取膿此  
治腫瘍之例也終以宇宙獨行方略湯以補裏之陰氣此  
治潰瘍之例也

○黃昏湯治胞中甲錯隱痛知為肺癰  
合歡木皮一掌大



驗

○葶藶大棗瀉肺湯治肺癰或肺脹喘促不得卧

葶藶子

一兩炒黃研為細末煉蜜丸如彈大棗十枚

右以水三盞煎大棗至二盞去棗入葶力一九再煎至一盞攪勻服之

驗

○葶藶湯治欬有微熱煩燥骨心甲錯出千金方

葶藶二升

薏苡仁

半斤

桃仁

五十箇

瓜瓣半升

右以水一斗先煮葶藶至五升去粗入諸藥煮取二升分溫再服當吐痰如粥而愈

驗

○桔梗湯治肺癰心胞氣壅咳嗽膿血心神煩悶咽乾多渴

兩脚腫滿小便赤黃太便多澀

桔梗

貝母

各一錢當歸

瓜婁子

名八分

枳殼炒五分薏苡仁八分桑白皮

防已各五分

驗○又方治前証

甘草節 三分 黃芪 五分 杏仁去皮炒 百合 各二分  
右細切作一服水一盞半加生姜五片煎至八分去粗  
溫服不拘時若太便秘者加大黃小便澀者加木通

瓜蒌子

當歸

桔梗

貝母

白芷

甘草 各一錢

右細切作一服水一盞煎食後服一方無貝母白芷有  
華蘼子

○肺癰已破入風者不治或用太乙膏九服以搜風湯時之

○有吐膿血如肺癰狀口臭他方不應者宜消風散入無病男

子髮灰清米飲調下可二服而愈

○祖傳經驗秘方治肺癰未成膿者立消已成膿者立潰其效

如神用章泰樹葉一名接骨木又名繼骨樹又名野黃楊



田塋路側皆有之石一味細研畧入瀝過以酒調服不飲酒入入生姜研服

△腸癰方法

○丹溪曰腸癰當作濕熱積治入風難治

○千金謂腸癰妄治必殺人其病小腹重強按之則痛小便數淋時時汗出復惡寒身皮甲錯腹皮急如腫狀脉數者欲有膿也巢云洪數已有膿脉若遲緊者未有膿甚者腹脹大轉側有水聲或述臍生瘡或膿自臍出或大便膿血淋婦証具前脉法下

○腸癰治法要畧以薏苡附子敗醬散千金以大黃牡丹湯

○灸法屈兩肘正肘頭銳骨端灸二百壯下膿血而安

○薏苡附子敗醬散

薏苡仁一歲炮附子一分敗醬三分

右為細末每服方寸匕水二盞煎至一盞連粗頓服之  
小便當下膿血而愈

○大黃牡丹湯

大黃四分

牡丹皮一兩桃仁五十枚去皮尖另研

芒硝三分

瓜蒌子半升

右細切用水六升煎取一升去粗入硝再煎一沸分  
三服頓服之有膿即下膿無膿即下血

○東陽呂俊文得潮熱微似瘡狀小腹右邊有一塊大如雞卵  
作痛右腳不能伸縮一醫作膿脈氣治十餘日不驗召予  
診候其脉左寸芤而澁右寸芤而洪實兩尺兩關俱芤  
數予曰此大小腸之間欲作癰耳幸膿未成儘可治療與  
五香連翹湯加減與之間以蜈蚣炙黃酒調服之二日內  
平安



乳梗方法

○丹溪曰乳梗多因乳母不知調養所致蓋乳旁陽明所經乳頭厥陰所屬忿怒所通鬱悶所遏厚味所釀以致厥陰之氣不行故竅閉而汗不通陽明之血滯騰故熱甚而化疔成膿或因所乳之子膈有滯痰含乳而睡口氣熾熱所炊而咸結核初便忍疼揉令核軟吮令汁透可散否則結成矣治法以青皮踈厥陰之滯石膏清陽明之熱生甘草節行汚濁之血瓜婁子消導腫毒或加沒藥青橘葉皂角刺金銀花當歸身或湯或散須以少酒送之若加艾火二三壯於痛處灸之尤妙彼粗土便用針刀必成拙病

○乳癰用蒲公英同忍冬藤入少酒煎服即欲哩是其効也

○乳癰未潰以青皮瓜婁桃仁連翹川芎橘葉皂角刺甘草節隨証加減煎服已潰以人參黃芪川芎當歸白芍藥青皮

連翹瓜蒌牛草節煎服

○東垣升麻托裏湯治婦人兩乳間出黑頭瘡瘡項陷下作黑眼子其脉弦洪按之細小

黃柏二分

肉桂三分

黍粘子五分黃芪

炙甘草

當歸身錢一連翹

升麻

葛根各一錢半

右細切作一服水一盞酒半盞同煎至一盞食後熱服

△妳岩方法

○石香程氏曰妳岩始有核腫結如贅若予大不痛不痒五七年方成瘡初便宜多服疎氣行血之藥須情思如意則可愈如成瘡之後則如岩穴之凹或如人口有唇赤汁膿水浸淫胸脇氣攻疼痛用五灰膏金寶膏去其蠹肉生新肉漸漸收斂此疾多生於憂鬱積忿中年婦人未破者尚可



浴成瘡者終不可治

方○十六味流氣飲治妳若

人參

黃芪

川歸各一錢川芎

肉桂

厚朴

白芷

甘草各半錢

桔梗三分

防風

烏藥

檳榔

芍藥

枳殼

木香各半錢紫蘇一錢半

右細切作一服或加青皮一錢水二大盞煎至一盞服

丹○單煮青皮湯治婦人百不如意各積憂鬱乳房內有核如

驚甚子

每服用青皮四錢細切以水一盞半煎至一盞日二服已

上二方間服至核消住藥

丹○橘葉散治証如前

青皮

石膏

甘草節各五瓜婁子一錢

當歸頭 五分 皂角刺 一分半 去尖畧炒 金銀花 五分

沒藥 蒲公英 各五分

右細切作一服加青橘葉一小握以酒一盞半煎至三

淺盞食後或卧時服

丹溪○丁香散治乳頭破裂或因小兒吹乳血乾自裂開多痛

丁香 不拘多少

右一味為末乾付裂處如燥噴津調付

△囊癰方法

○丹溪曰囊癰者濕熱下注也有作膿者此濁氣順下將流又  
滲道因陰道或虧水道不利而然膿盡自安勿藥可也惟  
在善於調攝耳又有因腹腫漸流入囊腫甚而囊自裂開  
畢丸懸掛水出以輔炭末付之外以紫蘇葉包裹仰卧養  
之



溪丹

癰疽入囊者曾治數人悉由濕熱入肝經處治而用補陰

藥佐之雖膿潰皮脫畢丸懸掛者皆不死

一方用野紫蘇葉

面青皆紅者是也

焙乾為細末付之如燥以香油

調付囊脫無皮者外以青荷葉包之其皮自生

△丹癰便毒方法

○便毒是厥陰經濕熱因勞倦而發用射干三寸同生薑煎食

前服得利二三行効射干開紫花者是紅花者勿用

溪丹

○一方用破故紙黍粘子微炒黑牽牛炒太黃酒蒸焙乾各

等分為末每服一兩酒調下

溪丹

○又方已結成膿者用大黃

酒拌

連翹

各五錢

枳實三錢

厚朴

甘草節

各二錢

桃仁

二十一个

生薑三片分三服水煎服之

石香程氏曰便毒一名騶馬癰此奇經衝任為病而癰見於

厥陰經之分野其經多血又名血疝或先有痒瘡而發或卒然起核疼痛而發皆熱鬱血聚而成也初發宜疎利之即散變膿後如常用托裏內補之藥

集瘡瘍

○蘇方散治便毒

木鱉子 去壳 當歸尾

為藥

白芷

粉甘草

川芎

射干

忍冬

即金銀花

大黃

川山甲

糖火 煨時 沒藥

蘇木

各六分

右細切作一服水酒各一盞煎至一盞食前服

瘡瘍

○玉燭散治便毒

川芎

當歸

生地黃

赤芍藥

朴硝

大黃

甘草 各八分

右細切作一服水煎食前服

○牡蠣大黃湯治同



大黃

牡蠣

各二錢五分

甘草一錢

瓜婁

一箇去皮

右細切作一服水二盞煎至一盞溫服

△瘰癧方法

○丹溪曰瘰癧必起於少陽一經不守禁忌延及陽明木抵食味之厚鬱氣之積曰風曰熱皆此二端拓引變換湏分虛實實者易治虛者可慮以其屬膽經主決斷有相火且氣多血少婦人見此若月經不作寒熱便生稍久轉為潮熱危矣自非斷慾食淡神仙不治也

丹溪

○治瘰癧用立効散與瓜婁散相間服神効

○本草云夏枯草大治瘰癧散結氣有補養厥陰血脉之功而經不言觀其能退寒熱虛者可仗若實者以行散之藥佐之外以艾灸亦漸取効

○治血少馬刀瘰癧肚泄以四物湯倍酒炒芍藥牡蠣粉陳皮



柴胡甘草黃連玄參炒神麴桑椹膏

○石香程氏曰瘰癧之証內經謂之結核者是也結核有大小如大豆銀杏連串而生者形大如馬刀者謂之馬刀瘰癧別為火類夫火亢之甚必蕪水化制之其核故堅也凡瘰癧歷之起始生於耳後足陽明少陽二經浸淫于太陽之經漸隨經流注于腋脇手足皆有也治法以火針刺入核中不可透底納蟾酥膏于中外用綠雲膏貼之三日後取去核中稠膿膿盡取去核外薄膜先破初起之核一枚以絕其源服藥後出者皆愈或不肯收如銀杏者盡皆開以用藥取之其自潰者猶如木菓之腐熟肉雖潰而核猶存故膿水淋漓久難得愈治者用鉄烙燒赤烙去其破核猶存者併肉潰處次用金寶膏龍珠膏等藥追去惡之根遂能長肉而愈隨經絡証候服除風熱蕪引經之藥以除根



本可獲全功也

○蟾酥膏

蟾酥

寒食麩炒

白丁香樹五 寒水石炒

巴豆五粒

右各另研和作一處再研煉蜜為丸如菉豆大每用二  
丸或二三丸納入針竅中如膿未盡再用數丸以膿盡  
為度

○綠雲膏

黃連

大黃

黃芩

玄參

黃柏

木鱉子

去壳以上各一錢

右細切用香油一两同煎焦色去藥入淨松香五兩再  
煎成膏濾入水中扯接令金色公鋤再熬放溫入後藥  
猪膽汁三箇銅綠三不醋浸一宿綿去粗

右用竹篦帶溫攪勻然後如常攤貼再治瘡口不乾加  
乳香浸藥輕粉尤妙

○金靈膏去腐肉不傷良肉新肉

桑柴灰

五碗用沸湯十碗汁用草傘一層皮帶二層放瓦底火置灰於上淋之

穿山甲

二兩煨

信砒 二錢

杏仁

七枚去皮

山甲研細

生地黃 二兩 辰砂 一錢

粉霜

另研

射香 各五分

右將灰汁濾澄清下鍋煎濃下甲末候焦乾一半下射香次下粉霜乾及丸分下辰砂候成膏下炒石灰末以成塊子即收入小罐子內勿見風

石上皆

○龍珠膏

罐子

龍牙草

五兩

棘棗根

半兩

海藻

二錢半

蘇木

半兩

右細切量水二十碗煎至十二三碗濾去粗又用



堊東

桑柴灰 二碗半 石灰 二碗半 蒼耳草 灰 二碗半

以草紙二層皮紙二層放羅底次置灰於上用煎湯熱淋取灰汁十碗許澄清入鍋內煎成膏用巴豆霜白丁香石膏射香輕粉磁罐子收貯每用取付核上再付即去舊藥併靨再上新藥其核即潰而愈根小者但只塗藥於根上其核自潰

○救苦化堅湯治瘰癧馬刀按瘰癧在耳下或耳後下頸至有上或入缺盆中乃手足少陽之經分其瘰癧在頰下或至頰車乃陽明之經分受心脾之和而作也今將二証合而治之

黃芪 一錢護皮毛間腠理虛及活血氣為瘡家之聖藥又實表補元氣之妙劑也  
人參 三分補肺氣之藥也如氣短不調及喘者宜加之  
炙甘草 半錢能調和諸藥消火益胃氣亦能去瘡中之

真漏蘆

升麻

各一錢 葛根半錢以三味俱足而明

連翹

諸一錢以一味乃十二經中之藥不可無也散

牡丹皮

三分去腸胃中留滯宿血 當歸身三分

生地黃

三分熟地黃三分以三味諸經中和血生血活

白芍藥

三分如夏月倍之其味酸氣寒能補中益氣之

肉桂

二分大辛熱能散結積陰症瘡瘍須當少用之此

浮凍之氣

如有煩燥者去之

柴胡

八分功同連翹如瘡不在少陽經則去之

黍粘子

三分無腫不用 羌活一錢 獨活半 防風半

巴上三味

必問手足太陽証脊痛項強不可回顧腰似

折項似

後者是也其防風一味辛溫如瘡在膈已上金

無手足太陽經証亦當用之為能散結去上邪風邪

昆布

二分其味太鹹若堅硬者宜用 荆三稜炮二分

廣木

炮三分以一味若瘡堅硬甚者用之如不甚堅硬



益智一分如鹽多者胃不和也或病人吐沫吐食胃中

麥蘖又治腹中結急神效炒二分食不消在者用之

黃連三分治煩悶厚朴如腹脹者加之二分黃柏三分

分如有熱或腿脚無力如之勿用右件共為紐末湯浸蒸餅捏作餅子日乾搗如米粒大

每服三錢白湯送下○如氣不順加橘紅甚者加木香

少許量病人虛實臨時斟酌與之母令藥多妨其飲食

此為大治之法也○如止在陽明分者去柴胡黍粘子

二味餘皆用之○如在少陽分為馬刀挾癭者去獨活

漏蘆升麻葛根更加瞿麥二分○如本人素氣弱其病

勢來時氣盛而不短促者不可考其平素宜昨氣盛而

從病變之推也宜加黃芩黃連黃柏知母防已之類視

和氣在上中下而用之○假令在上焦加黃芩半酒洗

半生用

吳泰作  
乃余未



在中焦加黃連半酒洗在下焦則加酒制黃芩知母防  
已之類選而用之○如太便秘不通而茲其邪盛者加酒  
制大黃以利之○如血燥而大便乾燥者加桃仁泥酒  
制大黃二味○如風結燥不行者加麻仁大黃以潤之  
○如風遊而大便不行加煨皂角仁大黃秦朮以利之  
○如脉澁覺身有氣澁而太便秘不通者加郁李仁大黃  
以除風燥也○如陰寒之病為寒結秘而太便秘不通以  
局方中半硫丸或加炮附子干姜煎水冷服之○大抵  
用藥之法不惟瘡瘍一家諸疾病重人素氣弱者當去  
苦寒之藥多加人參黃芪甘草之類為火而先補其元  
氣餘皆倣此

○柴胡連翹湯治男子婦人馬刀瘡

中桂一分

當歸稍五分黍粘子

炙甘草



酒黃柏

生地黃各一錢半 柴胡一錢半 黃芩炒

酒知母

連翹各一錢 瞿麥二錢

右細切作一服水二盞稍熱服

○消腫湯治馬刀瘡

黍粘子炒

黃連各五分 當歸稍

甘草各七分

瓜蒌根

黃芪各一錢 生黃芩

柴胡去芦各一錢二分

連翹二錢

紅花少許

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗稍熱服

○柴胡通經湯治小兒項側有核堅而不潰名曰馬刀瘡

柴胡去芦

連翹

當歸稍

生甘草

黃芩

桔梗

黍粘子

荆三稜各二分

黃連五分

紅花少許

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗食後稍熱服忌

苦藥泄大便

○散腫潰聖湯治馬刀瘡結硬如石或在耳下至缺盆中或肩  
上或脇下皆手足少陽經中及瘰癧遍於頸或至頰車堅  
而不潰在足陽明經中所出或二証瘡已破流膿水並皆  
治之

黃芩 八分 酒洗半炒半生 草龍胆 酒洗四變

瓜棗根 酒洗 黃柏 酒制炒 知母 酒炒 桔梗 去芦

昆布 酒洗各柴胡 四分 炙甘草 荆三稜 酒洗炒

廣木 酒拌炒連翹 各三分 葛根 二分 白芍藥 二分

當歸梢 二分 黃連 升麻 一分

右細切作二服水二盞先浸半日前至一盞去粗食後

稍熱服於卧處伸足在高處頭低垂每含一口作十次

嚥下服畢少頃依常安卧取藥在膈上停蓄故也是攢



一料作細末煉蜜為丸如棗豆大每服百餘丸以前藥送下或加海藻五分炒入亦妙以海藻反甘草與東垣

○升陽調經湯治瘰癧透頸或至頰車此皆出足陽明胃經中來若瘡深遠隱曲肉底是足少陰腎經中來乃戊脾傳於笑腎是夫傳與妻俱作塊于堅硬大小不等並皆治之或作丸亦妙

升麻 八分 葛根

黃芩 廣木

炙甘草 各四分 當歸 稍

知母 酒炒一錢 一本有黃連酒洗連翹桔梗生黃芩

右細切作一服水二盞先浸半日煎至一盞去粗臨卧

稍熱服外另稱十貼之數為細末煉蜜丸如棗豆大每

服一百丸服藥時足高去穢仰卧啗一口作十次嚥之

草龍胆 用酒四次制炒

荆三稜 三味俱酒制炒

芍藥 各三分 黃柏 酒炒

留一口在後送下丸藥服畢寢卧如常

瘰癧○連翹散堅湯治耳下或至缺盆或有上生瘰癧堅硬如石動之無根名曰馬刀瘡從手足少陽經中來也或生兩脇下或已流膿作瘡未破並皆治之

柴胡二錢

草龍膽酒制

土瓜根酒制炒各一錢

黃芩酒炒

當歸酒炒

生黃芩

廣木

荆三稜酒炒

連翹

白芍藥

各五錢甘草三分

黃連酒炒

蒼朮

米泔浸各二分

右細切作一服外另秤十貼之數為細末煉蜜丸如棗豈大每服百餘丸煎者用水二盞先浸大半日煎至三盞去粗臨卧稍熱服去枕仰卧每口作十次嚥之留一口送下丸藥服畢如常安卧更以後藥塗之



龍泉粉炒即磨刀石上粉也 虎粉 廣木

荆三稜酒洗炒 昆布各五錢

右同為細末煎熱水調服之用此藥去疾尤速

生

○三聖丸治癰瘰神効切藥

丁香五十粒 斑猫十箇去翅及頭足炒 射香一錢

右為末用鹽豉五十粒湯浸爛研如泥和前藥末丸如

菴豆大每服七丸食前溫酒送下日三服至五七日覺

小便淋瀝是藥之効便如服或小便下如青筋膜之狀

乃病之根也忌溫麪毒食

瘡瘍 ○立驗大聖散治癰瘰切藥

斑猫大者三十箇去頭及翅足用糯米一合同炒米黃

白姜蚕一歲去系帶炒 黑牽牛半生半炒共三歲取頭

荆芥穗一歲

右為細末每服一錢空心無灰老酒下服此藥須忌魚  
肉酒醋鹽醬及發風動氣等物止可吃菜蔬白粥且如  
次早服藥隔夜不吃夜粥黃昏煎川木通湯調下玉雪  
妙靈散二錢重次日五更酒調立驗大聖散一貼如不  
能飲酒用燈心木通湯調下至日中覺小腹攻痛小便  
澀痛又用燈心湯調下琥珀末一錢或玉屑妙靈散亦  
可當利惡物從小便中出如蒲荷肉狀中有凝血一點  
或未下三日後可再服至日中前用六丁神散一服催  
之必然自下五六日後再催一服以病根除盡為度如  
項上有瘰一枚取下惡物十枚則盡病根如有小腹攻  
急莖中澀痛之惱不必驚恐過後便自平復無事

○玉屑妙靈散

活石細研為末每服一錢煎川木通湯調下



藥場

○六丁神散

苦丁香 六枚或秤六錢重 白丁香 一錢 苦參末 五分

赤小豆 一錢 磨刀泥青石者佳 一名龍 大斑蝥七箇去

白姜蚕 去系甯炒各一錢

右共為細末每服一錢重空心無灰酒調下

△癰瘤方法

大成方

破結散治石癰氣金癰血癰肉癰馬刀癰瘰癧等証

海藻酒洗淨 龍胆草酒洗 海蛤粉 通草

貝母去心 昆布酒洗淨 礬石枯 松蘿各三錢今

煨 麥麴炒四錢 半夏麴二錢

右為細末每服二錢熱酒調食後服忌甘草鯽魚雞肉

五辛生菓○有久於項上生瘰癧大如茄子潮熱不食形

瘦日久百方不效後得此方去松蘿加真桑寄生一倍

瘡瘍

服三五日後其瘡軟而散熱退而愈屢醫數人皆効  
○南星散治皮膚頸項面上瘡大者如拳小者如粟或軟  
或硬不痒不痛宜用此藥切不可輒用針灸多致不救

生南星 大者一枚

右細研爛入好醋五七點杵如膏如無生者即以乾者  
為末醋調如膏先以細針刺患處令氣透却以膏藥攤  
貼覺痒則頻換貼取効

○瘡者氣血凝滯結聚而成或如桃李或如瓜瓠其名有六曰  
骨痛曰脂瘡曰膿瘡曰血瘡曰筋瘡曰風瘡以其中各有  
此物而名之也已上諸瘡通用龍珠膏治之

○龍珠膏 方見前瘰癧條下

○瘡宜服十六味流氣飲 方見前妳岩條下

○九癭氣先須斷厚味用海藻一兩黃柏一二兩為末置掌中時



時紙之以津唾嚥下待消三分之二止藥

△結核方法

○丹溪曰但九結核在項在臂在身如腫毒不紅不痛不作膿者多是痰汪不散名曰痰核用二陳湯加酒炒大黃連翹桔梗柴胡煎服

○又方治臂核作痛用二陳湯加連翹川芎皂角刺防風黃芩酒炒蒼朮煎服

○治耳後頂門各有一核用炒姜蚕酒蒸大黃青黛牛胎南星為末蜜丸噙化

△疔腫方法

○石香程氏曰疔腫之証皆蓄熱毒之深而成者也近者多見因食災牛疫馬之肉而成此証其形有十三種皆以形而名之耳一曰麻子疔二曰石疔三曰雄疔四曰雌疔五曰

火疔六曰爛疔七曰三十六種疔八曰蛇眼疔九曰癰疽  
疔十曰水洗疔十一曰刀鑱疔十二曰浮腫疔十三曰牛  
狗疔惟三十六種疔最為可畏其狀頭黑浮起形如黑豆  
四畔大赤色今日生之明日生之後日生三乃至十數亦  
為可治若滿三十六則為不治之証也夫十三種疔其形  
狀雖各不同而其所由皆熱毒之甚也治法並急用奪命  
丹下之去其毒之銳勢次服化毒丸及內托散二散散雖  
射湯隨証經絡病勢緩急用引經藥斟酌施治如無他証  
有熱即退熱有腫則退腫如身冷自汗嘔逆燥喘狂喝妄  
語直視者皆毒氣入內不可治矣如疔已拔去用金銀白  
芷散加減十宣散調之方獲全安也

今將十三種疔証候開列于後

○一曰麻子疔其狀肉起頭如黍米色稍黑四邊微赤多痒忌



食麻子近油衣布衣并入麻油中行

○二曰石疔其狀皮肉相連色如黑豆甚硬刺之不入肉微痛忌瓦礫磚石之屬

○三曰雄疔其狀炮頭黑靨四畔仰炮漿起有冰出色黃大如錢孔形高者忌房事

○四曰雌疔其狀瘡稍黃向裏靨亦似灸瘡四面炮漿起心凹色赤如錢孔者忌房室

○五曰火疔其狀如湯火燒灼瘡頭黑靨四邊有煙爛又如赤粟米者忌火燒烙

○六曰爛疔其狀色稍黑有白斑瘡中潰有膿水流出瘡形不小如匙面者忌熱食爛物

○七曰三十六疔其狀頭黑浮起形如黑豆四畔起赤色今日生二明日生二及至十數未滿三十六猶可施治若滿三

十六藥所不能治也忌噴怒蓄積怨恨

○八曰蛇眼疔其狀瘡頭黑皮浮生形如小豈狀似蛇眼大體

硬忌惡眼人看瘡瘕妬人見忌毒藥

○九曰鹽膚疔其狀大如匙面四邊皆赤有黑粟粒起大忌食  
鹽味

○十曰水洗疔其狀大如錢形中如錢孔瘡頭白裏黑靨汁出

中硬忌飲漿水水洗渡河

○十一曰刀鏹疔其狀闊狹如薤葉大長一寸左側肉黑如桃

烙忌刺及刀鏹切割鐵刀所傷可以藥治不可亂攻

○十二曰浮漚疔其狀瘡體曲圓少許不各長而狹如薤葉大  
內黃外黑黑處刺之不痛黃處刺之痛

○十三曰牛狗疔其狀肉色皰起顛不破

右十三種疔瘡初起瘡心先痒後痛先寒後熱熱定則



寒多四肢沉重心驚眼花若大重者則嘔逆嘔逆者難治其麻子疔一種始末惟痒初錄忌者不得觸犯觸犯者發作難治其浮瀉疔牛狗疔兩種無所禁忌縱不療亦不能殺久其伏寒熱與諸疔不同皆宜將護依法治療禁忌不得觸犯若或觸犯脊強瘡痛極甚不可忍者是也又云疔腫初發時突起如釘故謂之疔令人惡心惡寒四肢強痛一日瘡變為焦黑色腫大光起根硬刺之不覺痛皆其候也在手足頭面胸背骨節間最急其餘處則可治毒入腹則煩悶恍惚似醉如此者三二日間死矣皆不可不速治也

○返童丹經云汗之則瘡愈必用此藥活之

乳香

沒藥

辰砂

雄黃 各一錢半

片腦

射香 各五分 海羊 即蝸牛也 不拘多少

蟾酥

青黛

粉草

朋砂各一錢

右為細末用海羊搗膏為丸如雞卵加酒麩糊些少丸如彈子大每服一九蒸生葱頭二三箇細嚼嚥下疔腫及癰腫毒氣入隔者得微汗即解○一方加銅綠寒水石輕粉枯礬各一錢重按上藥皆非發汗之藥蓋能解也化

○拔疔法以黑牯牛牽於石塔上必撒糞候糞上生菌取焙乾與稀養草葉等分為細末先用竹筒兩頭去節一頭解十字路將不解頭套在疔上以線緊縛竹筒陷入肉內為度以前藥末一匙滴水和之放於筒內少時藥滾起則疔自拔起若一次未效漸加度數其疔必拔也

○奪命丹

巴豆

兩去壳醋煮一伏黃丹三錢

硃砂



雄黃 各三錢 乳香

鬱金 各五錢 大黃 一兩

輕粉 二十分 蟾酥 半錢 或飛羅麝 三兩

右為細末 蠟水糊為丸 如棗豆大 隨身年分虛實加減  
丸數服之 以下其毒 如無奪命丹 雄黃丸代之亦效

○雄黃丸

雄黃

鬱金 各一錢 巴豆 十四枚 射香 少許

皂角

全蝎 各一錢

右為細末 滴水為丸 如棗豆大 每服二十丸 清茶送下  
亦看大小虛實斟酌 加減丸數

○化毒丸

片腦

射香 各五分 硃砂

硃砂

雄黃 各二錢 輕粉 十兩

蟾蜍 洗去土

右為細末 新取蟾酥為丸 如棗豆大 每用二丸 放於舌

上取涎而愈

○獨蟾九併取蟾酥法

拿取活蟾即大吐蝦蟇通身有傀儡者俗名癩蝦蟇又

捉住後脚以大桑葉或油半紙包掩其頭用鉄釘一箇

拈取眉間白汁以汁澆於葉上凝結如濕真粉就丸如菉豆

大一蟾或作一丸多者作二丸懸當風處陰乾如患疔

腫者即以一二丸置舌尖上仰卧片時其苦水滿口就

以此水嚥下或以鉄鍼刺開疔腫頭上納藥一丸於中

外以薄皮紙貼護之勿令藥脫落背癰及一切癰腫初

起時亦可依此法治之神効七上取蟾酥之法切防戕

○雄射湯解疔毒如神九解毒不可無雄黃硃砂

雄黃另研硃砂另研各真菉豆粉雄射香另研

乳香另研白芷各茜草根地丁草各二錢



金卷之六 五十四

牡蠣

姜蚕

牛蒡子炒

大黃

金銀花

青木香

梔子

荊芥穗

朴硝

甘草各一錢

胡桃二箇去  
虎膜

右以白芷以後一十四味細切用無灰酒一碗浸少時  
搗細又加水一碗同煎至三碗去粗及濁脚入煎雄黃  
等五味調勻作一服更審患處經絡分野依東垣引經  
瀉火藥加之尤妙欲利倍加大黃朴硝二味臨後下○  
茜草即過山龍地疔即大薊也一云薊乃草開黃花者  
名紫花地丁

○二活散

羌活

獨活

當歸

烏藥

赤芍藥

金銀花酒洗

連翹

天花粉

甘草節

白芷銕粉

紅花

蘇木

荊芥

蟬蛻

乾葛

各三錢

檀香

二錢

右為細末每服三錢煎蒼耳湯調下

○取疔散

雄黃

硃砂

蟾酥

信石各一錢

巴豆十粒

輕粉十盞

右將疔四畔用針刺破醋調塗疔落後用長內拔毒

膏藥貼之

已上候見  
瘡瘍集驗○鮮毒丸

白芷十兩

丁香五兩

蘿蔔子

去壳醋浸炒另研細末

貫衆

取新者去皮切晒乾

朴硝

四兩

硃砂

一錢六分

京墨

八錢各另研

右和勻糯米糊丸如龍眼大青黛為衣陰乾每服一丸

無灰酒磨化下



○賀藍先生解毒丸解諸藥毒及山嵐瘴氣災牛馬猪羊肉毒  
魚腥麪菜毒暑熱濕毒傷寒濕毒小兒斑疹喉痺急証紅  
赤癰腫及諸般無名腫毒

黃栢

貫衆

茯苓

藍根

葛根

生地黃

雄黑豆

甘草

滑石

硝砂

陰地蕨

薄荷 各三兩

益智

大黃

寒水石

紫河車 即金龜子

馬勃

草龍胆

姜蚕炒

百藥煎

山梔子 各一兩

右為細末煉蜜丸每一兩分作十丸細嚼新汲水送下

小兒驚風薄荷汁下蜜水浸蒸餅為丸亦可或加黃連

白芷

局  
○萬病解毒丸

射干

文蛤

即五倍子

杏仁

右膏

續隨子

去油

蚤休

即金線重樓

土硫

大戟

山豆根

山茨菰

白藥子

大黃

酒蒸各二兩

射香二錢

青黛

威靈仙

白芷

冬一兩

黃連

風化硝

各半兩

右為末糯米糊為丸如彈子大青黛滑石細研為衣陰乾此藥解一切毒蠱毒鼠菴毒河豚毒魚毒菌毒疫死牛馬肉毒喉痺骨鯁竹木刺毒並用急流水磨下癰疽發背疔腫瘡瘍毒蛇咬蜈蚣蜂蝎螫毒刀斧湯火傷並用井花水磨下併塗傷處婦人忌胎惡氣積塊虫積心胃痞滿肚腹膨脹並用好酒磨下

○千金漏蘆湯治疔腫神効

漏蘆

連翹

黃芩

白欬



枳壳

升麻

麻黃

去根節朴硝礬各一兩另

大黃

地丁

金銀花

各半兩

○取疔腫方

青木香根鈕木香

雄黃

甘草各一錢

○破毒散

信石

礞砂

黃丹

雄黃

乳香各一字

班猫

五箇去

射香

少許

○灸法以大蒜爛搗成膏塗瘡四圍留瘡頂以艾炷灸之以爆  
右為末取新蟾酥和丸如菽豆大以銀針破開疔頭納  
藥一丸在內外以膏藥護之如無蟾酥加麝糊此少

為度如不爆稍難愈宜多灸百餘壯無不愈者

○祖傳經驗秘方治食災牛馬肉成疔腫欲死者以柏油木葉

搗絞取真汁一二碗頓服之得大瀉毒氣而愈如冬月無  
葉時取嫩根研水服之亦効未利再服以利為度

△諸瘡方法

○活瘡丹治一切惡瘡大有神効

血竭

乳香

沒藥

銅綠

枯白礬

黃丹

穿山甲

煨鱗輕粉

蟾酥各五分射香少許

右為細末用蝸牛搗膏為丸如菉豆大每服一丸重者

二丸又用葱白一寸嚼爛裹藥熱酒送下食前服

○又方用真姜蚕蟬蛻二味等分為末香油調付拔疔効

○治諸般惡瘡



經霜芭蕉葉為末香油調付先用忍冬藤葱椒蒼耳草煎湯洗瘡淨搥乾付藥外以油紙掩之

○又方治諸般惡瘡用松木上白蟻泥黃丹各等分炒黑香油調付用油紙夾上日易後用龍骨浸藥敷瘡口收肉

○又方治惡瘡用黃丹入香油煎入朴硝抹之

○天泡瘡服防風通聖散及用蚯蚓糞炒蜜調付之從肚皮上起者裏熱發外還用通聖散藥炒之

○又方治天泡瘡用野菊花棗木根煎湯洗黃柏滑石末付

○治脚上沙瘡清水出者用紫燕窠泥畧炒黃柏一味共為末香油調付

○治膿瘡用白膠香二兩黃柏石膏各二兩青黛五錢龍骨半錢為末香油調付

○又治膿瘡方以香油一兩入胎髮如梅大煎焦煇去粗入白

膠香黃蠟各一两烱化入生龍骨赤石脂血竭炒各一两攪勻候冷磁器盛捏作薄片貼瘡上外以竹箬包之三日後翻過藥再貼以活血藥煎湯洗之

○又治膝瘡方用箭箬剪去兩頭以黃栢煮汁令稠和白膠香草麻子同搗成膏攤箬熨面折縛光面貼之先以清茶放溫洗挹乾貼之

○又方治外膝脚瘡用竈心黃土研極細入黃栢赤石脂黃丹各半兩輕粉乳香沒藥各一錢細研和勻以清油調如膏以油絹攤藥將絹面貼於瘡上外以油紙掩之札縛定縱痒不可開視數日後未愈再換藥緊縛直待結痂去藥先必以茶清洗瘡淨付藥

○桃花散治一切瘡生肌藥

白芨

白斂

黃栢

黃連



乳香另研

射香另研

黃丹各等分

右為細末，搽於瘡上，二三日，生肌平滿，如故。

○治火燒及湯泡瘡，用經霜桑葉焙乾，燒存性，為細末，香油調付，或乾付，二三日，結痂平復。

○又方：治火燒湯泡瘡，時取黃蜀葵花，以香油浸之，其花日漸煇於油中，以此油付瘡，即愈。或只收花，焙乾，為末，香油調付，亦妙。

○下疳瘡，用青黛、海蛤粉、蜜陀僧、黃連，為末，付之。○又方：以雞內金燒存性，為末，付之。

○又方：治下疳瘡，用鳳凰退燒存性，為細末，香油調付，外看瘡大小，剪壳中白膜貼之，須靜坐一日，不動，即結痂矣。

○頭瘡，用猪油一錢，半生熟雄黃、水銀各二錢，伍分，和勻，付之。金絲瘡，其狀如繩線，巨細不一，上下行，至心即死，可於瘡頭

上截經刺之以出血後嚼萍草根付之立愈

○手痴瘡用皂角枯礬輕粉黃連黃柏為末付之

○砂瘡用搗地藤燒灰付之

○諸瘡痛不可忍者用苦寒藥可施於資稟厚者若稟氣薄者宜於補中益氣湯中加苦寒藥也若血熱之人瘡痛宜四物湯加黃芩鼠粘子連翹左下加黃柏若肥人濕熱瘡痛宜防風羌活荆芥白芷蓋風能勝濕故也

○疥瘡併馬疥瘡用馬鞭草不犯鐵器搗取自然汁半盞飲盡十日內愈神效

○白癬風癬以小麥攤石上以鐵器燒紅壓出油搽之立效

○治風癬疥瘡用梓樹葉木綿子羯羊屎鼠屎盒蓋付之

○治癬瘡用浮萍末一两蒼耳子蒼朮各二两苦參一两半香

附二錢半黃芩五錢水煎洗之



○身上虛痒用四物湯加黃芩煎調浮萍末一錢服

○又方治通身痒用凌霄花為末酒調服一錢

○秘傳一擦光治疥瘡及婦人陰蝕瘡漆瘡天火丹諸般惡瘡

神効

蛇床子

苦參

蕪荑各一兩雄黃半兩

枯礬

錢一兩二硫黃五錢

輕粉二錢

樟腦二錢

大風子

錢五錢川椒半兩

右為細末生猪油調付

○又方治証如前蕪荑小兒癩頭瘡治之

蛇床子

一兩雄黃五錢

硫黃一兩

枯礬二兩

大風子

半兩川椒半兩

黃柏一兩

輕粉二錢另拌

牛皮岸

薰牛皮烟岸也如無以香炉岸代之一兩

黃丹一兩

右為細末生豬油調付

○凡先哲治癰疽要方俱採撫于後以備選用

○五香連翹湯治癰疽未成膿者服之可散但當看時令  
及資稟加減用之

乳香

木香

沉香

丁香

連翹

射干

升麻

木通

桑寄生

射香

獨活

大黃 各等分

右細切每服三錢水一大盞煎七分去粗溫服

○內托復煎散托裏健胃

地骨皮

黃芩

茯苓

芍藥

人參

黃芪

白朮

桂心

甘草

防己

當歸 各半兩 防風 一兩

蒼朮 半斤



右細切先以蒼朮用水五升煎至三升去朮入煎十二  
味再煎至三四盞取清汁作二四次終日飲之又煎蒼  
朮粗如前再煎諸藥粗服之

○白芷升麻湯治手陽明經分臂上生癰左右寸部脉皆短得  
之俱弦按之洪緩有力此得之八風之變者

白芷 一錢半 升麻

桔梗 各一錢 甘草 炙半錢

黃芪 四錢

酒黃芩 四錢

生黃芩 三錢

紅花 五分

右細切分二服水酒各一盞煎至一盞溫服

集癰湯

○托裏散治一切惡瘍發背疔腫便毒始發脉洪數弦實  
腫甚將作膿者三服消盡

大黃

牡蠣

瓜蒌根

皂角刺

朴硝

連翹 各六分

金銀花

當歸 各二錢

赤芍藥

黃芩 各四分

瘡瘍 ○又托裏散

右細切作一服水酒各一盞煎至一盞四分服

黃芪

當歸

金銀花

甘草 各等分

右細切每服一兩酒水合煎更詳部位各加引經藥尤妙

瘡瘍

○烏金散治癰疽疔腫時毒附骨疽諸惡瘡等証若瘡黑陷如石堅四肢冷脉細或時昏冒譫語循衣煩渴危篤服此汗之即瘡起

蒼耳頭

五月五日午時收

草烏頭

火麻頭

六月

木賊

去節

蝦蟇頭

搯皮節

酥炙

麻黃

去根節

右晒乾各等分同入磁器內鹽泥固濟烈火煨從早至

申時如黑煤色為度研為末每服二錢病重者三錢熱

酒調下未汗再進一服如汗已乾却服解毒疎利之藥



如修合此藥必選天時清明好日於靜室中合勿令雞犬猫畜及陰人孝子見之

東○黃芪六一湯治癰疽發渴

黃芪六兩 甘草一兩炙

右細切水煎不拘時服

精要○一方治一切瘡癰疽發背殊効亦能下瘀血

大黃三錢 甘草

辰砂

血竭各一兩

右為細末酒調服

精要○內托護心散

乳香一兩 真桑豆粉四兩一方用二兩

右為細末每服二三錢煎甘草湯或新汲水調下

瘡瘍○小五香湯

木香

沉香

乳香

藿香

連翹 各二錢射香另研少許

右為細末每服二錢水一盞煎七分溫服

方局 ○復元通氣散

當歸

穿山甲 煨去 川芎

天花粉 炒略

青皮

陳皮 各一兩 大黃

甘草

黑丑 頭末各半兩

右為細末每服二錢溫酒調

埭 ○金銀白芷散

黃芪

當歸 各一錢 枳櫛

川芎 各五分

甘草 一錢

天花粉 五分 乳香

沒藥 各三分

皂角刺 去尖

金銀花 各半錢 防風 三分

白芷 一錢

右為細末分三服每服水酒各半盞煎連相服

集瘡瘍 ○正鉄箍散



貝母

去心五兩

白芷

蒼耳

醋拌晒乾各二兩

或加龍骨二錢尤妙

右為細末水調或香油調貼瘡上

瘡瘍○大鉄穰散

芙蓉

猪卷皮

本鱉子酪四

白芷

黃栢

寒水石各二兩

紫荊皮各一兩

赤豆

白歛各二兩

防風半兩

貝母二兩

真地青

羌活各一兩

右為細末凉水調圍癰四畔如肉脆去白芨白歛加生

地黃地榆用芭焦油調付熱甚者用三消散

瘡瘍

○三消散退極熱証赤腫焮開者

朴硝

焰硝

大黃

梔子炒黑色

寒水石

南星各等分

瘡瘍

○雲母膏治一切癰疽瘡癰折傷等証

右為末生地黃汁調塗貼芙蓉葉汁調亦可

蜀椒去目及開口者微炒白芷

沒藥

赤芍藥

肉桂

當歸

鹽花

菖蒲

麒麟竭

黃芪

白芨

芎藭

木香

龍胆草

白欬

防風

厚朴

射香

桔梗

柴胡

松脂

人參

蒼朮

黃芩

乳香

附子

茯苓

良姜

合歡皮鎔五硝石

甘草

雲母各四兩

栢葉

桑白皮

槐枝

柳枝

水銀以絹另包

各二兩膏成以手細彈錘在上

陳皮各二兩

清油

四十兩黃丹二十兩



右除雲母硝石麒麟竭乳香沒藥射香黃丹益花八味  
另研外余藥並細切入油浸七日文火煎以柳枝不住  
手攪候匝沸乃下火沸定又上火如此者三次以藥黑  
色為度去粗雨熬後入丹與八味末仍不住手以槐柳  
枝攪滴水中成珠不軟不硬為度磁器收貯候溫將水  
銀彈上用時先刮去水銀或服或貼隨宜用之其功甚  
大也

○太乙膏治一切癰疽瘡癤貼之神效亦可內服謹証經絡  
作湯使送下

玄參

白芷

當歸

肉桂

大黃

赤芍藥

生地黄

各一黃丹

真麻由二斤

右細切入油浸夏三日冬十日春秋七日文火煎黑色

去粗入黃丹再熬以槐柳枝不住手攪滴水中成珠子  
軟不硬磁器收貯

○神異膏治諸般癰腫廊毒殊効

露蜂房

有蜂兒多者佳

玄參半兩

黃芪七錢半

金蛇退

半兩晒乾

用水盪洗淨

杏仁

皮尖

黃丹

五兩飛

香油

十兩

亂髮

如雞子大一塊無病壯年男子者佳

右先將香油入亂髮於銚中文火熬候髮焦燂盡以杏

仁投入候杏仁黑色用真絹濾出粗用將油入銚中熬

後下黃芪玄參二味文火熬一二時久住火候片時大

力稍息旋入露蜂房蛇退二味以柳枝不住手攪慢火

熬至紫黑色又將用綿濾過去粗入爐中文武火熬下

丹急攪千餘轉滴水中成珠子膏即成矣冬月畧嫩些

夏月畧硬些磁器盛貯隨意攤貼



驗○萬槌青雲膏治諸般癰腫未成膿者貼散已成膿者拔毒

追膿腹中痞塊上瘡疾貼大椎及身柱其效如神

白松香 一斤去木屑 草麻子 三百粒去壳

杏仁 三百粒 銅青 三兩 乳香 沒藥 各一兩半

輕粉 二錢

右共作一處用鉄槌木砧於日中搗成膏如燥少加香

油拌之或用石臼木杵搗亦可用磁器盛緋帛攤貼湯

中微火

驗○一方治背癰附骨疽乳癰及一切癰腫未成膿者發散極

效了

槐花 焦色 兩 炒 胡桃 十個 新鮮不油者連壳煨火煨熟去

右二味於沙盆中研爛如泥熱酒調和粗溫服如能飲

酒人多飲愈效一醉後而癰腫散矣

○猪鬃散治癰疽發背及一切瘡毒等証效如神

猪鬃草 其葉長如斗舌其氣如猪臭者 小薊根

五瓜龍 即五葉藤 生大蒜

右四味各等分細研用酒和勻漉去粗服二碗得大汗  
通身而愈

○又方治諸般癰腫神效 即上並祖傳方

新掘天門冬一味約三五兩洗淨入沙盆內研細以好  
酒盪起漉去粗頭服未效再服一二服必愈



論

癘風

癘與癘通六十一

內經曰風之傷人也或為寒熱或為熱中或為寒中或為癘風又曰癘者因榮衛熱腐其氣不清故使其鼻柱壞而色敗皮膚瘍潰風寒客於脉而不去名曰癘風丹溪曰是受天地間殺物之風故也然近見病此者原其所由多是熱血得寒所致或夏月勞甚而入寒泉澡浴或冬月酒後而乃賜水復霜及入水取魚由是濕熱鬱于內而不散風寒客于外而不行內外怫鬱既久而漸成肌肉之敗腐矣經所謂熱勝則肉腐是也夫抵此証肺歸重於手足陽明之經蓋手足陽明者胃與大腸主之脾肺二經之府也脾主肌肉而肺主皮毛乃府及於藏病也經又曰腸胃為市無物不受無物不包故其熱毒積于中而形於外耳故治法必先取陽明而後及於大

陰亦本而標之之義也又濕熱甚必生風風甚則生虫如腐  
草為蠶之類又治法必先殺其虫瀉其火然後生血涼血祛  
風導滯降陽升陰皆為治之急務也治雖多門大畧不越乎  
此也李者詳之

脉法

脉兩寸浮而緊

或浮而洪

陽脉浮弦陰脉實大

脉浮緩者易治

洪大而數者難愈

沉實者難愈

脉溢者病在上

脉浮者病在下皆為不治之証也

方法 丹溪方法凡五條

丹溪曰大風病是受天地間殺物之風古人謂之癘風者以  
其酷烈暴悍可畏耳人得之分在上在下氣受之則在上  
血受之則在下氣血俱受則在上復在下然皆不外乎陽  
明一經陽明者胃與大腸也無物不受治之者須致意看



其疔瘡與瘡上體先見者多者在上也下體先見者多者在下也在上者以醉仙散取涎血於齒縫中出在下者以通天再造散取惡物虫積於穀道中出後用防風通聖散調之更用三稜針於委中出血夫上下同得者甚重自非醫者神手病者鉄心卒能免此夫從上或從下以漸而來者皆是可治之証人見其病勢之緩多忽之以法治之雖已全愈若不絕味斷慾皆不免再發而終於不救也予治五人矣其不死者惟一婦人因貧甚無物可食耳餘皆三四年後再發孫真人云嘗治四五百人終無一人免於死非真人不能治蓋無一人能守禁忌耳其婦於本病外又服百餘貼加戒四物湯半年之上月經行十分安愈

醉仙散酒量人大小虛實與之証候重而急者須先以再造散下之候補養得完復與此藥須新鹽醬醋諸魚椒菓煎



炒燒炙等物止可淡粥及淡羹熟時菜雖茹亦不可食惟  
烏稍蛇菜花蛇淡酒熬熟食之可以助藥力也

○外科精要為諸瘡立法而不及癰風蓋風為百病之長以其  
殘害膚體去死不遠一有染此鮮能免者比之瘡瘍治法  
為難乃不言及夫八方之風起因於八方應其時則物生  
違其時則殺物人之稟受有殺氣者則感而受之如持虛  
受物後又因起居飲食男女游成鬱氣一氣積于厥躬脾  
先受之乃為濕病濕積之久火氣出焉火氣滋蔓氣濁血  
污一云血熱凝結其氣不清化生諸虫以次傳歷臟府必死之病而有  
可生之理其始病者胃氣微傷脾主肌肉流行甚緩傳變  
以漸或可藉醫藥之功而免謂之必死非惟鑒不知藥悉  
是不能禁慾可哀也夫

○近見粗工用藥佐以大風子油殊不知此藥性熱有燥痰之



功而傷血至有病將愈而先失明者

○宋洞虛云大風有五黑色不浴餘皆可治虫食肝眉落食肺  
鼻崩食脾聲啞食心足底穿膝虛腫食腎耳鳴啾啾耳弦  
生瘡或痺或痛如針刺狀食身則皮痒如虫行自頭面來  
為順風自足起者為逆風多因感寒熱與痰濁雜氣而成  
治法先以雷公散<sub>即下之以稀粥養半月勿妄動作勞</sub>  
後以醉仙散中間或吐或刺不必怕怯但願喉頭面腫吞  
不得下旋出惡水或齒縫中出臭水血絲或言不得或悶  
而死難以飲食只以稀粥用管灌入或一旬或半月一月  
面漸白而安重者又與換肌散

○換肌散治大風年深不愈者以致眉毛脫落鼻梁崩塌服此  
藥不踰月取効如神

黑花蛇

白花蛇皆黃刺者並用地龍去土各三

當歸

細辛

白芷

天麻

蔓荊子

威靈仙

荊芥穗

甘菊花

苦參

紫參

沙參

木賊

不灰木

炙甘草

白茯苓

天門冬

赤芍藥

定風草

按本草即天麻也今皆用野天麻即益母草未知可否再宜詳之

何首烏

石菖蒲

胡麻子

草烏頭去皮尖

蒼朮

米泔浸去皮

川芎

木鱉子各二兩

右為細末每服五錢溫酒調下酒多為妙

○醉仙散

胡麻子

牛旁子

蔓荊子

枸杞子四味俱炒紫色

白茯苓

苦參

瓜蒌根

防風各五錢寶鑑前四味

各一兩

右為細末每一兩半入輕粉一錢拌勻每服一錢茶清



調下晨午夕各一服後五七日先於牙縫內出臭涎渾身疼痛昏悶如醉後利下膿血惡臭屎為效

○通天再造散

鬱金半兩

皂角刺獨生黑大者去尖

大黃炒各一

白丑

頭末六錢半生半炒

右為末每服五錢日未出時以無灰酒調面東服之當日必利下惡物或臭膿或虫如虫口黑色乃是多年赤色乃是近者數日後又進一服無虫積乃止

○愈風丹治癩疾手足麻木毛落眉脫遍身瘡疹皮膚癢痒爬之成瘡及一切疥癬風疾皆效

苦參

一片研取頭末四兩

土桃蛇一條酒浸二三日去

烏梢蛇

白花蛇各一條並同上制

右為細末以皂角一片剉長寸許段無灰酒浸一宿去

酒以新水一碗，擗取濃汁，去粗銀石器內熬膏，和前末  
丸如梧桐子，大每服六七十丸，煎防風通聖散送下，粥  
飯壓之，日三服，三日浴，以大汗出為應，再三日又浴，取  
大汗三浴，乃安。浴法見後條

○一法用桃柳桑槐楮五般枝，濃煎湯，大缸浸坐，沒頸，一日俟  
湯類油安矣。○本草治惡疾遍身生瘡，濃煎萍湯浴，浸半  
日，大效，此神方也。○又以荆芥穗、大黃、梔子、蘇、金、地、黃、杜  
仲、防風、羌活、獨活、白疾、藜等分為細末，以大風子油入熟  
蜜丸如梧桐子大，每服茶清送下，四五十丸，一日三服，須  
守戒三五年，日誦觀音千萬聲，以攝其心，禁其慾，乃安也。  
○一法以苦參五斤，好酒三斗，漬一月，每服一合，日三服，常與  
不絕，竟脾既安，細末服之，亦良。尤治癰疹，方出圖經、陶隱  
居以酒漬飲，治惡瘡，久服輕身，日華子以為殺蟲本草除



伏熱養肝膽氣予常以蒼耳葉為君以此物為佐更以酒  
煮為蠶魚代補蛇之或缺研細糊丸如梧桐子大每服五  
六十丸加至七八十九丸熱茶清送下日三服一二月而安  
若入紫萍尤捷紫萍多水蛭須寒月於山沼取之淨洗去  
泥畧蒸透乾用

○一法治手指彎曲節間痛甚漸至輒落用葶麻子去壳黃連  
剉如豌豆大各下兩水丁升小瓶浸春夏三日秋冬五日  
取葶麻子破平且時面東以浸藥水服一粒漸加至四五  
粒微利不妨忌猪肉魚腥宜茹淡累獲神効

冊已

上皆

法○一法先服加減通聖散大瀉惡毒穢積又用三稜針

看肉黑處及委中紫脉刺出死血不可令出太過恐損真  
氣後服神仙紫花丸

防風五錢

連翹三錢

川芎五錢

白芍藥三錢

當歸三錢酒洗 薄荷二錢 荊芥穗五錢 麻黃三錢去根

梔子三錢去壳 桔梗五錢 枳殼三錢炒 石膏各五錢

甘草三錢 滑石三錢 黃芩三錢去根 柴胡五錢

黃連五錢 黃柏三錢 生地黄三錢半 羌活五錢

熟地黄三錢半酒洗 錦大黄大兩 芒硝一兩

皂角刺一兩 生者去尖

右細切分八服每服用水一碗半煎至一碗空心服日進二服五六日後又進二服待補養完文行二次然後服後丸藥

驗方錄試 ○神仙紫花丸治癘風及諸般惡瘡風瘡其効如神但

要藥其無有不効者輕者一料可愈重者二三料除根

白花蛇一具出勸黃州黑質白紋龍頭虎口皆上二十

者不堪用去頭尾各四五寸許一兩為牽連皮



何首烏

荊芥穗

歲時仙藥

麻黃

連根節一

胡麻子一錢

蛇床子二錢

右六味細切同蛇用無灰酒一大碗浸一宿去蛇皮骨通晒乾仍還源酒內再浸再晒酒盡為度待晒極乾共為細末另包

木香

沉香各二錢人參一兩

當歸七錢半

胡天麻

猪牙皂角各五錢

射香一錢半鼻

借之

乳香

沒藥各一錢明雄黃

辰砂各五分大塊者佳

肉苳蔻煨一枚定風草二錢半

還瞳子即草決明一兩

右射至辰砂五味各另研極細不見火其餘草木味亦

另研細羅過連煎五味和勻另包

防風去芦

羌活

甘草

細辛

川弓

獨活

蒼朮米泔浸一宿

批杷葉去筋毛焙乾

白芍藥

白蒺藜

金銀花

五加皮

香白芷

苦參各五錢

胡麻子

白附子米泔浸炮

麻黃

川牛膝

草烏頭米泔浸炮

川烏米泔浸炮

石菖蒲各二錢半

右為細末另包

摠合法治用大風子三斤

新鮮者出發油黃色者不堪用去壳

以磁罐一箇盛

之少入無灰酒以皮紙竹箬重重包口勿令泄氣頻滾湯

中勿令沒罐口外以物蓋鍋口蜜封固文武火蒸候黑爛

為度杵無查滓成油分作三分每一分入第二號藥八錢

重第一號藥六錢重第三號藥一兩五錢重和勻加糯米

飯搗極膠粘如梧桐子大晒乾勿見火每服二十九粒漸加

至五六十粒雞鳴時午時臨臥時各一服茶清送下忌房



勞醎酸酒醋糟淹猪羊雞馬驢肉魚腥煎燂水菓五辛姜  
椒木料辛辣熱物蕎麥菜豈之類若不忘台斷慾則藥無  
功雖愈再發其餘肉味病愈後一年可食但猪羊雞肉終  
身用忌此法乃治癩之神方也不可輕忽

跌傷方法

丹

○治跌撲損傷用蘇木以活血黃連以降火白朮以和中童  
便煎為妙在下者可下瘀血但先須補托在上者宜飲韭  
汁或和粥吃切不可飲冷水蓋血得寒則凝但一絲血入  
心即死

骨損者用古文錢五分醋浸乳香沒藥各一錢酒研服或用  
接骨散

○元戎接骨丹

沒藥

乳香

當歸

川椒

自然銅

火煨醋淬

赤芍藥

骨碎補

酒炙

敗龜板

酥炙

虎脰骨

白芷

千金藤

即郁李仁已上各等分

冊

○九治損傷

效在補氣血俗土不知惟在速効多用自然銅

以接骨然此藥必煨煉方可服新出火者其火毒與金毒相翕挾香熱藥毒雖有接骨之功其燥散之禍甚於刀劍戒之戒之

○治金瘡急

以石灰厚傅裹之如瘡深不宜速合者加滑石末付之

○又方老杉木皮為末

付之

○九跌撲損傷腹痛者知有瘀血用桃仁承氣湯加蘇木紅花

下之



東垣

○當歸導滯湯治跌撲損傷瘀滯不行等証

大黃

當歸在土用頭在中用身在下用尾通身

右細切

等分每服一兩重酒煎服

大

雞鳴散治從高墜下及木石所壓一切損傷瘀血凝積

痛不可忍並以此藥推陳致新

大黃一兩

杏仁二十一粒去皮尖另研

右研為末酒大碗煎七分濾去粗雞鳴時服至曉必取

下瘀血即愈愚按此方用杏仁而不行氣中之血矣

河間

○沒藥乳香散治跌撲損傷痛不可忍

白朮

炒五兩

當歸焙

甘草炙

白芷

沒藥

另研各一兩半

肉桂去麋

乳香另研各一兩

右為末和勻再研極細每服二錢溫酒調下

方

○杖丹膏藥方治受杖責後如死血壅腫宜先刺出惡血然後

以此膏貼之三四日平復或早失調理成癰者貼之即散  
及治諸般癰疽瘡癤毒已潰未潰貼之無不神效

甘草

肉桂

蛇蛻

蟬蛻

露蜂房

連翹

白芷

白芨

白欬

白朮

蒼朮

人參

玄參

苦參

芍藥

南星

升麻

厚朴

梔子

百合

金銀花

天花粉

川歸

川芎

穿山甲

煨胖另研

羌活

獨活

黃連

黃芩

黃柏

大黃

生地黄

紅花

蘇木

柴胡

鱉甲酥炙

青木香

何首烏

防風

荊芥穗

藿香

雲母石

花蕊石各一兩

亂髮壯年無病者一握



乾蟾一雙即風雞 鳳凰胎一雙即虎中不轉頭雞黃也陰乾用

桃柳桑枝各五莖

右各細切用香油六斤重浸藥三五日入鍋內熬色去粗入黃丹三斤別用槐柳枝不住手撓膏成候溫入後藥末

乳香

沒藥

龍骨各一兩 輕粉

血竭一兩

射香二錢

右撓勻磁器收貯臨期看瘡大小攤貼

○沒藥散治刀箭傷止血住痛

定粉

風化石灰各一兩

枯白礬二錢

乳香五份

沒藥五份

右各研為細末同和勻再研乾摻之

論

破傷風

六十二

內經曰風者百病之始也清淨則腠理閉拒雖有大風奇毒而弗能為害也若夫破傷風証因重擊破皮肉往往視為尋常殊不知風邪乘虛而客襲之漸而變為惡候又諸瘡久不合口風邪亦能內襲或用湯淋洗或用艾焚灸其湯火之毒氣亦與破傷風邪無異其為証也皆能傳蟄經絡燒爍真氣是以寒熱間作甚則口噤目斜身軀強直如角弓反張之狀死在旦夕誠可衰憫治之之法當同傷寒處治因其有在表在裏半表半裏三者之不同故不離乎汗下和三法也是故在表汗之在裏者下之在表裏之間者宜和解之又不可過其法也問閭野人多不識此証殺人之易早不求醫治瘡而袖手待斃衰哉



脉法

表脉浮而無力太陽也

脉長有力陽明也

脉浮而弦小者少陽也

河間曰太陽宜汗陽明宜下少陽宜和鮮若能明此三法而治

不中病者未之有也

愚按河間先生論破傷風脈証詳明甚邪在於三陽之經便矣何其但云三陽而不及於三陰蓋風已危或腹滿自利口燥咽乾舌卷外綿皆無可生之証故置

論也

方法

丹溪曰破傷風同傷寒壞証治看<sup>テ</sup>在何經而用本經藥驅逐

之誤則殺久劉河間有法有方宜選而用之

河間○羌活防風湯治破傷風邪初傳在表

羌活

防風

川芎

藁本

當歸

芍藥各一錢甘草

地榆

細辛 各五分

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗熱服不拘時候量緊慢加減用之熱則加大黃一錢大便秘只加大黃五分緩緩令通

問○白朮防風湯名服前藥太過令自汗者宜服此藥

白朮一錢 防風二錢 黃芪一錢五分

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服不拘時藏府和而有自汗可用此藥破傷風藏府秘小便赤自汗不止者因服熱藥汗出不休者故知無寒也宜速下之先用小芎黃湯二三服後用大芎黃湯下之

問○小芎黃湯

川芎二錢 黃芩一錢五甘草五分

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服不拘時候三



服即止再用後藥

間河 ○大芎藭湯

川芎一錢

羌活

黃芩

大黃各一錢五

間河 ○發表雄黃散

雄黃一錢

防風二錢

草烏一錢

右為細末每服一字溫酒調下裏和至愈可服裏未和不可服

間河 ○大蜈蚣散

蜈蚣黃赤足各一條 江鯽五錢即魚膠炒

左蟠龍五錢炒烟尽為度即野鴿糞

右為細末每服一錢清酒調下治法依前用裏和至愈可服但有裏証不可服次當下之用蜈蚣散四錢已盡

霜半錢，飯丸如菡萏大，每服一丸，漸加至六七丸，清酒調，蜈蚣散少許送下，宜利為度。內外風去，可服羌活湯，緩緩而治，不拘時候服之。羌活湯者，治半在表，半在裏之藥也。

○大羌活湯

羌活

菊花

麻黃

川芎

石膏

防風

前胡

黃芩

細辛

甘草

枳殼

白茯苓

蔓荊子

各四分

薄荷

白芷

各二分

右細切，作一服，入生姜五片，水一盞半，煎至一盞，稍熱服，不拘時候，日進二服。

○防風湯治破傷風，同傷寒表証，未傳入裏，宜服此藥。

防風

下

羌活

獨活

川芎

各一錢二



右細<sub>泥</sub>作一服水一盞半煎至一盞溫服

○小蜈蚣散

蜈蚣黃赤足各一條

江漂三錢

右為細末用防風湯調下如前藥鮮裏不<sub>已</sub>竟轉入裏當服左龍丸漸漸看大便硬軟加巴豆霜服之

間河 ○左龍丸

左蟠龍<sub>煨</sub>錢白殭蚕<sub>煨</sub>錢江漂<sub>半兩</sub>雄黃一兩

右同為細末飯丸如梧桐子大每服十五丸溫酒下如裏証不<sub>已</sub>當於左龍丸末一半內入巴豆霜半錢飯丸如梧桐子大每服一丸漸加至以利為度若利後更服後藥若搐搦不<sub>已</sub>亦宜服後藥羌活湯也

間河 ○小羌活湯

羌活

獨活

防風

地榆各一錢二

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服如有熱加黃芩有痰加半夏若病日久氣血漸虛邪氣入胃全在養血為度

問河○養血當歸地黃湯

當歸

地黃

芍藥

川芎

藁本

防風

白芷

各一錢

細辛

半錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞服之

問○雄黃散治表藥

南星三錢

半夏五錢

天麻五錢

雄黃二錢半

右為細末每服一錢溫酒調下如有涎於此藥中加大

黃為下藥

問○地榆防風散治被傷風中風半在裏半在裏頭微汗身無

汗不可發汗宜以表裏治之



地榆

防風

地丁香

馬齒莧各等分

右為細末每服二錢溫米飲調下

○白朮湯治破傷風大汗不止筋攣手足搐搦

白朮

葛根 各二錢 升麻

黃芩 各三錢

芍藥 四錢

甘草 五分

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服不拘時候

○江鰮丸治破傷風驚而發搐藏府秘澁知病在裏宜以此

藥下之

江鰮剉炒

野鴿糞炒半兩 雄黃 一錢

白殭蚕半兩

蜈蚣黃赤足一封 天麻 半錢

右為細末分作三分用二分以燒飯為丸如梧桐子大

硃砂為衣用二分入巴豆霜一錢同和亦以燒飯為丸

如梧桐子大不用硃砂為衣每服以前硃砂衣丸二三

十九巴豈霜九一九第二服一九加至利為度再服  
硃砂衣九子病愈止藥

○祖傳經驗秘方治初破傷風發熱紅腫風邪將欲傳播經絡  
而未入深者屢驗

杏仁法破

羅白麩各等分

右以二味和勻用新汲水調和如膏付傷處腫消熱退

○一治破傷風發熱用蟬蛻焙炒研細酒調一錢七服效

○安文陳琢四兄因勸聞毆眉稜骨被打破得破傷風頭面大  
腫發熱予適在彼家以九味羌活湯服取汗外用杏仁搗  
爛入白麩少許新汲水調付瘡上腫消熱退而愈後以此  
法治者十人皆驗

○附翻花瘡一絡麟乾癬

川芎

天花粉各五

輕粉二錢雄黃

辰砂分半



射香五分 右為細末蒸餅丸如菰子大每服八分溫酒  
○一方無川芎 天花粉二味亦效

醫方學正傳卷之六終

杉本

