


婦人科

醫學正傳

卷之七







醫學正傳卷之七目錄

○婦人科

上經候論

固經丸

崩漏因氣所使使

帶下是濕熱為病

結痰帶下小胃丹

治帶黃荊子方

帶下必須斷厚味

一人頭風帶下方

東垣治帶主寒

調經升陽除濕湯

固真丸

丁香膠艾湯

脉法

丹溪方法九三十三條

崩漏有虛有熱

加味四物止血方

婦人病宜用當歸說

肥人帶下濕痰方

治白帶方

又治白帶方

羅先生治帶方

四物湯為婦人衆疾總司說

赤白葵花治帶說

涼血地黃湯

酒煮當歸丸

烏藥湯

助陽湯

火府丹

黃芪當歸人參湯

校本



當歸芍藥湯

升陽舉經湯

柴胡丁香湯

人參補氣湯

補經固真湯

四聖散

通經下取方

加減四物湯

香附一物丸

益母丸

祖傳通經祕方

又補傳血崩方

柴胡調經湯

當歸附子湯

延胡苦練湯

黃芪白朮湯

溫胃補血湯

溫經除溫湯

通經丸

元戎加味四物湯

艾附丸

苦練丸

又月經不通方

已試醫驗一條

附期嗣法

益胃升陽湯

調經補真湯

桂附湯

增味四物湯

立効湯

桃仁散

膠艾湯

地黃通經丸

丹溪活套

祖傳血崩方

脉法

○婦人科

胎前論



丹溪方法 凡四條

固胎飲

安胎飲

安胎丸

又丹溪方法 凡三條

懷孕嗜物說

胎動說

胎漏方

又胎漏方

又胎漏方

胎痛方

心腹諸痛方

又妊娠心腹疼痛方

心腹諸痛 凡四方

川芎散

妊娠腰痛如折方

妊娠腰脚腫痛方

胎腫方

惡阻方

半夏茯苓湯

孕婦嘔吐鑿按

參橘散

小膠艾湯

又膠艾湯

妊娠下血不止方

妊娠下血如月信來方

胎動衝心煩悶方

胎孕無故下血方

妊娠遺尿失禁方

子煩方

治子煩犀角散

治子煩竹瀝湯

治子煩當歸飲



產寶澤瀉散

張仲景方法

木通散

金生白朮散

鯉魚湯

紫蘇飲

天仙藤散

安榮散

地膚子湯

治子淋散

冬葵子散

車前散

忘憂散

葛根湯

防已湯

消風散

天門冬飲

百合散

緩息丹

八味丸

丹溪參朮飲

丹溪轉胞論

安胎散

如聖散

加味四物湯

芎根湯

桑寄生散

羚羊角散

歸涼卽命散

白扁豆散

芩蘄補中湯

當歸芍藥湯

芎朮香連丸

姪娘泄瀉方

芩蘇散

升麻六物湯

姪娘傷寒體痛方

傷寒安胎方

又姪娘傷寒方



催生散

小產下血不止方

安榮湯

又治鳴胎方

臨月養胎方

難產多是氣血虛說

金匱當歸散

如神丹

來甦散

催生奪命如神丹

黑龍丹

藥石禁

難產說

姪娘咳嗽方

小產後心腹痛方

兒在腹中叫哭方

丹溪東胎丸

催生散

難產多見於安逆說

金液丸

如聖散

霹靂奪命丹

芳歸湯

胞衣不下方

飲食禁忌篇

難產法

姪娘嗽紅痰方

丹溪達生散

紅莧馬齒墮胎說

催生鉛丹

香桂散

無憂散

奪命丹

枳殼散

臨產須知像十九

橫倒產法



又治橫生方

又橫逆不順方

礙產說

兒身向未順說

治盤腸產法

子死腹中方

下死胎牛膝丸

子死腹中不出方

又治子死腹中方

生子下血過多方

胞衣不下方

丹溪活套

祖傳經驗秘方

又祖傳催生驗方

祖傳治胞衣不下三退散

○婦人科

產後論

脉法

丹溪方法凡一十條

嚴氏清菟散

愈風湯

新產不可用芍藥

產後乳汁不通方

產後泄瀉痢方

乳母小水短少說

產婦損破尿脬

黑神散

人參當歸散

當歸黃芪湯

失笑散

三聖散

抵聖散

當歸羊肉湯

茯苓散

當歸散

黃芪湯

增損四物湯



四物一黃散

調經散

琥珀散

調中湯

羊肉湯

熟乾地黃丸

旋覆花湯

猪腎子飲

桃仁膏

漏芦湯

丹溪活套

產室黑龍丹

正脾散

交感地黃煎丸

定痛散

滋腸五仁丸

拒勝湯

四神散

當歸黃芪飲

硫黃湯

鍾乳散

烏金散

栢子仁散

七珍散

麻仁丸

固經丸

八味理中丸


當歸養血丸

當歸散

乳汁不通方

母猪蹄湯







新編醫學正傳卷之七

花溪恒德老人虞 搏天民編集

姪孫虞守愚惟明校正

金陵三山街書坊松亭吳江繡梓

婦人科上月經

論內經曰二陽之病發心脾有不得隱曲女子不月其傳爲風消爲息奔者死不治難經曰心出血肝納血肺出氣腎納氣蓋婦人百病皆自心生如五志之火一起則心火亦從而熾若夫經閉不通之証先因心事不足由是心血虧耗故乏血以歸肝而出納之用已竭經曰母能令子虛是以脾不磨而食亦少所謂二陽之病發心脾者此也陽明者因食少故肺金亦失所養而氣滯不行則無以滋腎陰況月經全藉腎水施化腎水既乏則經血日以乾涸以致或先或后淋瀝無時



若不早治漸而至於閉塞不通甚則爲癥瘕血膈勞極之証  
不易治也又如崩漏不止之証先因心火亢甚於其血脈不  
溢以致肝實而不納血出納之道遂廢經曰子能令母實是  
以肝腎之相火挾心火之勢亦從而相扇所以月水錯經妄  
行無時而泛溢也若不早治漸而至於崩中不止甚則化爲  
白濁白淫血枯發熱勞極之証不可治矣經曰邪氣盛則實  
正氣奪則虛所謂心血不足者正氣奪也心火亢甚者邪氣  
盛也邪氣者相火也丹溪曰天非以火不能生物人非以火不能育  
生但貴乎適中凡動必聽命乎心君則無已上諸証大抵經  
閉不行與夫經漏不止其初皆由心事不足以致月經不調  
早不調治直至危篤求醫雖妙手莫能爲矣東垣經閉不行  
有三論崩漏不止亦有三論學者宜參究其論以治之不可  
拘泥也



脉法

○脉經曰寸口脉微而瀯微則衛氣不足瀯則榮氣無餘衛不足其息短其形躁血不足其形逆榮衛俱虛言吾謬誤跌陽脉微而瀯則胃氣虛虛則短氣咽燥而口苦胃氣瀯則失液少陰脉微而遲微則無精遲則陰中寒瀯則血不來以爲居經三月一來

○脉微血氣俱虛年少者亡血也乳子下利爲可不者以爲居經三月一來

○脉微弱而溢年少得與爲無子中年得與爲絕產

○寸口脉沉而遲沉則爲水遲則爲寒寒水相搏跌陽脉伏水穀不化脾氣衰則驚漉胃氣衰則身體腫少陽脉卑少陰脉細男子則小便不利婦人則經水不通經爲血不利則爲水名曰水分



○寸口脉沉而數數則爲出沉則爲入出則爲陽實入則爲陰結跌陽脉微而弦微則無胃氣弦則不得息少陰脉沉而滑沉則爲在裏滑則爲實沉滑相搏血結胞門其藏不瀉經絡不通名曰血分○經水前斷後病水名曰血分以病難治先病水後經斷名曰水分以病易治

○婦人帶下六極之病脉浮則爲腸鳴腹滿緊則爲腹中痛數則爲陰中痒痛則生瘡弦則陰戶掣痛

○婦人帶下脉浮惡寒漏下者不治

○婦人寸口脉浮而弱浮則爲虛弱則爲血浮則短氣弱則有熱而自汗出

○趺陽脉浮而瀼瀼則氣滿瀼則有寒喜噫吞酸其氣時下小腹則寒

○少陰脉滑而數者陰中生瘡



○少陰脉數則氣淋陰中生瘡

○少陰脉弦者白腸必挺核

○少陰脉浮而動浮則為虛動則為痛婦人則脫下

○婦人漏血下赤白日下血數升脉急疾者死遲者生

○婦人漏下赤白不止脉小虛滑者生大緊實數者死

○婦人疝瘕積聚脉弦急者生虛弱小者死

○少陰脉浮而緊緊則疝瘕腹中痛半產而墮傷浮則亡血惡

寒絕產

○肥人脉細胞中有寒故令少子其色黃者胸上有寒

○婦人月經一月再來者經來其脉欲自如常而反微不利不

汗出者其經二月必來

方法丹溪方法凡

丹溪曰經候有枯閉不通者有不及期與過期者有妄行者



有色紫黑及淡者有或塊者有作疼者夫經不通或因墮胎  
及多產傷血或因久患潮熱銷血或因久發盜汗耗血或因  
脾胃不和飲食少進而不生血或因痢疾失血治宜生血補  
血除熱調胃之劑隨証用之或因七情傷心心氣傳結故血  
閉而不行宜調心氣通心經使血生而經自行矣

○虛中有熱月事不來以

四物湯加黃芩治之

○常過期者血少也以

芎歸參朮熟地藥治之

○過期紫黑有塊作痛血熱也以

四物湯加香附黃連

○過期色淡挾痰者以

二陳湯加芎歸



○常不及期者血熱也以

四物湯加黃芩黃蓮香附肥人多兼痰藥治之

○血枯經閉者以

四物湯加紅花桃仁

○痰多佔住血海地位因而下多者目必漸昏肥人多有之以  
南星蒼朮川芎香附作丸服之

○肥人軀脂滿經閉者以

痰致一木作膈

導痰湯如芎歸黃蓮不可服地黃泥痰故也如用必以姜  
汁炒肥人少子亦由痰多脂膜閉塞子宮不能受精而施  
化也宜服上藥

○瘦人子宮無血精氣不聚亦含無子以

四物湯養血養陰等藥

○經水未行臨經將來作逆者血實也一曰瘀血鬱滯也以



四物湯加桃仁香附黃連紅花或加玄胡索義木木香有熱加柴胡黃芩

○經水行後而作疼者血俱虛也以

八物湯加減煎服

○夫血為氣之配因氣而行成塊者氣之凝將行而痛者氣之滯行後作痛者氣血虛也色淡者亦虛也而有水以混之也錯經妄行者氣之亂也紫者氣之熱黑則熱之甚也令人悉指為風冷而行溫熱之劑禍不旋踵

○調經散治經水或前或後或多或少或踰月不至或一月兩來皆可服

川歸酒洗一錢半  
麥門冬二錢  
去心吳茱萸擇去閉目者姜湯泡七次焙乾半錢  
人參一錢  
半夏湯炮一錢  
白芍藥一錢  
川芎一錢  
牡丹皮一錢  
肉桂五分  
阿膠珠  
甘草各七分半



右細切作一服水二盞加生薑三片煎至一盞空心稍熱服

○月經過期不行宜服

當歸<sup>半一錢</sup> 川芎<sup>五分</sup> 熟地黃<sup>一錢</sup> 白芍藥<sup>一錢</sup>

赤仁<sup>去皮二十箇</sup> 紅花<sup>三分</sup> 香附米<sup>一錢</sup> 熟桂<sup>五分</sup>

蓬莪朮<sup>一錢</sup> 甘草<sup>五分</sup> 蘇木<sup>一錢</sup> 木通<sup>八分</sup>

右細切作一服水一盞半煎至一盞空心溫服

○月經先期而來宜服

歸身<sup>一錢半</sup> 川芎<sup>半錢</sup> 白芍藥<sup>八分</sup> 生地黃<sup>一錢</sup>

阿膠珠<sup>半錢</sup> 艾葉<sup>半錢</sup> 條芩<sup>一錢</sup> 甘草<sup>半錢</sup>

香附<sup>一錢</sup> 黃柏<sup>半錢</sup> 知母<sup>半錢</sup> 黃連<sup>姜汁焙炒</sup>

右細切作一服水煎空心服

○經不通用馬鞭草煎汁熬膏為丸或燒存性為丸紅花當歸



煎湯送下

○固經丸治經水過多不止

黃芩

龜板

白芍藥 略一

椿根白皮 七

黃柏 錢三

香附 童便浸一宿 錢半

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服七十九白湯下

○崩漏有虛有熱虛則下瀉熱則流通急則治其標用白芷湯調下百草霜服或棕櫚灰或狗頭骨燒存性或伍靈脂米生半炒俱以酒調服後以四物湯加乾姜調補之緩則治其本四物湯加芩蓮參芪香附乾薑之類

○四物湯加荊芥穗條芩止血神效

○崩漏多因氣所使而下香附末一錢炒黑歸身一錢白芍藥一錢酒炒熟地黃一錢川芎黃芪蒲黃地榆人參各半錢白朮一錢升麻三分煎服甚者加棕櫚灰為末酒調服



○婦人血病宜用當歸若肥白人與人參黃芪同用瘦黑人宜與生地黃香附同用

○帶下是溫熱爲病白屬氣赤屬血以二陳湯加蒼朮治溫爲主氣虛入參朮血虛入芩歸

○帶下是胃中痰積流下滲入膀胱當升之無人知以二陳湯加蒼朮升麻柴胡甚者上用吐法以提其氣下用二陳加二朮仍用瓦壘子以燥其濕痰

○肥人帶下多是濕痰用海石半夏南星黃柏蒼朮川芎香附檉皮冬加乾薑瘦人少有不病有者是熱以滑石檉皮川芎海石青黛丸服

○結痰帶下以小胃丹津液嚥下數丸候積下後以補藥調治一方治白帶

檉白皮

山茱萸

苦參

香附各五錢



龜板酥炙

枳子名二兩黃栢一兩乾姜

貝母各二錢半白芍藥七錢半

右為細末酒糊為丸服

○又方

白芷四兩以石灰半片淹三宿漉去灰以白芷炒焦為末清米飲調空心服之

○又方以黃荊子一味炒焦為末米飲調服上可治心痛下可

治白帶以其能燥溫痰也

○羅先生治帶用七棗湯神祐丸玉燭散此法實者可用虛者

不可峻攻

○帶下必須斷厚味凡用藥寒月少加姜附臨機應變用之

○一人上有頭風鼻涕下有白帶用南星蒼朮黃芩辛夷川芎

黃栢炒焦滑石半夏牡蠣粉丸服

肥溪法皆○四物湯乃婦人衆疾之總司也



當歸

川芎

白芍藥

熟地黃

右細切等分水煎服

○東垣治崩漏帶下多主於寒學者宜再思之不可一途而論經曰陰虛陽搏謂之崩觀此可知

○東垣曰蔡花白者治白帶赤者治赤帶用之果驗

○東垣調經升陽除濕湯治女子漏下惡血月事不調或暴崩

不止多下水漿之物皆因飲酒不節勞倦所傷或素有

心火乘脾必怠惰嗜臥困倦乏力氣短氣急

脾主滋榮周身者也脾胃虛而心胞乘之故漏下月水不

調也況脾胃為血氣陰陽之根蒂也當除濕去熱抑風氣

上伸以勝其濕又云火鬱則發之

當歸酒洗

獨活各五

蔓荊子七分

防風

炙甘草

升麻

藁本各一錢

柴胡



羌活

蒼朮

黃芪 各一錢半

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗空心溫服少時以  
早飯壓之可下服而已○如灸足太陰脾經中血海穴三  
七壯亦已○此藥乃從權之法因風勝濕為胃氣下陷而  
氣迫於下以救其血之暴崩也住後必須服黃芪人參炙  
甘草當歸之類數服以補之於補氣升陽湯中加和血藥  
便是也若遇夏月白帶下脫漏不止宜用此湯一服立止  
○涼血地黃湯治婦人血崩是腎水陰虛不能鎮守胞絡相火  
故血走而崩也

黃芩

荊芥穗

蔓荊子 各一

黃柏

知母

藁本

細辛

川芎 各二

黃連

羌活

柴胡

升麻

防風 各三分 生地黃

當歸 各五分

甘草 一



紅花 少許

右細切作一服水三大盞煎至一盞去粗空心稍熱服

陳酒煮當歸丸治癰疽白帶下症脚氣腰以下如在水雪中居

火炕以厚衣重蓋猶寒肌肉消瘦小便與白帶長流而不

禁固面白目青目眵無所見身重如山行步欹側腿膝

枯細大便閉澁心下痞悶懊懣食不下面垢背寒以上中

下三陽俱虛脉沉緊而澁按之空虛洪而無力尤為中寒

之証乃氣血俱虛之極也

茴香 五錢 黑附子 炒 良薑 各七錢 當歸 一兩

右四味細切以好酒一升半煮至酒盡焙乾

炙甘草 苦練 生用 丁香 各半錢 木香

升麻 各一錢 柴胡 二錢 炒黃蘗 金竭 各三錢

玄胡索 四錢



右與前四味同研為細末酒煮麵糊為丸如梧桐子大每服五七十丸空心淡醋湯送下忌油膩冷物及酒濕麪等○固真丸治白帶久下不止臍腹冷痛陰中亦痛目中溜火視物昏花齒惡熱飲但喜乾食此皆寒濕乘於胞內肝經陰火上溢故目中溜火其惡熱飲者陽明經中伏火也法當大瀉寒濕以此丸治之

黃柏酒洗

白芍藥各五分

柴胡

白石脂

各一錢研為末

白龍骨

酒煮水飛日乾為末

當歸

酒洗各一錢

乾姜四錢

右除龍骨石脂水飛日乾另研外餘共為細末麵糊為丸如雞頭仁大日乾空心白湯下少時以早飯壓之是不令熱藥犯胃也忌生冷硬物酒濕麪

陳

○烏藥湯治婦人血海疼痛

當歸一錢

甘草

水香各五

烏藥一錢半



香附子二錢

右細切作一服水二盞煎至一盞食前溫服

東○助陽湯治白帶下陰戶中痛空心面急痛身黃皮緩身重

如山陰寒如水

生黃芩

橘紅各五分

防風

高良姜

乾姜

郁李仁

甘草各一錢

柴胡一錢二分

白葵花三分

右細切分作二服每服水二盞煎至一盞去粗食前稍熱服

東丁香膠艾湯治崩漏不止蓋心氣不足勞役及飲食不節所

得其脉兩尺俱弦緊洪按之無力白覺臍下如冰冷白帶

及白滑之物多問有如屋漏水下時或有鮮血右尺脉時

或浮洪



熟地黃

白芍藥各三分

川芎

丁香各四分

阿膠珠

六分

生艾葉一錢

當歸二錢

右以川芎地黃丁香另為細末其當歸芍藥艾葉各細切連前共六味入水五大盞煎至三盞半去粗入阿膠再上火煎至一大盞稍執空心服

○水府丹治婦人久虛積冷經候不行癥瘕痞塊腹中暴痛面

有黥黯黎黑羸瘦スル

硃砂

紙隔沸湯  
淋熱取

紅豆

已上各五錢

桂心

另為末

木香

乾姜各一兩

砂仁

二兩

花蕊石

煨研一兩半

斑蝥

一百箇  
去頭足

生地黄汁

童子尿

各一升

臘月狗膽

七枚

元精

三百箇去頭足糯米同炒黃色去米

右九味為細末同三汁熬為膏和丸如鷄頭實大硃砂為衣每服一九食前細嚼溫酒送下米飲亦可



東垣

○黃芪當歸人參湯治婦人經水暴崩不止先因損身失血  
自後一次縮一十日而來其後暴崩不止蓋因其人心窄  
性急多驚而心氣不足及飲食不節得之診得掌中寒脉  
沉細而緩帶數九竅不利四肢無力上喘氣促口鼻氣不  
調脾胃虛弱胃脘當心而痛左脇縮急當臍有動氣腹鳴  
下氣太便難宜先治其本餘証可丟安心定志和脾胃益  
元氣補血養神以大熱劑去其寒少加生地黄去命門相  
火不令四肢痿弱

黃連二分

生地黄三分

炒神麴

橘紅

桂枝各五分

草薢各六分

黃芪

人參

麻黃

各一錢去節當歸身一錢

杏仁

五枚另研如泥

右細切作一服水二盞半先煎麻黃令沸掠去沫煎至二  
盞下諸藥同煎至一盞食前服立止又以草薢薢九五十



疎

九以止胃脘客寒之痛再與肝積之藥除其病根

○當歸芍藥湯治婦人經水漏下不止其色鮮紅時值炎月先因勞役脾胃虛弱氣短氣逆自汗不止身熱悶亂不思飲食四肢困倦太便秘時泄後復因心氣不足經水暴下不正微覺氣下行氣逆氣短懶於語言以藥主之

柴胡二分

炙甘草

生地黃各三分

黃芪一升

陳皮去白

熟地黃各五分蒼朮米泔浸

白朮

川歸

白芍藥各一錢半

右細切作一服水二盞煎至一盞空心溫服

東垣

○柴胡調經湯治經水不止其色鮮紅頭筋急腦痛脊骨強

痛不安

炙甘草

當歸身

葛根各三分

獨活

藁本

升麻各五分

柴胡七分

羌活



蒼木錢各一

紅花少許

東垣

○益胃升陽湯治婦人經候凝結黑血成塊左癰有血瘕水

泄不止食有時不化後血塊暴下并水泄俱作是前後二  
陰有形血脫竭於下既久經候猶不調水泄日三四行食  
罷煩心飲食減少人形瘦弱血脫益氣古聖人之法也先  
補胃氣以助生發之氣故曰陽生陰長諸甘藥為之先務  
蓋其能生血陽生陰長之理也人身以穀氣為室故先理  
胃氣為要

柴胡

升麻各五分

炙甘草

當歸身酒洗

陳皮錢一

人參有嗽不用

炒神麴各錢二分 黃芪一錢半

白朮二錢

生黃芩二分

右細切作一服水二大盞煎至一盞去粗熱服○如腹中



東垣

痛加白芍藥三分中桂少許○如渴或口乾加葛根三分不拘時服

○升陽舉經湯治經水不止右尺脉按之空虛是氣血俱脫大寒之証輕弄其脉數疾舉指弦緊或澁皆陽脫之証陰火亦亡見熱証於口鼻眼或渴此皆陰燥陽欲先去也當溫之舉之升之浮之燥之以法乃大升浮血氣補命門之下脫

肉桂不用

白芍藥各二

紅花半分

細辛三分

人參

熟地黄

川芎各半分

獨活根

黑附子炮

炙甘草各七分半

羌活

藁本

防風各一錢

白木

當歸

黃芪

柴胡各二分

桃仁泥少許

右細切分作三服每服用水二盞煎至一盞空心熱服



垣東

○當歸附子湯治臍下冷痛赤白帶下

當歸

四分

炒鹽

三分

蠟和

升麻

各五分

甘草

多六分

柴胡

七分

黃柏

少許

附子

炮一不

乾姜

炮

良姜

各八分

右細切作

一服水三盞煎至一盞去粗稍熱服或為細末

酒麪糊為丸亦可

垣東

○調經補真湯冬後一月微有地泥水泮其白帶下陰乃中

寒一服立止

獨活

乾姜

炮

藁本

防風

蒼朮

各二分

麻黃

不去節

炙甘草

人參

去芦

當歸身

白朮

生黃芩

升麻

各五分

黃芪

七分

良姜

澤瀉

羌活

各一錢

柴胡

四分

杏仁

二枚

桂枝

少許

白葵花

七朵



垣東

右細切作一服除黃芩麻黃另外先以水三大盞煎麻黃一味令沸掠去沫入餘藥同煎至二盞再入生黃芩煎至一盞空心服之候一時許可食早飯

○柴胡丁香湯治婦人年三十歲左右臨經先腰臍痛甚則腹中亦痛經縮三二日

生地黄 五分

丁香 四分

當歸身

防風

羌活 各一錢

柴胡 二錢

全蝎 一枚

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗食前稍熱服之

垣東

○延胡苦練湯治臍下冷撮痛陰冷大寒白帶下

黃栢 一分

延胡索

苦練子 各二分

附子 炮

肉桂 各三分

炙甘草 五分

熟地黄 一錢

右細切作一服水二盞煎至一盞食前溫服

垣東

○桂附湯治白帶腥臭多悲不樂太寒証



黃栢為引用知母各五分肉桂五分

附子炮三糸

右細切作一服水二盞煎至一盞空心溫服○如少食常飽腹中滿悶加白芍藥五分○如不思飲食加五味子二十箇○如煩惱面上如虫行乃胃中元氣極虛加黃芪一錢半人參七分炙甘草升麻各五分

東垣○人參補氣湯治四肢懶倦自汗無力

丁香末二分生甘草各三分炙甘草各三分生地黃

白芍藥各五分黃栢七分熟地黃六分人參去芦

防風去芦羌活知母當歸身

升麻各七分柴胡一錢黃芪一錢半全蝎一箇

五味子二十箇

右細切作一服水二大盞煎至一盞空心粉熱服

東垣○黃芪白朮湯治婦人四肢沉重自汗上至頭頸惡風頭痛



燥熱上

細辛二分

吳茱萸

川芎各三分

柴胡

升麻各四分

當歸六分

黃柏酒炒

炙甘草

羌活各八分

五味子一錢

白朮

人參各一錢半

黃芪二錢半

右細切作一服水二大盞生薑五片煎至一盞去粗食前

稍熱服

東垣

○增味四物湯治婦人血積血瘕

當歸

川芎

白芍藥

熟地黄

京三稜

乾漆炒烟尽

肉桂去皮

廣茂

各等分

右細切每服五錢水二大盞煎至一盞去粗空心溫服

東垣

○補經固真湯治婦人白帶下流不止其心胞尺脉微細蓋

始病血崩久則血少復亡其陽故白滑之物下流不止所



謂崩中日久為白帶也乃本經血海枯竭津液復亡不能  
滋養筋骨以本部行經藥為引用以大辛甘油膩之藥潤  
其枯而滋津液以大辛熱之藥補其陽道生其血脉以苦  
寒之藥泄其肺而救上熱傷氣以人參補之以微苦溫之  
藥為佐而益元氣

白葵花

研爛四分

陳皮

五分去白

生黃芩

細研另入

郁李仁

去皮炙研如泥

炙甘草

柴胡

各一錢

乾姜

細末

人參

二錢

右細切除黃芩外以水三盞煎至一盞半入黃芩同煎至  
一盞去粗空心熱服少時以早飯壓之

○溫胃補血湯治婦人耳鳴鼻不聞香臭口不知穀味胃氣不  
快四肢困倦行步欹側髮脫落食不下膝冷陰汗帶下喉  
中吟吟不得卧口燥咽乾太息頭不可以回顧項筋緊急  
脊骨強痛頭旋眼黑頭痛噴嚏



生地黄

白朮

藿香

黃柏 各二分

牡丹皮

蒼朮

王瓜根

陳皮

吳茱萸

各三分 當歸身 四分

柴胡

人參

炙甘草

地骨皮 各五分 升麻

生甘草 各六分

黃芪 一錢

丁香 一箇

桃仁 參箇

白葵花

右細切作二服水二大盞煎至一盞食前熱服

○立効散治婦人血崩不止

當歸

蓮花心

白綿子

紅花

茅花

各一兩

右判如豆大白帛包裹泥固火煨存性為細末每服三錢

○如乾血氣研血竭為引溫酒調服或加輕粉五分如血

崩甚不止加射香為引溫酒調服

○四聖散治婦人赤白帶下



川烏炮

生白礬

各一錢

紅娘子三箇

班猫

十箇

右為細末煉蜜為丸如皂子大綿裹塞陰戶中

○溫經除濕湯治婦人值冬月四肢無力乃痿厥濕熱在下焦也。顛心者是濁氣不下降欲為中滿也。合眼麻木作者陽道不行也。惡風寒者上焦之分皮膚中氣不行也。開目不寐者陽道少行而陰寒之氣暫退也。頭旋目眩者風氣下陷於血分不得神越而作也。近火則有之。

黃連二分

柴胡

草豆蔻

神麴炒

木香各三分

麻黃根去

當歸身

獨活

黃柏

升麻

羌活各五分

炙甘草

人參

白朮

猪苓

澤瀉各七分

黃芪

陳皮

蒼朮各一錢

白芍藥一錢半

右細切作一服水二大盞煎至一盞食遠服治肢節疼痛



無乃之勝藥也

產室

○朮仁散治婦人月水不調或淋瀝不斷後復來狀如瀉水虛弱不進飲食腹中堅痛不可行動月水或前或後或經月不來身沉重惟欲眠卧多思酸物

朮仁

去皮尖研

半夏各三分

赤芍

生地黄

錢各一

川牛膝

當歸

桂心

牡丹皮

人參

蒲黃

川芎

各七分

產室

○通經下取方曾試驗神効

右細切作一服加生薑三片水二盞煎至一盞空心溫服

海蛤粉

五錢

牙皂

各二錢半

巴豆

畧去油

天花粉

苦丁香

紅娘子

錢半

射香

右為細末每用一錢葱涎同搗為丸薄綿裹以五寸竹管



室產

○通經丸治婦人室女月經不通或成血瘕疼痛

納陰戶中候熱時先通黃水次則經行

桂心

青皮

大黃

酒濕帝

川椒

莪朮

乾姜

川烏

炮去皮

乾漆

碎炒烟盡

當歸

桃仁

去皮尖炒研如泥各等分

右為細末將四分之一以米醋熬成膏和餘藥末成劑白

中杵勻丸如梧桐子大每服二十九空心淡醋湯下漸加

主三四十丸溫酒亦可下性畏寒者入雞子清和藥內

方良

○膠艾湯治勞傷氣血衝任虛損月水過多淋瀝不止

阿膠

炒成珠

川芎

甘草

炙各五分

當歸

艾葉

各七分半

熟地黄

白芍

各一錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服○一方加地榆

黃芪

見胎前門



良方

○加減四物湯治經候微少漸至不通手足煩疼形瘦潮熱  
脉息微數方

本方去地黄川芎加澤蘭葉二倍甘草半分如經候過多  
本方去熟地黄加生地黄如經行身熱脉數頭昏本方加  
柴胡黃芩如經行微少或脹或痛四肢疼痛本方加延胡  
索沒藥白芷共為末以淡醋湯調下如經候不調心腹疼  
痛只用芎歸二味煎服名君臣散以歸倍於芎也

○元戎加味四物湯因氣衝經脉故月事頻併臍下多痛本方  
加白芍藥○如經欲行臍腹疼痛本方加玄胡苦練栝即  
木香○如經水過多本方加黃芩白朮○如經水溢少本  
方加葵花紅花○如經水適來適斷或往來寒熱宜先服  
小柴胡湯以去寒熱然後以四物湯和之或以二方併服  
名柴胡四物湯



產

○香附一物九治經候不調血氣刺痛腹脇彭脹頭眩惡心

崩漏帶下並宜治之

香附子

并去皮毛不拘多少米醋浸一日夜用瓦鍋煮令熟焙乾

右為細末醋糊為丸如梧桐子大日乾每服五十丸淡醋

湯下

產

○艾附九治証如前

香附子

醋煮一片

艾葉

四兩

當歸 二兩

右為細末醋糊為丸服

產

○地黃通經九治婦人經候不行結成血瘕在臍下如覆鉢

熟地黃 三兩

苗虫去頭

水蛭 炒糯米同

桃仁

各五箇

右為細末煉密為丸如梧桐子大每服五十丸空心溫酒

下米知加至七八十丸

方

○益母九治婦人赤白帶惡露時下不止及治婦人胎前產



後及經中諸般奇病無所不療

益母草

一名荒蔚子紫花方壺俗名野天麻五月採陰乾磨為細末勿犯鐵器煉蜜為丸如彈子大每服一

丸用熱酒加重便化下蒸氣者木香湯化下或只以未子每服二錢或酒或童便調下此婦人之聖藥也

○苦練丸治赤白帶下最妙

苦練碎酒

茴香炒

當歸各等分

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服五十丸空心溫酒

送下

丹溪活套曰

凡婦人經候不調皆當以四物湯為主治○如經候過而腹中作痛綿綿無休息者屬血虛本方倍當歸熟地黃蒸氣虛者本方加入參黃芪按寒者加乾姜○如經候將來腹中陣陣痛作乍止者血氣實也本方用生地黃加黃連香附苑仁紅花玄胡索牡丹皮之類○如經水常不及期而行者血



熱也。本方用生地黄加黃連黃芩白芷之類。○如經水常過期而來者，瘦人多，應是血少。本方倍當歸熟地黄加黃芪甘草少佐，以紅花桃仁泥以為生血之引用也。○肥人，木槩是氣虛挾痰阻滯，升降然也。本方去地黄加參芪甘草茯苓半夏陳皮香附等藥。○常過期而紫黑成塊者，血熱也多作腹痛。本方用生地黄加香附黃連玄胡索五靈脂乳香沒藥之類。○過期而血淡色者，痰多血少也。本方用生地黄合二陳湯煎服。○肥盛婦人或三二箇月一行者，痰盛而軀脂閉塞經脉，以導痰湯加芎歸香附蒼白朮之類。○如經水適來適斷，往來寒熱如瘧者，本方合小柴胡煎服。○如經行過三五日腹中綿綿起痛者，以血行而滯氣未盡行也。本方加木香枳櫛煎服，立愈。

○祖傳經驗秘方治婦人室女月經不通漸成脹滿及治男子



墜馬跌撲損傷以致瘀血停積欲成血蠱病者悉皆治之名

曰飛奴飲子

飛奴飛奴樹上，藥飛乾枝不  
落者冬月及正月拔假犀糞即犀糞也  
兩頭尖者是

玄胡索

肉桂

香附米

五靈脂各貼

砂仁

飛仁

去皮尖  
另研

右各等分為細末每服三錢空心溫酒調下

○一方治月經不通只以犀糞一合炒研細溫酒調下立效

○又方治婦人血崩不止用蒼耳草燒存性好酒調服立止或

調入四物湯中亦効

○一老婦人年五十三血崩久不止諸藥不効予以橡斗蒼耳

草根二物燒存性用四物湯加白芷茅花乾姜煎湯調服

其經血自止而不再行矣



論

婦人科 中胎前

內經曰陰搏陽別謂之有子中謂陰脈搏手其是為血氣和平陽施而陰化也蓋為入之夫婦猶天地然天地之道陰陽和而後萬物育夫婦之道陰陽和而後男女生是故欲求嗣者先須調其婦之經脈經脈既調則氣血和平氣血和平則百病不生而樂乎有子矣脈經曰診其手少陰之脈動甚者妊子也蓋手少陰心脈也心主血脈故也又腎為胞門子戶中腎脈按之不絕當妊子也又曰婦人妊娠一月之時足厥陰脈養之二月足少陽脈養之三月手少陰脈養之四月手少陽脈養之五月足太陰脈養之六月足陽明脈養之七月手太陰脈養之八月手陽明脈養之九月足少陰脈養之十月足太陽脈養之是以諸經脈各養二十日也若夫至期當



養之經虛實不調則胎孕為之不安甚則下血而墮矣夫手足十二經氣血盈虧不同如手足厥陰太陽少氣多血手足太陰少陰少血多氣手足少陽氣多血少手足陽明氣盛血多安胎之法宜各按月依經視其氣血虛實而調之固無胎墮之患其或感冒風寒別生異証又宜各按法而調治之機要曰治胎產之病當從厥陰經論之母犯胃氣及上一焦謂之三禁不可汗不可下不可利小便若發汗者如傷寒下早之証利大便秘者則脈數已動于脾利小便者則內亡津液胃中枯燥制方之法能不犯三禁則榮衛自和而寒熱止矣皆醫者之繩墨也其為妊娠之婦早當絕去嗜慾安養胎元性宜靜而少宜躁體宜動而少宜勞宜涼而少宜熱衣宜溫而少宜寒母久立母久坐母久行母久臥又宜却去一切肥甘煎燂油膩辛辣醎酸水菓魚鱉狐兔鴿雀之類即無胎漏



胎痛胎動下血子腫子癰等証及橫產逆生胎死腹中之患  
矣丹溪曰難產之婦皆是八九箇月內不能謹慾以致氣血  
虛故也傳曰古者婦人妊子寢不側坐不偏立不蹕不食和  
味割不正不食席不正不坐目不視邪色耳不聽淫聲口不  
出傲言夜則令瞽誦詩道正事則生子形容端正才過人矣  
古所謂胎教也妊娠之婦可不慎歟

△附期嗣論

夫人欲求嗣必先視其婦之經脉調否其或未調必以藥而  
調之經脉既調宜以人事副之按其法而行之庶不失其候  
也訣云三十時中兩日半二十八九君須弄落紅滿地是佳  
期金水過時空霍亂之時枉費工樹頭樹底覓殘紅但  
解開花能結子何愁丹桂不成叢叢蓋婦人月經方絕金水  
絕生時子宮正開乃受精結胎之候妙合天和之時過與



佳期則子宮閉而不受胎矣然男女之分各有要妙存焉如月俟方絕一日三日五日交會者成男二日四日六日交會者成女過與則不孕矣又曰陰血先至陽精後衝縱氣來乘血開裏精陰外陽內則成坎卦之象而為男若陽精先入陰血後參橫氣來助精開裏血陰內陽外則成離卦之象而為女若胎成三月之內男女未分之時亦有轉女為男之術其法以鉄斧一柄置於妊婦床席之下勿令人見知更佩雄黃一二兩於孕婦身左或佩萱花亦可已上三法皆驗不可輕忽傳曰不孝有三無後為大古詩云無官一身輕有子萬事足誠哉是言也無嗣者宜深思之無怠

### 脉法

脉經曰婦人三部脉浮沉正等按之無絕者妊娠也○妊娠初時寸微小呼吸五至至三月而尺數也○脉滑疾重以



手按之散者胎已三月也脉重手按之不散但疾不滑者五月也○妊娠四月脉左疾為男右疾為女俱疾為生二子○又法得太陰脉為男得太陽脉為女○又法左手沉實為男右手浮大為女左右手俱沉實為男左右手俱浮大為女○又法尺脉左偏大為男右偏大為女左右手俱大生二男○又法左右尺俱浮沉當作為生二男不爾則女作男生左右尺俱沉當作為產二女不爾則男作女生也此男女無形之說也  
○婦人懷孕脉離經而浮設腹痛引腰脊為欲生也○又法婦人欲生其脉離經半夜覺日中即生也○懷妊六七月脉實大牢強弦緊者生沉細者死○懷妊至六七月暴下斗餘水其胎必倚而墮此非時孤漿預下故也○寸口脉洪而滑洪則為氣滑則為血氣動丹田其形則溫滑在



於下胎冷者永陽氣胎活陰氣必終洪則為氣者生飲別  
陰陽其下必覆假令陽經蓄血若杯陰為死胎問婦人雙  
胎其一獨死其一獨生醫為下其死者其病則愈然後竟  
免軀其脉何以別之師曰寸口脉衛氣平調榮氣緩舒陽  
施陰化精盛有餘陰陽俱盛故知雙軀今少陰微緊血則  
濁凝經養不固胎則偏大小腹冷滿膝膈疼痛腰重起難  
以為血理若不早去害母失胎○婦人經自斷而有軀其  
脉反弦恐其後后必大下不成胎也大下謂大下血也

方法

丹溪方法  
凡四條

丹溪曰婦人無子者多由血少不能攝精俗醫悉謂子宮虛  
冷投以辛熱之藥煎熬臟府血氣沸騰禍不旋踵或服艾者  
不知艾性至熱入火炙則下行入藥服則上行多服則致毒

各將誰挽執一



○瘦怯婦人子宮乾澁宜滋陰養血四物加香附黃芩之類肥盛者乃軀脂滿溢閉塞子宮宜行溫燥痰南星半夏川芎滑石防風羌活無一本有蒼朮或導痰湯之類

○墮胎乃血氣虛損不能榮養胎元而自墮耳猶枝枯則果落榦萎則花墜也又因恚怒傷情內火便動亦能墮胎猶風撼其木入折其枝也火能鎔物造化自然病源乃謂風冷傷於子臟未得病情者也大抵屬虛屬熱二者又當視其輕重而治之

○一婦有胎即墮其脉左大無乃重取則滿乃血少也以其少年只補中氣使血自榮濃煎白朮湯調黃芩末一錢服之至三四兩得保全而生

○固胎飲

熟地黃

歸身尾

人參

白芍藥



白朮

川芎

陳皮

甘草

桑樹上羊兒藤七葉圓者

愚恐當作如檢桑葉圓者即俗名桑絡也真桑寄生尤妙

少加黃連黃柏入糯米五十七粒煎服血虛不安者加阿

膠珠胎氣痛者加宿砂

○安胎飲孕成之後覺胎氣不安或腹微痛或腰間作疼或飲

食不美宜服或至五六箇月常服數貼甚好

白朮

當歸

白芍藥

熟地黃各一錢

人參

川芎

條黃芩

陳皮各五分

甘草

砂仁

紫蘇各三分

右細切作二服水加生薑三片水煎服

○安胎丸

白朮

條芩

神麴炒各等分

右為細末粥丸每服五十九丸清米湯下蓋白朮條芩丸安



胎之聖藥也

○丹溪曰天行不息所以生生而無窮荒時子活血行氣有補陰之妙命名益母以其行中有補也故曰胎前無滯產後無虛○條芩白朮乃安胎之聖藥俗以黃芩為寒而不用反謂溫熱藥能養胎殊不知胎孕宜清熱養血使血循經而不妄行乃能養胎黃芩必取細挺沉實者用之○縮砂安胎以其止痛行氣故也砂仁非八九箇月內不宜多用

○懷妊嗜物乃一歲之虛如受酸物乃肝藏止能養胎而虛也

○胎動者因火逼動胎逆上作喘急用條芩香附之類

○胎漏謂有胎而血漏下也屬氣虛有熱用四物湯加阿膠珠

白朮條芩縮砂炒香附黑加糯米白水煎服

○又方治胎漏下血

條芩五錢

白朮一兩

砂仁炒

阿膠炒成珠各三錢



右為細末每服二錢煎艾湯調服水煎服亦可

○又方

枳殼炒

黃芩各半兩

白朮一兩

水煎食前溫服

產室

○胎痛宜用當歸地黃湯

當歸一錢

熟地黃二錢

右細切水一盞半煎至一盞溫服

產室

○心腹諸痛凡妊婦偶有所傷腹痛不安或從高墜下重物所壓觸動胎元痛不可忍及下血者甚妙

砂仁不拘多少

和皮畧炒勿令十分焦黑去皮取仁為末熟

酒調服不飲酒者米飲或艾湯鹽湯皆可調服如覺胎中

熱其胎即安矣此方即驗大抵妊婦不可缺以常服安胎

易產

產室

凡妊娠二三箇月忽心腹痛不安用



當歸 三錢

阿膠 錢二

甘草 錢二

葱白 四根

右細切分作二服每服用水二盞煎至一小盞溫服

凡妊婦四五箇月忽心腹痛

大棗 十枚 炒令黑 鹽 一錢 炒

右為末取一撮許酒調服之立愈

○治妊娘心腹大痛氣欲絕者

川芎

川歸

茯苓

厚朴 各一兩

右細切作一服用水三升煎至一升分二服立飲而愈

○川芎散治婦素有令氣冲心如刀刺者

川芎 一錢

人參

吳茱萸 各五 茯苓

桔梗 各四

當歸 一錢

製朴 五分

芍藥 七分

枳殼

炙甘草 各三

右細切作二服水一盞半煎至一盞稍熱服



室產○妊娠腰痛如折不能轉側

鹿角五錢

右以火燒令赤酒淬再燒再淬以碎為度細末酒調服

室產○治妊娠腰脚腫痛

腫一本作腫

白茯苓

白朮

乾姜

甘草各一錢

杏仁三錢去皮尖研

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服

○胎腫謂有胎或手足或頭面通身浮腫者是也屬濕多或用

山梔子一合炒為末米湯調下丸服亦可

○惡阻乃有孕而惡心阻其飲食者是也多從痰治用二陳湯

之類○又方以白朮為丸服一日肥人是瘦人是熱

○半夏茯苓湯治惡阻不食吐逆頭眩四肢怠惰煩疼惡寒自

汗



透一二三

半夏

湯炮七次漬過宿姜汁拌炒黃色

生薑

各一錢

茯苓

七分

熟地黃

陳皮

桔梗

覆花

無嗽不用

人參

芍藥

甘草

川芎

各五分

右細切

水煎

空心服

○千金方有紫蘇細辛各五分

○

一婦孕兩月嘔吐頭眩鑒以參朮川芎陳皮茯苓服之愈重

脉弦左為甚以惡阻病必怒氣所激問之果然肝氣既逆

又夾胎氣參朮之補大非所宜以茯苓湯下抑青丸二十

四粒五服稍安脉畧數口苦乾食即口酸意其隔間滯氣

未盡行以川芎陳皮枳子生薑茯苓煎湯下抑青丸十五

粒而愈但口酸易飢以肝熱未平以熱湯下抑青丸二十

粒愈後兩手脉平和而右甚弱其胎必墮以時肝氣既平

可用參朮以防之服一日而胎自墮矣

○參橘散治妊娠三月內惡阻吐逆不食或心虛煩悶



橘紅

茯苓各一錢

麥門冬

白朮

厚朴姜製

甘草各五分

右細切作一服加生姜三片竹茹一錢或加入參一錢水一盞煎七分溫服

○小膠艾湯治妊婦因頓仆挫跌胎動不安或胎墮上逼心或

腹痛血下

阿膠炒成珠

艾葉二兩

指迷方加秦艽一兩

右細末用水三升煎至一升半分三服

○膠艾湯不問月數淺深安胎極妙

熟地黄

艾葉

當歸

甘草炙

川芎

阿膠各五錢

黃芪二分半

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服

產室

○治妊婦下血不止胎上冲心四肢厥冷悶仆欲死



阿膠炒

艾葉各一兩

竹茹如拳

白砂蜜二合

右用冰二升煎至三升入蜜更煎一二沸分二服

產

○治雖娘下血如月信來者若致胞乾非特損子亦能損母

熟地黄

乾姜炮各一兩

右為細末每服三錢一日夜三四服

產

○治胎孕無故下血腹痛不可忍或下黃汁如漆如冰如豆

汁者上

野苧根炒

金根各一兩

右用冰酒各一盞煎至一盞去粗分作二服不拘時服

產

○胎動沖心煩悶欲死安胎止痛

當歸酒洗

川芎

人參

阿膠

甘草炙各一兩

葱白切一升

右用冰七升煎至三升分三服



產室

○妊娘因舉重仆跌損傷胎氣不安或子死腹中

川芎一兩

右為細末每服一匙連進三服死胎即下

○治妊娘遺尿失禁

白薇

白芍藥各等分

右為細末酒調方寸匕日三服

○子煩妊娘苦煩悶不安又曰心煩熱悶謂之子煩

麥門冬

茯苓

防風

知母各一錢

右細切作一服用水二盞煎至一盞入竹瀝一二匙服

○犀角散治子煩

犀角屑

地骨皮

條芩

麥門冬

赤茯苓

各一錢 一升炒五分

右細切作一服水一盞半煎至一盞入竹瀝一合溫服



○當歸飲治子煩

當歸半一錢

川芎

阿膠珠

豆豉

桑寄生各半葱白七莖

右細切作一服水一盞半煎至二盞溫服

○竹瀝湯治子煩

竹瀝一合

防風

黃芩

麥門冬各一錢

白茯苓半一錢

右細切作一服水一盞半煎至二盞去粗入竹瀝再煎數

沸溫服

○產寶澤瀉散治妊娘氣壅身熱腹脇浮腫喘急氣促小便閉

澁不利謂之子滿

澤瀉

桑白皮

枳殼麩炒黃色

枳榔

木通

赤茯苓

各等分



金匱

右細切每服四錢加生薑五片一盞煎八分溫服  
○張仲景曰婦人本肌肉肥盛頭舉目滿今反羸瘦頭舉中隆胞系了戾亦多致誤病但利小便便即愈宜服腎氣丸蓋藥中有茯苓故也地黃為君功在補胞

方良

○木通散治妊娠身軀浮腫四肢脹急小便不利謂之子腫

木通一錢

木香

柯子皮各三

香薷一錢

枳殼炒五

檳榔五分

桑白皮一錢

條芩五分

紫蘇莖葉一錢

右細切作一服加生薑三片水一盞半煎至一盞溫服

○全生白朮散治妊婦面目虛浮肢軀腫脹名曰子腫

白朮一兩

生薑皮

大腹皮

陳皮

茯苓各五

指迷方用伏苓皮多桑白皮無末

右為細末每服二錢米飲調下



室

○鯉魚湯治妊娘腹脹滿或通身浮腫小便不利或胎死腹中此方甚驗

當歸

白芍各一錢

白茯苓半錢

白朮二錢

橘紅五分

鯉魚拘一大尾不

右細切作一服

將鯉魚去鱗腸白水煮熟去魚用汁一盞

半生薑七片煎至一盞空心服當見胎水下如水去未盡

或胎死腹中脹悶未除再合一劑服之水盡腹除為度

○紫蘇飲治胎氣不和湊上心腹脹滿疼痛謂之子懸

大腹皮

川芎

白芍

陳皮

紫蘇葉

當歸各六分

人參

甘草各三分

右細切作一服加生薑三片葱五莖水煎服

○天仙藤散治妊娘三月成胎之後而足自脚面漸腫至膝行

步艱難喘悶妨食若水腫甚至足指間有黃水出者謂之



子氣

天仙藤洗淨畧炒即青木香藤也

甘炒

烏藥

香附子炒 木香各等分

陳皮

右細切每服三錢加生姜三片紫蘇五葉水煎日三服腫消止藥

產室○安榮散治妊娠小便澀少遂成澀謂之子淋

麥門冬

通草

滑石

當歸

燈心炒

甘炒

錢各五

人參

川芎

各一兩

右為細末每服二錢煎麥門冬湯調下○此方恐滑石太重而滑胎若胎臨月可用若六七箇月已前俱不可輕用宜去此味或加梔子篇蓄石榆之類最穩瞿麥亦恐損胎不可用也

驗錄○地膚子湯治子淋小便澀數



地膚草

與芥菜相似俗名白地苳

車前子 各一錢

知母 去毛炒

黃芩

赤茯苓

白芍

枳殼 麸炒黃色各七分

升麻

通草

甘草 各三分

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服

○又方治子淋

地膚草

四兩

右以水四升煮取二升分三服或新取地膚

草搗取自然汁服亦可不獨治子淋凡小便淋閉服之無

不效驗

外臺

○冬葵子散治子淋小腹疼痛胎動不安

冬葵子

炒

柴胡

去芦

桑白皮

赤茯苓

赤芍藥

當歸

各等分

右細切每服四錢水一盞半加姜三片葱白七寸煎至一

盞去粗溫服



外○車前散治子淋或小便不通下焦有熱

楸柳

木通

陳皮去白

赤茯苓

車前子

赤芍

當歸

滑石

石葦炙去毛

右各等分每服五錢水一盞半煎至一盞溫服

外

○忘憂散治妊婦心經蘊熱小便赤澀不利淋瀝作痛

琥珀不拘

萱草根一握

右以琥珀研為細末每服五分濃煎服

局

○葛根湯治妊娘臨月忽發風痊悶亂不省人事吐逆眩倒

少時醒後復發謂之子癰

貝母

葛根

牡丹皮

防已

防風

當歸

川芎

桂心

茯苓

澤瀉各五錢甘草各三分

獨活



方局

方局

石膏

人參 各一錢

右細切作一服水二盞煎至一盞溫服日三服其貝母令  
久易產未臨月者以升麻代之忌菰菜

○防已湯治妊娠中風口禁四肢強直角弓反張

防已 五錢

羌活 一錢半

右為細末別用黑豆一合炒焦黑投好酒中沸定去豆調  
藥末攤開口灌之稍醒再灌有效

○消風散治妊娠頭眩目眩視物不見顯頰腫核

石膏 煨

牛菊花 去萼

防風 去芦

荆芥穗

羌活

羚羊角

川芎

大豆黃卷 炒

當歸 酒浸洗

白芷 各五分

甘草 二分半

右為細末作一服加芽茶五分水一盞半煎至一盞食後  
溫服



方局

○天門冬飲治妊娠外感風寒久嗽不已謂之予嗽

天門冬

紫苑茸

知母

去毛酒洗

桑白皮

蜜炙各一錢

五味子

桔梗

去芦各五分

右細切

作一服水一盞

半煎至一盞

嗽血者加阿膠五分

大便澁者加苦亭歷子五分

○百合散治妊娠咳嗽心煩不欲飲食

百合

紫苑茸

麥門冬

桔梗

去芦

桑白皮

竹茹各一錢

并炒五分

右細切作一服水一盞

半煎至一盞

入蜜半匙

再煎二三

沸去粗溫服

○八味丸治妊娠小便不通名曰轉胞亦治子淋此氣丸加

桂心附子炮各二兩是也

○丹溪參朮飲治妊娠轉胞

四物湯加

人參

白朮

半夏

湯泡透陳皮

并炒

金匱

方局



方良

右爲細末加姜水煎服

○丹溪曰轉胞之証胎婦之稟受弱者憂悶多者性急燥者食  
味厚者庸或有之古方皆用滑利藥鮮有應効因思胞不  
肯轉爲胎所壓轉在一邊胞系了戾不通耳胎若舉起居  
於其中胞系自踈水道自利夫胎之墜下必有其由吳宅  
寵人患此兩手脉似瀉重按似弦左稍和予曰此得之憂  
患瀉爲血少氣多則胎氣弱而不能舉弦爲有飲血少則  
胎弱氣多有飲中焦不清而隘則胞知所避而就下乃以  
已上藥與服隨以指探喉中吐出藥汁候少頃氣定又與  
之次早亦然至八貼安猶恐誤法偶中後又治數人亦效  
○安胎散治難娠胎寒腹痛胎熱多驚舉動腰痛腹滿胞急卒  
有所下或因頓仆悶胸或食毒物或感冒時疾寒熱往來  
致傷胎藏並皆治之



產寶

良方

川芎

枳殼麩炒黃各錢半

熟地黄三錢

糯米合

右細切作一服水一盞半生薑三片大棗一枚更加金銀

三五錢同煎至二盞溫服

○如聖散治妊娘腹痛胎動不安

鯉魚皮

當歸

熟地黄

阿膠炒成珠

白芍藥

川芎

川續斷酒浸

甘草各等分

右細切每服四錢水一盞半生薑三片苧麻根半錢許煎

至二盞溫服○一方加乾姜竹茹無續斷

○加味四物湯治妊娘下血不止

本方加艾葉三十片

阿膠珠一錢

右細切每服四錢水一盞半加烏梅肉少許同煎至二盞

熱服連進三四服即止

○苧根湯止血安胎



野苧

二兩 炒

用酒水各一盞入金銀同煎至一盞溫服

方良

○桑寄生散治妊娠下血不止胎動不安

桑寄生

川歸

川續斷

川芎

香附子

阿膠炒

茯神

白朮

人參

甘草

各半錢

右細切作二服加生姜三片水一盞半煎至一盞溫服

方良

○羚羊角散治妊娠中風頭項強直筋脉挛急言語蹇澁痰涎壅盛或時發搐不省人事謂之子癇

羚羊角

獨活

酸棗仁炒

五加皮各八分

薏苡仁

防風

當歸

川芎

茯神

杏仁各四分

木香

甘草各二分

右細切作二服加生姜三片水煎服

○歸涼節命散治妊娠面赤口苦舌乾心煩腹脹等症

產

○歸涼節命散治妊娠面赤口苦舌乾心煩腹脹等症



川芎

苧根

白芍

麥門冬

川歸

白朮

糯米

荊芥穗

甘草 各半錢

右細切作一服水一盞半煎至二盞入蜜一匙服

○白扁豆散治妊婦誤服草藥及諸般毒藥毒物

白扁豆 生去皮

右為細末清米飲調方寸匕神效

方良

○芎藭補中湯養新血去瘀血補虛扶危

阿膠珠

五味子

乾姜

各四分

黃芪 蜜炙

川歸 酒浸

白朮

川芎

赤芍 各七分

人參

杜仲 炙

甘草

炙各三分

右細切作一服水一盞半煎至二盞溫服後有方名同

多木香治小產



方良

○當歸芍藥湯治妊娘下痢赤白腹中疴痛

白芍一錢

當歸

白茯苓

澤瀉

白朮

條芩各半錢甘草

黃連

木香

檳榔

各三分

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服如白痢腹痛甚者恐有寒也去芩連加乾姜三分

寶產

○芎朮香連丸治証同前

阿膠珠

白朮

各五錢乳香

木香

各二錢半

枳殼煨炒

乾姜

炮各二錢

黃連一兩

炒

川芎各五錢

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服三十丸白湯下

寶產

治妊娘泄瀉兩脇虛鳴臍下冷痛由食瓜果生冷等物及

當風取涼所致者



栢子皮煨

白木各一錢 陳皮

良姜炒

木香

白芍酒炒

甘草炙各五分

肉荳蔻煨裏五分

右細切加生姜五片水一盞半煎至一盞溫服

產室

○芎蘇散治妊婦外感風寒渾身壯熱頭目眩暈

紫蘇葉

川芎

白芍

白木

麥門冬

陳皮

乾葛各六分 甘草炒三分

右細切作一服加生姜五片葱白三寸水一盞半煎至一

盞溫服不拘時候

旅

○升麻六物湯治妊婦六七箇月傷寒壯熱或發赤斑癰

升麻二錢

梔子

杏仁

大青草

小草

甘草各一錢

右細切作一服加葱白三寸水一盞半煎至一盞溫服

婦人

○妊婦傷寒百節疼痛壯熱不急治即落胎



柴胡

乾葛

知母

石膏

各六錢

大青八錢

梔子一兩

升麻八錢

葱白十四莖

右細切用冰七盞煎至三盞半分四服

人活○傷寒安胎

白朮

黃芩

各等分新瓦上炒

右細切每服三錢加生姜三片水煎服

人活○治妊娠傷寒

柴胡一錢

前胡

當歸

各七分人參四分

芍藥

生地黄

各六分

甘草

三分

右細切作一服加生姜三片葱白三莖水一盞半煎至一

盞去粗溫服

產

○催生散治妊娠傷寒熱病胎死腹中身冷唇青不能自出

蒼朮

一錢

桔梗

五分

橘紅

三分

白芷



桂心去皮

甘草炙各半

當歸酒浸

乾姜炮

厚朴

芍藥

半夏泡

川芎

枳殼炒各半

南木香

杏仁炒各一分

右細切作二服水一盞半加生薑三片大棗一枚煎至一盞

溫服未下再進一服

○雖治妊娠嗽

紫苑茸

麥門冬各半

白皮

杏仁炒去尖研

炙甘草各二分

右細切加生薑三片竹茹一塊彈子大用水一盞半煎至

一盞去粗入白蜜一蛤殼許再煎數沸溫服

產室○妊娠痰嗽見紅

歸身

熟地黄

天門冬

麥門冬

紫苑各五分

桑白皮蜜炙

杏仁

炙甘草

桔梗

片黃芩

五味子

阿膠炒成珠



錄

○小產後下血不止  
右細切作一服痰盛加竹茹一團水煎入小薊汁同服

人參

黃芪

當歸

白朮

白芍

艾葉

甘草炙

阿膠炒

川芎

青皮

香附

砂仁

右各等分白水煎服

錄

○小產後心腹疼痛

當歸

川芎

熟地黄

白芍 各一錢

玄胡索

七分

薤仁炒去皮尖

紅花 各三錢

香附子

青皮

炒黑

澤蘭

牡丹皮

各等

右細切水一盞半入童便酒各半盞煎至二盞服

錄

安胎湯治胎氣不固時常小產宜預服以固胎元

四物湯加阿膠珠香附子白朮條芩砂仁糯米桑寄生白

水煎服



產室○治兒在腹中叫哭

用多年空屋下罈穴中土一塊念妊婦驗之即止

○又方用黃連三五錢濃煎汁時時啣下自止

一云臍帶上疙瘡乃兒口中食者因妊婦登高取物脫出兒口以紙作簪令妊婦曲腰向地拾物使兒復得令入口中即止

○丹溪束胎丸至七八箇月內服之

黃芩炒夏一兩秋錢冬五錢白朮二兩 茯苓七錢半 陳皮三兩

右為細末粥丸如梧桐子大每服三四十丸白湯下

丹○達生散孕至八九箇月內服十數貼甚好易產腹少痛

大腹皮原本三錢恐太多今用一錢先洗淨方用恐毒害

人參 陳皮 紫蘇連葉各五分 白芍藥

白朮 當歸各一錢 甘草炙二錢



漢丹

○臨月用以養胎方

當歸

川芎

黃芩

陳皮

白朮

香附

各一錢

白芷二分

甘草

二分

右細切水煎調益元散一錢服虛者加人參七分

漢丹

○催生散

白芷

炒焦黑

百草霜

白滑石

各等分

右為細末煎芎歸湯調下二三錢

右細切作一服外入黃楊腦七箇食少胎瘦葱五葉夏加黃芩黃連五味子春加川芎防風秋加澤瀉冬加砂仁或通加枳殼砂仁胎動不安加金銀三五錢野苧麻根一錢氣上逼心加紫蘇地黃性急加柴胡多怒或加黃芩佐之食少加砂仁神麴渴加麥門冬黃芩能食倍加黃楊腦藥以



丹溪○紅莧菜及馬齒莧俱能墮胎妊婦切忌臨產用以催生煮

食亦效

丹溪○難產多是氣血虛亦有氣血凝滯而不能轉運者亦有因八九箇月內不能謹愆者

丹溪○難產多見於安逸鬱悶之人富貴奉養之婦其貧賤者未之有也古方瘦胎飲本為湖陽公主設蓋以其奉養厚而氣實故為其方以耗其氣使氣血和平而易產耳非至論也

仲景○金匱當歸散安胎養血清熱孕婦時常宜服

當歸

川芎

芍藥

白朮

條芩 各等分

右為細末每服二錢溫酒或湯調服

方○金液丸治橫生倒產



飛生毛

火燒腋下者尤佳

血餘

無病女人髮燒牙

公母羊糞

已上各半錢

伏龍肝一錢

黑鉛

三錢急用細子火鎔投水銀細研

右為細末用粽子尖為丸如菉荳大遇難產以順流水送

下五九兒身自順而正產子母俱活矣

○催生鉛丹治橫生逆產

黑鉛一錢

右以小銚子大上鎔化投入水銀二錢急攪結成砂子傾

時異作標

出用熟絹細作丸子如菉荳大臨時以香水送下立產

○如神丹治難產用巴豆三枚草麻子七枚各去殼研入射香少

許捏作餅子貼臍

詩曰巴三草七脫衣裳

細研如泥入射香

捏作彈丸臍下貼

須臾子母便分張



○催生如聖散用黃蜀葵子不拘多少炒

右為細末每服二錢熱酒調下如不飲酒熱湯調亦可或  
以蜀葵花焙乾熱酒調下一錢亦效

詩曰黃葵子炒百餘粒

研爛酒調濟窘急

若還臨危難產時

免得全家俱哭泣

○香桂散下死胎

刺香五分

官桂三分为末

右件和勻作二服溫酒調下須臾即下

○來甦散治孕婦欲產未產之時忽然暈悶不省人事

木香 不見火

神麴 炒

陳皮 去白

麥蘖 炒

黃芪 去芦

生薑 切碎 炒黑

阿膠 珠玑

白芍 各五分

糯米 半合

苧根 一錢

甘草 三分

右細切作二服水一盞半煎至一盞去粗擗開口灌下未



醒再煎一服連接灌之即甦

室

○穉穉奪命丹治臨產未產之時目翻口禁面黑唇青口中沫沫子母俱殞命在須臾若兩臉微紅子死母活急用此

藥救之

蛇退

一條統

千里馬

路上一隻燒灰

金銀鉤

各七片

髮灰

一錢

蚕退紙

燒灰

乳香

五錢

黑鉛

一錢

半用水

成銀

右共為細末以攢猪心血和丸如梧桐子大每服二九刮流水送下如灌不下化開灌之修合以藥時勿令婦人孝子雞犬見之

室

○無憂散治分娩難產及胞衣不下等証孕婦臨月預服此藥日進二服則子易生而胞易落也

當歸

酒洗

川芎

白芍

各七分

木香

不見火

甘草

各五分

枳壳

炒黃色

乳香

各一錢

血餘灰

四分



右為細末分作二服水一盞煎至八分濾去粗溫服不拘  
時候吳本無候字

○催生奪命如神丹

牡丹皮 枳殼 煨炒

赤芍 各二錢 蛇退 二錢

青皮 阿膠珠

甘草 炙 五加皮

芸薹子 管蠶

馬鳴退 炙焦各五分

花蕊石 五分 乳香 另研

右為細末煉蜜丸如彈子大臨產細嚼一丸棗湯送下未  
產少頃又嚼一丸以產為度

○芩歸湯一名佛手散治妊娠因事跌仆子死腹中惡露妄行  
疼痛不已口禁欲絕用以藥探之若子死腹中五便逐下  
若腹痛隨止子母俱安又治臨產難生胞衣不下及產後  
血暈不省人事狀如中風血崩惡露不止腹中血刺病痛



血滯浮腫入心經語言顛倒如見鬼神血風相搏身熱頭  
痛或似癰非癰一切胎前產後危急狼狽垂死等証並可  
治之

當歸酒洗去  
芦一兩

川芎七錢

右細切分作四服每服用水一盞煎前水將乾投酒一盞煎  
煎五七沸溫服如口噤攪開灌之如入行五里許再灌盡  
以四服便省立產神驗

○奪命丹治胞衣不下蓋見之初生惡血流入衣中衣為血所

脹塞故不得下須臾冲上通心即死急服此藥

黑附子五錢  
炮牡丹皮一兩

乾漆二錢  
炒烟盡為度

右為細末用米醋一升大黃末一兩同煮成膏和前藥末  
為丸如梧桐子大每服五七丸溫酒下

室產

○黑龍丹治難產及胞衣不下血迷血暈等証



當歸

五靈脂

川芎

良姜

生地黄

已上各二錢 紙筋鹽泥固濟 切入雞子壳內

百草霜

一兩 硫黃

煨

乳香

各二錢

琥珀

花蕊石

各一錢

右件連前藥共為細末酒米糊為丸如彈子大如用時將一二九仍用火煨紅為末以童子小便合酒調灌下垂死者灌三四九即活其功不可盡述

生

○一方治胞衣不下

川牛膝

二錢

當歸

一錢半

木通

三錢

滑石

四錢

黃葵子

二錢半

右用水煎連進三四服立下

婦

○

枳殼散姪娘八九箇月內胎氣壅滿常宜服之滑胎易產安胎子臟益血舒氣



枳殼

五兩 炒黃色

粉甘草

炙一兩

香附子

炒一兩

右為細末每服二錢空心沸湯點服日進三服一方加糯米炒同為末白湯點服令兒易產初生胎氣微黑百日後肥白以為古方之冠若妊婦稍弱者單衣恐胎寒腹痛胎弱多驚於內加當歸一兩木香半兩不見災如以用之則陽不致強陰不致弱二氣調和有益胎嗣

○自妊娠初得以至臨月藥石禁忌歌

歌曰 玃班水蛭及蜚虫

烏頭附子與天雄

野葛水銀并巴豆

牛膝薏苡連蜈蚣

三稜代赭荒花射

太戟蛇蛻黃雌雄

牙硝芒硝牡丹桂

槐花牽牛皂角同

半夏南星與通草

瞿麥乾姜蟹甲瓜

礞砂乾漆蕪荑仁

地膽茅根莫用好



局○飲食禁忌

雞肉合糯米食令子生寸白虫○食犬肉令子無聲○鮎  
鯉同雞子食令子生疥蝕瘡○食兔肉令子缺唇○食  
羊肝令子多疳難○食鰲肉令子項短縮頭○鴨子與豕  
堪同食令子倒生心寒○鮮魚同田雞食令子瘡癰○雀  
肉同豆醬食令子面生雀斑點○食螳螂橫生○食姜  
采令子多指○食冰漿令絕產○食雀肉飲酒令子多淫  
無耻○食菰菰消胎氣○食驢馬肉過月難產○豆醬合  
霍菜食墮胎○食山羊肉令子多病○食鰕鱗無鱗魚難  
產○食諸般菌生子驚風而夭○食雀腦令子患雀目○  
勿妄服湯藥勿妄亂針灸勿過飲酒漿勿舉重登高陟險  
心有太驚子必顛癇勿多睡臥須時時少步動和血脉勿  
勞力過傷使腎氣不足子必解顛腦破不活○大母太溫



食毋太飽若脾胃不和榮衛虛損子必羸瘦多病戒之戒之

鑒○臨產須知

○一臨月不可洗頭以免橫生逆產

○一懷娠十月已滿陰陽氣足忽然臍腹陣痛胎孕偏陷腰間重脹穀道挺迸漿水淋下其兒遂生此乃正產若當生自有其時如瓜熟蒂懸栗熟自落之類

○一凡臨產宜擇年高有識穩婆及純謹婦人三四人扶持一應外來閑雜之人喪服穢濁之婦預宜杜絕勿令觸犯胎氣致產不利產後客氣犯兒亦主傷害

○一凡臨產房中不得喧鬧宜緊閉門戶靜以待生

○一歲月滿足方覺腹痛不可驚動太早早則舉家霍亂卜筮問神巫覡之流稱說鬼神多方哄嚇媒利產婦聞之恐



怖夫恐則氣怯氣怯則上焦閉下焦脹氣乃不行以致難產如犯此意宜服紫蘇飲以寬其氣

一凡臨月忽然腹痛或作或止或一日二日三五日胎水已來腹痛不止者名曰弄痛非當產也又有二月前忽然腹痛如欲便產却又不產者名曰試月非當產也不問胎水來與不來俱不効事但當寬心候時若果當產時腰腹痛極不已穀道挺進眼中火出其時便產豈有或痛不痛欲產不產之候耶人多於此胡行亂做杜了性命可不慎歟一凡初覺腹痛而腰不甚痛者未產也且扶行熱忍若行不得則凭物而立行得又行

一世人不識但見腹痛總作便謂生產坐生婆踈狂者不候時至便嘗試水試水併胞漿先破風入產戶以致腫脹閉戶狹小乾澀難產



一將產之時產母甚痛不肯舒伸行動固執曲腰眠睡胎元轉動尋到生門已被遮閉又轉又尋尋二胎已無力決至難產

一初覺不痛且當任意坐卧勉強飲食毋致臨產乏力

一凡產母初覺欲生便須惜力調養不可妄亂用力兒身方轉便被用力一逼令兒錯路以致橫逆須待臨到產門用力一逼兒即下生此所當用力也譬如登屋廁時候未至用力何益

一凡產母如覺心中憤悶可取白蜜一匙溫水調服

一產母如覺飢餓可進以軟白粥不令飢渴以致乏力亦不可食硬飯糗粽恐產後有傷食之病

一未產之先或煩渴欲飲水只可與清米飲飲之為佳

一凡產不可服催生待水況血得寒即凝血一凝則胎滯而



反致難產夫催生符水蓋是野道士求食媒利之設有荷益哉

一凡產婦胞漿未下但當穩守無妨胞漿既破一二時後不  
生便當服催生藥要緊夫胞漿者本胞內養兒之水也見  
既折胞其水既下胎隨水而下則為易生胎元無方轉頭  
遲慢漿下即血來閉塞道路令子無路可通故難產也如  
用蜀葵子等破血之藥逐去惡血令兒得路而生故曰催  
生藥也

一凡催生多用滑利迅速之藥如

鬼腦

筆頭灰

弩牙

蛇退之類是也

二凡催生若見水血先下子道乾澀不能下者如

猪脂

油

蜜

酒

葱白

葵子

牛乳

榆白皮

滑石之類是也



○三凡催生若稽停勞力之久風冷乘虛入於子宮使氣血凝滯而難產者如

牛膝

葱

桂

五積散

順元散之

類是也

○四凡催生有觸犯惡氣心煩燥悶難產者如

射香

硃砂

乳香

青竹茹之類是也

○夫產育之難者皆由產婦不曾預聞講說生育道理臨事倉惶用力失宜遂有難產之危是故有逆產者則先露足有橫生者則先露手坐產者則先露其背此皆用力太早之過夫當臍腹疼痛之初兒身繞轉而未順用力一逼遂致橫逆若手足先露者用細針刺兒手足心一二分深三四刺之以益塗其上輕上送入兒得痛驚轉一縮即順生之矣或見脚先下者謂之踳蓮花生急以益塗兒脚底又可急



搔之併以鹽摩母腹上則正生矣

○灸法治難產及胞衣不下急於產母右腳小指尖頭上灸三壯炷如小麥大立產

○凡橫倒難產用蛇蛻一條全者蚕退紙一方右以三物入新甕瓶中鹽泥固濟燒存性為末煎榆白皮湯入乳香同調服下則順生

○又方治橫生先露手足

阿膠炒

滑石一兩

冬葵子一合

酥油一兩

每服四錢水一大盞煎至七分連進二三服

○又方治橫逆不順子死腹中用

伏龍肝

灶心紅土也

右為細末溫酒調下一二錢其兒頭戴土而出甚驗

○礙產



凡兒身已順門戶俱正兒已露頂而不能生以因兒身回轉肚帶攀住兒肩不能下也治法急令產母仰臥輕輕推兒向上徐徐引手以中指按兒肩下其臍帶須候兒身正順產母用力一送兒即下生○又法令穩婆款款分開臍帶外將紙燃

○凡兒身向未順生路未正被產母用力一逼令兒偏生或左腿或右腿或臂或左右額角雖兒身已逼產門而不能下但云兒已露頂非頂也治法當令產母仰臥看生人輕輕推兒近上以手正其頭用力一逼即下若是頭之後骨偏住穀道兒則露額當令看生人以綿衣炙令溫煖裹手急於穀道外傍輕輕推兒頭令正然後用力一送兒即下生

○治盤腸產法

○有臨產則子腸先出其可驚恐治法以盆盛溫水溫潤其腸

又名偏產



令產母仰臥且以言語安慰其心却用好米醋半盞和新  
汲水七分攪勻忽喚產母面或背則打頓而收每一喚令  
一縮三喚三縮腸則盡收矣合用參芪歸芎等大劑補藥  
加升柴防風之類以升舉之末有不安者也○又法急以  
草麻子去殼研細貼產母臍上即收

○一方治產難數日子死腹中不出母氣欲絕

瞿麥 六兩

通草 三兩

桂心 三兩

牛膝 四兩

榆白皮 四兩

一方無榆白皮有天花粉四兩大能墮胎右

細切用水九升煎取三升去粗分三服頓飲即下

○又方牛膝丸下死胎

牡牛膝

三兩

紫金藤

七錢

肉桂

二錢

當歸

四錢

蜀葵根

七錢

射香

五分

右為末米糊為丸如梧桐子大硃砂為衣每服五十九乳



香湯送下

○又方治子死腹中不出

用黃牯牛尿不拘多少塗母腹上立出○一云以牛尿炒

令大熱入醋半盞以青布包裹於母臍上下熨之立下

○又治子死腹中用雞子黃一箇生養自然汗一合調勻頓服

分免後用養養粥補之

○生子下血過多子死腹中增寒半指甲青面色黃黑胎上搶

心悶亂欲死冷汗自出喘滿不食或食毒物或誤服草藥

傷胎下血不止胎尚未損可矣若已死即下極妙

牡丹皮

赤芍

桂心

薤仁

白茯苓

右各等分為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸細嚼淡

醋湯送下連服數丸立驗

○一方治胞衣不下

川牛膝三錢 當歸身尾二錢 木通三錢 滑石四錢

冬葵子<sub>半二錢</sub>

右細切水煎連進二三服即下

○丹溪活套

凡婦人胎前諸疾只須以四物湯為主治者証加減調治  
○如覺腹中煩悶口苦厭食不問月數多少本方加白朮  
條芩砂仁煎服○如五六箇月後胎動不安或逆搶逼心  
本方加阿膠艾葉砂仁枳殼條芩白朮野苧根入金銀同  
煎服○如氣血虛心煩脉虛大無力或怔忡手戰及時有  
微熱本方加入參白朮黃芩甘草酸棗仁遠志麥門冬地  
骨皮等藥○如五六箇月前無故下血或因事下血謂之  
漏胎本方加條芩白朮甘草白芷茅根地榆桑寄生之類



○如七八箇月前後面目及四肢浮腫本方加茯苓澤瀉  
白朮條芩炒梔子厚朴甘草稍麥門冬之類○如孕中忽  
然口噤吐沫不省人事言語錯亂本方合二陳湯加麥門  
冬竹茹遠志石菖蒲之類○如感冒風寒頭痛發熱或身  
體疼痛本方合小柴胡湯或更加細辛白芷防風羌活等  
藥○如二三箇月內嘔吐惡心不納飲食謂之惡阻本方  
去地黃加陳皮半夏縮砂仁神麴霍香麥芽陳蒼朮白朮  
之類○或因事動胎致胎不安動撞不已及下血欲墮本  
方加入參白朮白茯苓條芩白芷桑寄生砂仁阿膠珠母  
草等藥○或時有白濁白帶本方加白茯苓陳皮蒼朮半  
夏神麴牡蠣龍骨之類○如無故腹痛瀉利清水或發熱  
胎動不安本方加白朮茯苓椿苓澤瀉蒼朮柯子皮砂仁  
神麴乾姜之類



○祖傳經驗秘方治難產瀝漿胞乾胎不得下用香油蜂蜜各一  
碗和勻用銅鈹慢火煎一二沸掠去沫調白滑石末一  
兩重攪勻頻服外以油蜜於母腹臍上下摩之立產

○又方催生曾試甚驗用兔頭骨家猫頭骨各一箇烈火煨地  
上出火毒研為極細末每服二三錢濃煎苦歸湯調下即  
產

○又方治胞衣不下三退飲

蛇退

二條  
全者

蚕退紙

一方

蟬退

四十九箇

用甕瓶盛燒存性細研順流水調服立下

論

婦人科下產後

內經曰一息不運則機絕窮一毫不續則穹壤判所謂氣血周流循環無端少有不斷則身危矣若夫妊娠之婦子在腹中母子一氣流通全賴漿水滋養十月數足血氣完全形神俱備忽如夢覺自能用手折胞求路而出既出胞外母子分艱呼吸殊憊其可久羈於內而使氣化不運不續哉夫胎元壯健者胞既拆即隨漿而下故易產也其困弱者轉頭逐縲胞漿既乾活血來塞道路凝滯是以橫生逆產子死腹中而產母之命死在頃刻可不畏乎凡見將生之際胞漿既下踰時尚未分娩便當傍惶設計用藥逐去惡血使子路通暢而無難產之患豈可袖手以待斃哉是故催生之藥即芎歸益母草冬葵子之類皆使之逐去汚血者也若腰腹未甚痛



漿水少淋瀝而下名爲試漿實非胞內真漿也且宜寬心守  
待切不可輕易便令穩婆接取產母用力逼胎太早多致橫  
逆不順切須謹慎其或先見手足不順者額偏露者但當以  
手輕輕撥正以待其自下可也若分娩之後胞衣未下者猶  
爲可慎宜多方用藥逐下甚不可令粗率之婦摘取嘗見有  
擗被尿將致終身之害者有取下肝葉而產母隨時殞命者  
可不謹與若夫難產之婦皆是產前惑惑所致非獨難產且  
產後諸疾皆由是而生焉或有乍寒乍熱似瘧非瘧或太熱  
頭疼身痛如傷寒狀或卒中口禁如瘧如癰或左癱右瘓角  
弓反張或妄言見鬼心忪惶惑或耳目口鼻忽覺黑氣如烟  
薰之狀或腹中作痛綿綿不絕已上諸症若非惡露未盡即  
是勞傷血氣大虛之証丹溪曰凡產前當清熱養血爲主產  
後宜大補氣血爲要雖有雜証以未治之以萬世不易之確



論也。雖然亦有離褥太早或澡浴身垢以致感冒風濕或冬  
啖雞子糞粽難消之物皆能惡寒發熱變証多端。醫者宜潛  
心診察脉候以扶危拯急不可苟且妄治以夭折人之天年  
也。

脉法

脉經曰：新產婦人有三病：一者病瘧，二者病鬱冒，三者大便  
難。云云師曰：亡津液胃燥故大便難。產婦鬱冒其脉微弱，嘔  
不能食，大便反堅，但頭汗出，所以然者，血虛而厥，厥而必冒。  
冒家欲解，必大汗出，以血虛下厥，孤陽上出故也。但頭汗出，所  
以產婦喜汗出者，亡陰血虛，陽氣獨盛，故當汗出。陰陽乃復  
所以便堅者，嘔不能食也。小柴胡湯主之。病解能食七八日  
而更發熱者，以為胃熱氣實，承氣湯主之。

婦人產後七八日無太陽症，小腹堅痛，此為惡露不盡。四五日



不大便，趺陽脈微實，再倍其人發熱，日晡所煩燥者，譴語不

能食，利之即愈。宜承氣湯以熱在裏，結在膀胱也。

按丹溪曰：產後宜大補血氣，為主雖有雜証，以未治之。又曰：產後不可產後之熱，恐非以仲景治傷寒法，用承氣小柴胡等藥，欲退產後之熱，恐非至到可法之語。姑述於此，以與賢者共議而採擇之可也。

丹溪曰：產前脈細，小產後脈洪，數皆死。又曰：產前脈當洪，數既產而洪，數如故，豈得不死？此亦太藥言之。今見產後豈無脈洪數而生者？

方法 丹溪方法凡十一條

丹溪曰：產後當大補氣血為主，雖有雜症，以未治之。

○產後補虛用參、朮、黃芪、陳皮、歸身、尾川、芎、炙甘草，如發熱輕則加茯苓、淡滲之，其熱自除。重則加乾姜，或云太熱而用乾姜，何也？曰：以熱非有餘之邪熱，乃陰虛生內熱耳。蓋乾姜能入肺分利肺氣，又能入肝分引聚藥生血，然必與補陰藥而



用之以造化之妙非天下之至神其孰能與於此哉

○產後發熱惡寒或口眼喎斜等症皆是血氣虛甚當以大補氣血為主治左手脉不足補血藥多於補氣藥右手脉不足補氣藥多於補血藥切不可用小續命湯表散之劑

○產後惡寒發熱腹痛者當去惡血若腹不滿者非惡血也

○惡露不盡小腹作痛名曰抱痛用五靈脂香附為末醋糊丸

甚者加搗尖薤仁一云用神麴糊丸白木陳皮湯下氣虛者

四君子湯下

○治血刺痛用當歸乃和血之法若因積血而刺痛者宜薤仁

紅花當歸頭之類當用歸尾

○產後血運用韭菜細切盛於有嘴瓶中以滾醋泛之急封瓶

口以瓶嘴納產婦鼻中即甦或用和糖及磚石燒過投醋中薰之亦良法也

○又方用鹿角一段燒存性出火毒為末酒調灌下即醒



○血運因氣血俱虛痰火泛上作暈二陳導痰隨氣血加減硃砂安神丸亦可服以麥門冬湯下

○一方治血運

人參一兩

紫蘇五錢

右細切童便酒水三物同煎服

○嚴氏清血散治產後血運昏不知人

澤蘭葉

人參各一兩 荆芥穗四兩

并草炙八錢

川芎二兩

右為細末每服二錢溫酒入童便調下用漆器燒烟薰之頻置醋炭更服此藥

○愈風湯治產後中風口噤牙關緊急手足痙攣角弓反張

荆芥叢

當歸各等分焙乾

右為細末每服三錢豇淋酒調下童便亦可○豇淋酒用



大黑豆不拘多少炒焦投好酒中

丹○新產後不可用芍藥以其酸寒能伐發生之氣也

方局○產後乳汁不通用通草七分瞿麥柴胡天花粉各一錢桔梗一錢青皮白芷木通赤芍連翹甘草各五分作三貼水煎食後細細飲之更摩乳房或無子食乳者要消乳用麥藥二兩炒分作四服白湯調下

丹○產後泄瀉利用陳皮白朮茯苓川芎酒炒芍藥黃芩滑石

炙甘草煎服立効○一方無甘草有乾姜按二物皆可

丹○凡乳母但覺小水短少即是病生便瀉服藥調治蓋兒飲

母乳母安兒安防患未然治法之善者也

丹○有產婦因收生者不謹損破尿脬而致淋瀝不禁因思肌

肉破尚可完補診其脉虛甚蓋難產因氣血虛故產後猶虛試與峻補以參朮為君芎歸為臣薤仁陳皮黃芪茯苓



方局

為治以猪羊胆煎湯熬藥汁極飢飲之一月而安蓋氣血

驟長其膽即完恐稍遲亦難成功也

黑神散治產後惡露不盡或胎衣不下血氣攻冲心腹疼

痛及血迷血暈等症

熟地黄

當歸酒浸

肉桂去粗皮

黑豆炒半升

甘草炙

白芍

蒲黃各四兩

濟生方無蒲黃有附子

右為細末每服二錢童便和酒調服

室產

人參當歸散治產後去血過多血虛則陰虛陰虛生肉熱

令人心煩短氣自汗頭痛

熟地黄

人參

當歸身

肉桂

麥門冬

白芍炒各一錢

右細切作一服入淡竹葉五片生姜二片水煎服

寶產

寶產 ○當歸黃芪湯治產後失血過多腰痛身熱自汗

當歸身 三錢 黃芪 二錢 白芍 一錢半炒

右細切作一服水一盞半加生薑三片煎至二盞溫服

○失笑散治產後心腹疼痛欲死及兒枕痛

蒲黃 炒 五靈脂 各等分

右為細末每服二錢熬成膏白湯化下

寶產 ○三聖散治兒枕痛

當歸 肉桂 玄胡索 各等分

右為細末每服二錢熱酒或童便調下

○抵聖湯治產後血氣傷於脾胃腹脇滿悶嘔逆惡心

赤芍藥 半夏 澤蘭葉 陳皮

人參 各二錢 甘草 炙一錢

右細切作一服入生薑三片水煎服之



○當歸羊肉湯治產後發熱自汗肢躄疼痛日久不愈各日服

勞

當歸身 七錢 人參 七錢 黃芪 一 生薑 五錢

右細切用羯羊肉一斤煮取清汁五大盞去肉粗入煎藥  
慢火煮取四盞分六服徐徐飲之

生座 ○茯苓散治產後心虛怔忡不定言語錯亂

人參 甘草 山藥 當歸 各一錢

遠志 茯苓 桂心 麥門冬 各五錢

右細切作一服加生薑三片大棗一枚水一盞半煎至一

盞去粗溫服

室座 ○當歸散治產後氣血俱虛恐增客熱宜服此以去惡露

當歸 白芍 川芎 黃芩 各一兩

白朮 五錢

再可考

產室○右為細末每服二錢童便入溫酒調下  
黃芪湯治產後虛汗不止

黃芪二錢

白朮

防風

熟地黃

牡礪粉煨

白茯苓

麥門冬

炙甘草各五分

方○右細切作二服加大棗一枚水煎服  
增損四物湯治產後陰虛發熱或日間明夕暮發寒熱

當歸

川芎

生地黄

柴胡各等分

右細切每服五錢水一盞半煎至一盞溫服

方○四物一黃散治產後腹中血塊作痛

當歸

川芎

熟地黃

白芍炒各五錢

蒲黃錢半

右為細末每服二錢空心溫酒調下

○產寶黑龍丹治產後一切血瘀垂死者但灌藥得下無有不



安者

五靈脂

生地黄

當歸

川芎

高良姜

各二錢

右細切

用砂窩（鍋）

一箇盛藥外以赤石脂為細末醋調封縫

又以紙筋鹽泥固濟文武火煨過置地上出火毒研細入

後藥

硫黃 一錢半

花蕊石

另研

乳香

另研

琥珀

另研

右同前藥共為細末

醋糊為丸如彈子大

每服一丸用生

姜自然汁無灰酒各一合重便半盞合和將藥於炭火上

燒紅投入姜酒內研散頓服立效

○

烏金散治產後血迷血運敗血不止淋瀝不斷臍腹痛

頭自昏眩多汗無力及治崩中下血不止

麒麟竭

亂髮

洗

炭水

松墨

煨醋

百葉霜

當歸 去芦

肉桂 去粗皮 赤芍

延胡索

鯉魚鱗 燒存性

右各等分為細末每服二錢溫酒調下

產

○調經散治產後虛浮蓋敗血乘虛停積府藏流注肌肉腐

壞成水令人面目四肢浮腫切不可用導水泄利之藥是

謂重虛其虛多致天亡以藥主之

沒藥 一錢

琥珀 一錢

桂心

赤芍藥

當歸 各一

細辛

射香 五分另研

右為細末每服一錢七葉汁溫酒童便和調服之

產

○正腥散治產後通身浮腫及治婦人太病後脾氣虛弱中

滿腹脹等病

蓬莪朮

香附子 童便 茴香

甘草炙

陳皮



右各等分為細末每服二錢灯草末通湯下

良方○栢子仁散治產後譫言妄語皆心血虧欠心神不守所致

栢子仁

遠志

去心

人參

去芦

桑寄生

防風

去芦

琥珀

另細研

當歸

熟地黄

甘草

查

右各等分細切每服五錢先用白羊心一枚而子煮汁二

盞煎藥至二盞去羊心及粗溫服不拘時

方○琥珀散治產後瘀血攻心迷悶妄言見鬼

琥珀

欬粉

各一錢

人參

茯神

生地黄

阿膠珠

各七錢半

硃砂

五錢

甘草

射香

各一錢另研

右為細末和勻每服一錢用金銀煎湯調下

方○交感地黄煎丸治產後舌強不語眼見黑花或發狂見鬼

及胞衣不下心腹脹滿等症

生地黄

新搗

生薑

各二片

各用石臼杵細以布

當歸

去芦

延胡索

炒

蒲黃

炒香

琥珀

另研

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸煎當歸湯化下

食前服

局○七珍散治產後不語

人參

石菖蒲

川芎

熟地黄

各一兩

細辛一錢

防風

五錢去芦

右為細末每服一錢匕薄荷湯調下不拘時服

局○調中湯治產後瀉利臍腹疼痛六脉沉細

高良姜

當歸

桂心

白芍

附子

炮去皮

川芎

各一錢

甘草

炙五分

右細切作一服加生薑五片水一盞半煎至一盞溫服



方局

○定痛散治產後惡血不止腹中作痛

當歸

芍藥 各二錢 肉桂 一錢

右細切作二服酒水合一盞半生薑五片煎至三盞服

○麻仁丸治產後大便秘結

麻仁 去壳

枳殼

人參

大黃

當歸 各八分

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九丸白湯下

通漸加丸數以便潤為度

方局

○羊肉湯治產後腹中虛痛氣血不足羸弱力倦及寒月中

生產寒氣入於產門臍下脹滿手不可犯以寒疝也此藥

主之

此方乃張仲景之方曾試極驗

精竭羊肉

四兩

當歸

二兩

生薑

一兩

陳皮

二兩

右細切用米三碗酒一盞煎至二碗去粗分二服加葱薑

亦可

方局

○滋腸五仁丸治產後血氣虛損大腸閉澀傳道艱難

杏仁

夫皮夾  
燒一錢

桃仁

如上一兩  
各一兩

柏子仁

五錢

松子仁

二錢半

郁李仁

燒一錢

橘紅

研末  
四兩另

右五仁另研為膏入橘皮末和勻再研煉蜜丸如梧桐子

大每服二十九加至五六十丸食前清米飲下三方加當

歸梢五錢

方局

○固經丸治產後血氣未復而有房事及勞役損傷致血暴

崩或淋瀝不止

沒藥

赤石脂

補骨脂

木賊

各半兩

附子

一隻炮去皮臍

右為細末米糊為丸如梧桐子大每服二十九溫酒下或

陳米飲下

○熟乾地黄散治症同前亦治婦人一切崩中下血不止頭目



沉重

熟地黃一分半 甘草一分半 蒲黃炒黑色五分 白茯苓五分

桂心二分半 阿膠一錢炒得鹿角膠充妙 蟹瓜微炒 白芍藥五分

伏龍肝七分 昆布一錢燒存性 當歸一錢

右細切作一服入竹茹一錢用水二盞煎至一盞溫服

○拒勝湯治產後腹脹滿悶嘔吐不定蓋敗血入於脾胃而脾

不能運化故胃不能納穀以致嘔吐腹脹等症

赤芍 半夏炮七 澤蘭葉 人參去芦

陳皮去皮各一錢 甘草炙一

右細切作一服加生姜三片水一盞半煎至一盞溫服

局 ○八味理中丸治新產血氣俱傷藏府暴虛躄弱多汗一百

日內常服壯氣補虛止嘔吐

人參去芦一兩 甘草炙一兩半 乾姜炮一 白朮二兩

砂仁 一兩 白茯苓 一兩 麥蘗麴 炒 神麴 炒 各一兩

右為細末米糊為丸如梧桐子大每服三十丸食前姜湯下有痰者宜加半夏麴

○旋覆花湯治產後感冒風寒咳嗽喘急痰涎壅塞坐臥不安

前胡 麻黃 去節 杏仁 炒 去皮尖 五味子

茯苓 甘草 炙 旋覆花 半夏麴

荆芥穗 赤芍 各半錢

右細切作一服加生姜三片大棗一枚水一盞半煎至一

盞去粗溫服

○四神散治產後留血不消積聚作塊急切疼痛下利不止

當歸 去芦 乾姜 泡 川芎 赤芍 各半錢

右為細末每服三錢溫酒調下

○當歸養血丸治產後惡血不散發熱腹痛及惡露不盡



腹堅脹兼治婦人室女經候不調赤白帶下腹脇疼痛

當歸去芦

赤芍

各四兩

牡丹皮

桂心炒

延胡索

炒各二兩

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九或酒或米湯任下

○猪腎子飲治產後蓐勞寒熱如瘧咳嗽頭疼自汗身瘦腹中疝痛

猪腰子

切作四片

當歸

白芍

各一兩

右以當歸白芍二味細切用冰三碗煮至二碗去粗將腰子切碎如骰子狀入煎藥汁內用晚粳米一合香豉一兩葱白五七根同煮糜爛空腹食之日進一服

產

○當歸黃芪飲治產後陰脫

○謂陰戶宮中脫下也

當歸

白芍

黃芪

人參各二錢

升麻 半錢

右細切作一服水煎溫服未收再服

產室 ○當歸散治婦人陰脫又名血癰

當歸 黃芩 白芍 各一兩 蟬皮 半兩 燒存性

牡蠣 煨二兩

右為細末溫酒或米湯調下忌食高熱重

產室 ○朮仁膏治產後陰疼煩悶

朮仁 五味子 枯礬

右為末研朮仁膏拌付

產室 ○硫黃湯治產後玉門不歛

硫黃 四兩 吳茱萸 鬼絲子 各一兩 蛇床子 一兩

右細切每服四錢水一碗煎湯頻洗之自歛

○婦人乳汁不通有二種有血氣壅盛乳脉滯而不行者有血



室產

氣虛弱乳汁絕少者夫虛者補乏用鍾乳粉猪蹄鯽魚之類盛者行乏用通草漏芦土瓜根之類方見于後

漏芦 二兩半 蛇退炙一條 土瓜根 十根切片炒焦

按土瓜當作王瓜 禮記月令四月王瓜生即與物也 其實好瓜萎而小如荔枝色黃藤蔓葉圓無缺者是

右為末每服二錢酒調下仍吃熱羹湯助之

室產

○鍾乳散治婦人氣虛血少脉澁不行乳汁絕少

鍾乳粉 細研

每服二錢濃煎漏芦湯調下

方屬

○母猪蹄湯治乳汁不通

母猪蹄一隻 通草 四兩

用水一斗煮取四五升取汁飲之未下更作一料服之



○丹溪活套云

新產不可用芍藥以其酸寒能伐發生之氣肝忌之只以黃芪四物湯為補虛之要藥以黃芪易芍藥是也○如氣虛者本方加參朮茯苓甘草發熱者加乾姜○自汗多者少用川芎勿用茯苓倍蜜炙黃芪○如口渴加五味子麥門冬○如腹痛者非芍藥不可雖新產亦用但以酒炒不妨○如惡露不盡作痛四物湯煎調香附五靈脂末服甚者加莖仁泥四五分○新產子宮未斂作痛名兒枕痛又名癰母塊痛用醋炒芍藥粟殼甘草水煎入少米醋或以三物為末醋湯調服酸以收之之義也○產後有惡血不生發寒熱成癰瘕者四物湯加三稜莪朮乳香沒藥香附五靈脂乾漆莖仁紅監花之類○產後腹痛不息宜四物湯加烏藥香附桂心高良姜陳皮童便和醋煎服甚效○產後月餘經血淋瀝不止



加白芷升麻調血餘灰○產後陰痛四物加藁本防風  
後通身浮腫四物加乳香沒藥桂心木通太腹皮高良姜血  
竭栝榔海金沙○產後子腸不收八物湯加升麻防風瀝以  
酒炒黃芪為君○產後中風口眼歪斜八物加附子荊芥少  
加防風羌活煎服

