


小兒科

醫國學正傳

卷之八





京本校正醫學正傳卷之八目錄

小兒科

論

又變蒸論

小兒脉法總論

三關脉法形狀

面上諸候形證歌

凡七首

外八段錦

凡十首

急慢驚門

十論

脉法

東垣治驚風論

東垣黃芪湯

錢氏安神丸

錢氏白朮散

急慢驚風方

又急慢驚風方

鎮驚丸

奪命丹

瀉仁丸

抱龍丸

宣風散

五福化毒散

鉤藤飲

溫白丸

丹溪方法

凡二條

東垣益黃散

二條

又治驚風方

又治慢驚風方

利驚丸

千金龍膽湯

金鉞丸

涼驚丸

杉本

發搐門二十六

男發搐

女發搐

早晨發搐

日午發搐

日晚發搐

夜間發搐

傷風發搐

傷食發搐

百日内發搐

補腎地黄丸

瀉青丸

道赤散

涼驚丸

益黃散

火青膏

牛黃膏

井露飲

白餅子

塗額法

浴體法

五癇門三十八丁

論五癇形症

五色丸

諸疳門四十九丁

論

地黄丸

安神丸

益黃散又名補脾散

木香丸

胡黃連丸

蘭香散

白粉散

如聖丸

香燐丸

蘆薈丸

治疳積腹大方

又治小兒疳方

祖傳經驗秘方

吐瀉門五

二十三

論

錢氏方法

木瓜丸

兒生三日內吐瀉

兒生三日至十日吐瀉

五月廿五日已後吐瀉

玉露散

六月五日已後吐瀉

六月十五日已後吐瀉

七月七日已後吐瀉

八月十五日已後吐瀉

吐瀉泄黃傷熱孔病

溫中丸

虛弱脾胃不和

吐瀉調脾平胃散

治吐瀉黃疸方

夏月吐瀉用益元散

極效說

附証

腹脹論

小兒腹虛脹方

又治腹脹方

腹脹搗氣丸

又腹痛方法

白餅子

腹痛傷食法

心腹痛方法

安虫散

白朮散

又治虫痛方

治蛇虫痛方

小兒吃粉腹痛方

又治小兒腹痛

小兒夜啼方

治夜啼花火膏

治小兒驚啼方

小兒風痰壅盛

小兒痰熱骨蒸方

又治前證方

小兒解顛方法

小兒吃泥方法

小兒脫肛方

小兒脫肛方

又治脫肛方

又治前証方

小兒赤瘤方法

白玉散

臍中汁出方

小兒癩頭方

又治癩頭方

丹溪醫按一條

小兒尾閭骨痛

小兒弄舌

瀉黃散

小兒龜胸

瀉白散

龜背

重舌木舌

又治前証方

又治木舌方

小兒口瘡方

鵝口瘡方

又治鵝口瘡方

又治小兒口瘡方

又口瘡方

小兒額上生瘡

小兒走馬牙疳

又治牙疳方

小兒臍風撮口方

痘疹門

六

三十論

丹溪方法總論

丹溪方法

凡三十二條

○痘瘡初發五藏形症一

○斑痘所發之源三

王氏惺惺散

升麻葛根湯

四君子湯

和中散

○辨形氣病五

四十丁

補肺散

解毒防風湯

當歸丸

十奇散

○辨三陰三陽經候六

四十二丁

連翹防風湯

升麻葛根湯

荆芥茸炒防風湯
理中湯

木香散

異功散

○辨三陽症治七

連翹升麻湯

犀角地黄湯

解毒丸

宣風散

百祥丸

○辨內外因四

○痘瘡五藏形色二

木香參蘇飲

紫霜丸

龐氏地黃膏

黃柏膏

玉露散

甘露飲子

猪心龍腦膏

○辨三陰証治法 八

調中丸

○辨形氣不足 九

芩歸湯

○辨表裏虛實 十

消毒飲

葛根升麻芍藥湯

活血散

白氣散

一物湯

百花膏

○平治諸方 十一

三荳湯

油飲子

鳳龍膏

錢氏惺惺散

解毒防風湯

四物解肌湯

○瘡出不快 十二

活血散加防風湯

龐氏紅花湯

紫草湯

四聖散

樺皮飲子

五積散

正氣散

調解散

辰砂五苓散

肉豆蔻丸

湯氏安斑湯

絲瓜湯

透肌散

阮氏萬全散

如聖湯

○辨外証輕重 十四

○辨外症逆順 十三

○辨初末形証 十五

○辨不藥而愈 十六

○辨五不治証 十七

○辨疹有陰陽二証 十八

○傷寒時氣發斑附 十九

玄參升麻湯

荆防敗毒散

化斑湯

龐氏石膏湯

陽毒升麻湯

○辨瘡後餘毒 二十

消毒飲

十六味流氣飲

必勝膏

蠅子水

五福化毒丹

如聖湯

雄黃解毒丸

黃連阿膠丸

駐車丸

快明散

密蒙花散

撥雲散

蛤粉散

祖傳經驗秘方

又痘後不大便方

○古人搔治痘瘡要法方論二十一

陷伏倒靨黑陷証

不換金正氣散

辟穢丹

再甦散

猪尾膏

白龍散

敗草散

馮氏天花散

罩胎散

獨聖散

安胎散

醫學正傳卷之八目錄終

新刊京本校正醫學正傳卷之八

花溪叵德老人虞一搏天民編集

姪孫守愚惟明校正

金陵三山街書坊松亭吳江繡梓

小兒科

論

嘗聞小方脉科古人謂之啞科最費調治誠哉是言也蓋以嬰
之流難問証難察脉耳抑且臟腑脆嫩而孟浪之劑與夫峻寒
峻熱之藥俱不可輕用試詳論之夫孺子之在襁褓中也內無
七情六慾之交戰外無木風木寒之相侵奚其幼科之疾若其
之繁且甚與抑考其証太半胎毒而少半傷食也其外感風寒
之証什一而已曰變蒸曰痘疹曰班爛曰驚悸曰風癇曰發搐
曰痰壅曰赤瘤曰白禿曰解顱曰重舌曰上諸証豈非孕

小兒吐瀉
足製
生麻白芍藥
黃白根甘草
活香陳皮
五味子生薑
○同前症若
吐瀉而慢
人白木茯苓
甘草木香
活香葛根
芍藥五味子
生薑各半

小兒吐瀉
 手足冷
 人多白木
 茯苓甘草
 陳皮半夏
 木香炒薑
 土
 月氣症
 嗽吐瀉
 足冷
 陳皮青皮
 訶子皮白朮
 言更肉三
 木香活香
 久

母不謹胎毒之所致與夫小兒之在胎也母飢亦飢母飽亦飽
 辛辣適口胎氣隨熱情慾動中胎息輒躁或多食煎燂或恣味
 辛酸或嗜慾無節或喜怒不常皆能令子受惠其為母者胎前
 既不能謹即產後又不能調護是以惟務姑息不能防微杜漸
 或未滿百晬而遂與醎酸之味或未週歲而輒與肥甘之物
 百病由是而生焉曰吐瀉曰黃疸曰五疳曰腹脹曰腹痛曰水
 腫曰瘡曰痢曰痰喘豈非飲食過傷調養失宜之所致與先正
 所謂古者婦人妊子寢不側坐不邊立不蹕不食邪味等語履
 有旨哉其餘飲食男女養胎幼幼之法必深得造化生生不息
 之意故古人多壽考兒少夭折者即以此由也嘗見今有稟性
 湯良之婦有娠不嗜慾縱口生子少病而痘疹亦稀亦可以為
 師法矣為兒醫者臨証之際宜察色觀容不可鹵莽如額赤知
 心熱鼻紅知為脾熱左腮青知為肝有餘右腮白知為肺不足

曰吐瀉而
 年足令
 人多自木妙
 步令甘平
 降皮冬平
 曰傷食吐瀉
 泉和寒
 葛根活香
 澤皮生薑
 五子冬平
 曰四肢逆冷
 脈數外寒
 內寒症也
 重劑芍藥
 枳實甘草

類白知為腎虛之類更參之以虎口三關之脈其小兒之病情
 斯過半矣傳曰幼吾幼以及人之幼仁人之心斯言其可忽諸
 又論變蒸

夫小兒之初生血氣未足陰陽未和臟腑未實骨格未全有變
 蒸之候每三十二日一發熱或吐或汗或呻吟不食或為長血
 脈全智慧之常候不須治而自愈按諸家所論皆謂乃小兒長
 骨脈臟腑與神智也自生之日始每三十二日一變凡人有三
 百六十五骨除手足四十五碎骨外正有三百二十骨自生下
 骨而上下日十骨三十二日乃為一變骨氣始全一變生一藏
 或下府十變則藏府始足每變發為虛熱諸証亦有胎氣壯實
 暗變而無發熱症者以骨節藏府由變而全胎毒亦因變而散
 也為兒醫者可不審乎
 脈法總論

○如按肥兒
黃連黃芩
神效
自來血
右凡用
小兒脾胃
虛寒手足
冷脈沉遲
而重者用
人參白朮
茯苓甘草
陳皮木香
炮薑綠皮
蘇木等下

按古法曰凡小兒證候難以手太陰尺寸脈診如一歲至六歲
曰嬰孩惟以男左女右手次指三關之脈以為驗病輕重死生
之訣第一節名風關無脈則無病有脈則病輕第二節名氣關
脈見則病重尚可以藥治而已第三節名命關脈見則病劇乃
九死一生之惡候也多不可治七歲八歲曰齡九歲十歲曰髫
始可以一指探掌後尺寸三部之脈而以一息七八至為無病
之常脈十一歲至十四歲曰童壯而以一息五六至為常脈也
數則為熱遲則為寒浮則為虛為風沉則為實為積為痛浮而
數者為乳癰驚悸虛而軟者為慢驚痰厥緊而實者為風癰牢
而革者為便秘沉而弦者為食積為腹痛緊而弦者為氣急為
風寒洪數者為熱伏結為傷食軟細者為蟲疳若氣促脈代散
亂無倫次者死在頃臾而不治也業幼科者其可不盡心於此
乎

1
尚大勢

有脉教

終

星

蓄

黃

活

右

小

疾

朱

萬

半

星

今將手指三關之脉繪圖分注開列于後



一風關易治

二氣關病重

三命關死候

三關青是四足驚 三關赤是水驚 三關黑是人驚

如有此三關通度脉候是極重之証必死餘並可治

山風關青如魚刺易治乃初驚之候也黑色難治

氣關青如魚刺主疳勞身熱易治

命關青如魚刺主虛風邪傳脾難治

風關青黑色如懸針主水驚易治

氣關赤色如懸針主疳病熱肺藏積熱尤為可治

命關凡有以脉不問五色皆是死候

又三關通度如懸針者主慢驚風難治

以紋看在上或面上或左右腮上或在左右臉邊其候

白根天麻

白雲山

中下至

○前生

葉而黃

葉柔五

自美吉更

可多冬

○二七

山兒痢疾

泉根

苗連

苗連

大人血利

至

「脉曲向裏者是氣痺

」羽曲向外者是風痺

「脉斜向右者是傷寒身熱不食無汗

」脉斜向左者是傷風身熱不食有汗

○雙鉤脉者是傷寒

弓三曲如長虫者是傷硬物 三

弓兩曲如鉤者是傷冷物

○脉下頭如環有獨脚者是傷冷

面上有赤點子必是再發之候

嬰兒頭面上或肚腹上有大脉併青筋如头者並是食毒物及

驚積難治

痰脉如亂虫是常痺亦有虫痺蛇症食積之症皆可治

凡脉微細不足者並是風氣俱宜消痺然後取虫積肥孩兒

正
小兒下利藥
陳皮 青皮
訶子 皮 甘草
木香 白朮
蒼朮 白朮

是良法也

△附湯氏察小兒神色總斷

○凡看小兒病，先觀形証，神色然後察脉。假如肝之為病，則面青；心之為病，則面赤；脾之為病，則面黃；肺之為病，則面白；腎之為病，則面黑。先要分別五藏形症，次看稟受盈虧，胎氣虛實，明其標本而治之，無不取效。

△面上諸候形証歌 五言

○痢疾眉頭顴驚風面頰紅，渴來唇帶赤，毒熱眼朦朧。

又 七言

○山根若見脉橫青，以病明短兩度驚，赤黑困疲時吐瀉，色紅啼夜不曾停。

又

○青脉生於左太陽，須驚一度見推詳，亦是傷寒微燥熱，黑青

知是乳多傷

又

○右邊青脉不須多有則頻驚恚奈何紅赤為風抽眼目黑青三日見閻羅

又

○指甲青蕪黑暗多唇青惡逆病將瘥忽作鴉聲心氣急以時端的命難過

又

○蛇虫出口有三般口鼻中來大不堪蛆或白虫蕪黑色靈丹縱服病難安

又

○四肢瘡痛不為祥下氣冲心蕪滑腸氣喘汗流身不熱手

胸臍定遭殃

△內八段錦

○紅淨為安不用驚。若逢紅黑便難寧。更加紅亂青尤甚。取下風痰病立輕。

○赤色輕微是外驚。若如米粒勢難輕。紅散多因乘怒亂。更加搐搦實難平。

○小兒初誕月腹痛。兩眉顰蹙盤腸氣。時啼哭又呻吟。如反自仰視者。天吊風也。

○小兒初誕月肌腠瘦。疳羸髮禿毛稀少。元因鬼王胎。

△外八段錦

○先望孩兒眼色青。次看背脊上冷。如水陽男搐左無妨。事搐右令人甚可驚。女搐右邊尤可治。若逢搐左疾非輕。歪斜口眼終為害。縱有仙丹也莫爭。

○眼中赤脉實難量。大數元來一不祥。最怕亂紋鋪日下。更嫌

赤脉貫瞳光。

○額門腫起定為風以候應知最是凶忽陷成坑如蠶足未過

七日命須終。

○鼻門黑燥渴難禁面黑唇青命莫存肚大青筋俱惡候更嫌腹有直身紋。

○忽見眉間紫帶青者來上便見風生青紅碎雜風將起必見疳癰氣形。

○亂紋交錯紫熇青急急求醫免命傾盛紫再加身熱熱須知藏府惡風生。

○紫少紅多六畜驚紫紅相等即疳成紫熇有形如米粒傷寒夾食証堪評。

○紫散風傳脾藏間紫青口渴是風癰紫隱深沉難治療風痰祛散命須還。

○黑鯉可治死還生紅赤傷寒痰積停赤青脾受風邪証青黑脾風作慢驚。

○紅赤連兮赤黃輕必然乳母不相應兩手忽然無脉見定知衝惡犯神靈。

急慢驚風

論

內經曰諸風掉眩皆屬肝木夫小兒八歲已前曰純陽蓋其真水未旺心火已炎故肺金受制而無以平木故肝木常有餘而脾土常不足也為父母者而有失於保養其或衣服寒暄不調以致外邪侵襲或飲食之飢飽失節以致中氣損傷是故急慢驚風之候作矣夫惟急驚屬肝木風邪有餘之証治宜清涼苦寒瀉氣之藥慢驚屬脾土中氣不足之候治宜中和甘溫補中

之劑若夫急驚之候因聞不常之聲或遇駭馬禽獸之鳴以致

。後證慢驚

頻吐沫

吉更白木香

活香陳皮甘

氣美妙

。陽證急驚

頻矢氣大驚

有下脈數

長子陳皮

香皮牽牛子

石香

右子

陽明

大黃枳實

面青口噤或聲嘶而厥發過則容色如故良久復作其自熱面赤引飲口鼻中氣熱大小便黃赤色惺惺不睡蓋熱甚則生痰痰盛則生風偶因驚而發耳宜用錢氏利驚丸瀉青丸抱龍丸宣風散五福化毒丹等藥慢驚之証多因飲食不節損傷脾胃以致吐瀉日久中氣大虛而致發搐發則無休止時其身冷面黃不渴口鼻中氣寒大小便青白昏睡露睛目上視手足瘳癱筋脉拘攣蓋脾虛則生風風盛則筋急俗名天吊風者即此候也治宜東垣黃芪湯錢氏釣藤丸溫白丸丹溪參朮湯送下硃砂安神丸之類錢氏謂急驚為無陰之証因心經實熱而陰不能以配陽是為陽盛陰虛之候也謂慢驚為無陽之証因脾土虛甚而陽不能以勝陰是為陰盛陽虛之候也愚按小兒急慢驚風之証其虛實寒熱如天淵之隔故急驚者十生一死慢驚者十死一生俗鑒多不諳此理混為一途而治誤入多矣業切

濁飲之

小治喘咳

痰氣上攻

又吐涎涎

痰涎壅盛

咳嗽不止

瘦子大瘰

厚朴亦用

半隻當歸

南星甘草

又川芎

茯苓

加茯苓

卜石

但方內

用桂枝

用桂枝

○黃芪湯 治慢驚風之神藥也

類勿用寒涼之氣大禁涼驚凡風木旺必克脾胃當先實其土後瀉其木關孝忠編集錢氏方以益黃補土誤矣其藥有丁香辛熱助火火旺土愈虛矣青橘皮瀉肺金丁香辛熱大瀉肺與大腸脾實當瀉子今脾胃虛反更瀉子而助火重虛其土殺入無疑矣其風木旺証右關脉洪大堂中熱腹皮熱豈可以助火瀉金如寒水來乘脾土其病嘔吐腹痛瀉痢青白益黃散聖藥也今立一方先瀉火補金大補其土是為神治之法

黃芪 二錢 人參 一錢 甘草 煨五 加白芍 一錢

右細切作一服水一大碗煎至半盞去粗食遠服

上三味皆甘溫能助元氣甘能瀉火內經曰熱淫于內以甘瀉之以酸收之白芍藥酸寒寒能瀉火酸味能瀉肝而

大補肺金所補得金土之位大旺火虛風木何由而來勉
 王然後瀉風之邪○又曰夫益黃散理中丸養神丸之類
 皆治脾胃寒濕太盛神品之藥也若得脾胃中伏熱勞役
 不足之証及服熱藥巴豆之類致胃虛而成慢驚之証用
 之必傷人命夫慢驚風者皆由久瀉脾胃虛而生也錢氏
 以羌活膏療慢驚風誤矣脾虛者由火邪乘其土位故曰
 從後來者為虛邪火旺能實其木木旺故求剋土當於心
 經中以甘溫補土之源更於脾土中瀉火以甘寒更於脾
 土中補金以酸涼使脾土中金旺火衰風木自虛矣損食
 多進藥愈上藥是也

大興
作天

益黃散治胃中風熱
 黃芪二錢 陳皮 去白 人參 各一錢 白芍 七分
 生甘草 炙甘草 各五 黃連 少許

益黃散治胃中風熱
 黃芪二錢 陳皮 去白 人參 各一錢 白芍 七分
 生甘草 炙甘草 各五 黃連 少許

良法

四豆家

消兒咳嗽

陳皮青皮

訶子皮吉重

白果

尚兒內

止

黃木通

法

光

出

腹中

鋪

止

止

止

止

右為細末分三服每服用水一盞煎至半盞食前服

○錢氏安神丸治邪熱驚啼心疳面黃頰赤壯熱

麥門冬去心馬牙硝

白茯苓

乾山藥

寒水石

炙甘草各五兩砂一兩

龍腦

字

右為細末煉蜜為丸如芡實大每服半丸砂糖水磨化下

慢驚用參朮煎濃汁化下

○錢氏白朮散治積痛和胃生津止瀉頻瀉利將欲成慢驚風

者服之訣効

人參

白朮

木香

白茯苓去皮

甘草炙

藿香各一錢乾葛二錢

右細切分二服每服水一盞煎至半盞溫服○丹溪加山

藥白扁豆炒肉苳蓿煨各一兩用姜一片煎○若慢驚風

作加細辛天麻各一錢

全蝎三枚去

白附子

八分

陳皮青皮
訶子皮吉重
白木木香
肉豆蔻活香
冬下外加
良。於百級
陳皮青皮
訶子皮吉重
白木木香
肉豆蔻活香
冬下外加
○消見久鋪
吐屋謹
陳皮青皮
訶子皮細辛
吉重
杏仁白茯苓
五味子

同煎服不拘時候

○一方治驚風用母丁香一粒細嚼入中白少許以其母中指取血調擦牙上即甦

○急慢驚風發熱口瘡手心煩熱痰熱痰嗽喘並用湧法重劑用瓜蒂散輕劑用苦參赤小豆末以酸蘆汁調服吐之吐後稍定更用防風通聖散為末蜜丸服之間以桑葉乾為末米飲調服以平其風氣

○又方治急慢驚風

薄荷葉

寒水石

各半

青黛

白姜蚕

硃砂各一

全蝎二枚

炒

猪牙皂角

槐角

各半

右為細末灯草湯和乳汁調時時灌之

○又方治慢驚風子母俱服

加味和中散

人參

白朮

各一

茯苓

陳皮各五分

○ 羌活 獨活

人多 白朮 乾薑

活香 陳皮

神曲 麥芽

○ 消見 下利 不食

人多 白朮 乾薑

木香 陳皮

○ 消見 下利 不食

白朮 乾薑

○ 消見 下利 不食

白朮 乾薑

○ 消見 下利 不食

白朮 乾薑

○ 消見 下利 不食

甘草

薄荷 各二分半 夏

天麻 各七分

細辛

全蝎 去毒炒一枚

右細切作二服加姜二片水一盞煎至七分服

○ 鎮驚丸 鎮驚寧神退心熱夜啼化痰止咳

珍珠 一錢

琥珀

天竺黃

雄黃 各三錢

金鉞 十片

膽星 五錢

牛黃 二錢

射香 五分

硃砂 三錢半

右為細末麥麵糊為丸如梧桐子大每服五六丸薄荷姜

蜜湯化下

○ 奪命丹 治急驚不省人事目定直視牙關不開唇白或黑者

南星

半夏 各四錢 搗為末以生薑水新白者

巴豆 一錢

硃砂 四錢

金鉞

銀鉞 各十片

輕粉

射香 各五分

小兒疳積

表性

小兒

小兒

小兒

小兒

小兒

小兒

小兒

小兒

小兒

小兒

小兒

小兒

小兒

小兒

右為細末麪糊丸如黍米大每一歲兒一丸灯心湯化下

○利驚丸治急驚風神効

天竺黃二錢 輕粉

青黛各一錢 黑丑頭末半兩生用

右研勻煉蜜丸如梧桐子大一歲兒一丸二歲兒二丸五

歲兒三丸溫薄荷水下食後服

○瀉青丸又名瀉治肝熱急驚搐搦等証

羌活 川大黃溫希裏煨

川芎

梔子仁 龍膽草 當歸

防風去芦各等分

右為細末煉蜜丸如芡實大每服半丸至二丸煎淡竹葉

湯同砂糖溫水化下

○抱龍丸治傷風瘟疫身熱昏睡氣麓風熱痰實壅嗽又治驚

風潮搐及蠱毒中暑沐浴後並可服壯實小兒宜時與服

之則免痰熱驚悸之証

尚見傷食

吐瀉腹痛

吉更和

葛根活香

陳皮木香

氣薑薑

右後出

尚見

目思

當飯

枳實厚朴

白木陳皮

黃連木通

右小末

炎用妙

雄黃二錢半

天南星

射香

右為末

作三服

伏暑用

甘草和

沸去皮

拍破用

徐研之

○千金

諸疳驚等証

單龍膽

釣鈎藤

辰砂

天竺黃

如皂子

三五九

送下

臘月

用雪水

煮

三五

兩用

甘草

二兩

半

徐

天竺黃

一兩

取研

秤四兩

星

不反

膽

星

不

反

膽

星

不

反

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

良曰方

當散地黃

白木黃連

木通各半

若取下八

訓子皮如

小兒赤白痢

疾六八世

白木根木

苗連

右中

是日湯食

減益黃者

三夏

卷之八

十一

桂枝

蟪娘六枚

古細切用水一升煮至五合徐徐服之

○宣風散治急驚風搐搦不定

枳榔二枚

陳皮

甘草各五錢黑丑四兩半

右為細末二三歲兒蜜湯調下半錢已上一錢食前服

○五福化毒丹治急驚風痰熱搐搦等証

桔梗微炒

玄參

洗焙各六兩

青黛

牙硝

枯各二兩

人參三兩去芦

茯苓

去皮五兩

甘草粉一兩

銀鉞

末八片為

金鉞八片為末射香五分另研

右為細末入研藥拌勻煉蜜丸每兩分作十二丸一歲兒

每二丸分四服用薄荷水化下瘡疹餘毒上攻口齒涎血

臭氣以生地黄自然汁化二丸以鷄翎刮口內

用子妙

小兒疳積

會隔塞

胸不

陳皮

訶子

白根

小兒

氣

黃芩

瘦脈

食

陳皮

訶子

吉更

○金鉞丸治急慢驚風痰涎壅盛

半夏湯泡七次

雄黃

龍腦

天南星煨製

硃砂各二錢

射香各半錢

白附子泡

生犀一錢為末

金鉞二十片

防風去芦各半兩

右為細末姜汁調麵打糊為丸如麻子大每服三五丸至

一二十九人參湯下慢驚去龍腦

釣藤飲治吐利脾胃氣弱虛風慢驚

釣鈎藤半錢

白姜蜜炒

麻黃去節二分

蟬蛻

天麻

川芎一分半

防風去芦

人參

蝎尾去毒炒各二分

甘草多一分半

右為細切作二服水一盞煎至六分溫服量入大小加減

○溫白丸治小兒脾氣虛弱瀉泄瘦怯冷痺洞泄及吐瀉久病

立

○傷風發搐，口中氣出熱，呵欠煩悶，手足動搖，當發散，大青膏。

白木香散
 黃連散
 白根吉更
 白果并吳
 久日下也
 陰虛火動
 勞瘵論
 有自發
 當服散
 芍藥散
 白美散
 茯苓散
 陳皮散
 若痢下
 菓子散

主之小兒稟賦素怯者多病以

○傷食發搐身熱溫多睡多唾或吐不飲食而搐當先定搐搐

退用白餅子後服安神丸

○百日內發搐有真假二証真者不過三二次必死假者發頻

不為重真者內生驚癇假者外傷風冷蓋血氣未實不能

勝邪乃發搐也吳知假者口中氣出熱也治之宜發散大

青膏王及用金釧法與沐躰法

○補腎地黄丸 見齊病門 瀉青丸 見前驚風門

○導赤散治心熱

生乾地黄 水通 甘草炙各等分

右細切每服三錢水一盞入淡竹葉七片同煎至半盞食

後溫服三方無甘草有黃芩

○涼驚丸 方見前 益黃散 方見齊病門

良。少兒寒人毛
咳嗽性三

脈大ノ厚力

人ノ白木

寸多子陳皮

老花根

少兒性

吐瀉スル妙

朱母

萬根

陳皮

生薑

治

濃漬

可子

良。少兒寒人毛

咳嗽性三

脈大ノ厚力

人ノ白木

寸多子陳皮

老花根

○大青膏治小兒傷風吐瀉心溫作涼作熱

天麻

青黛各一錢

白附子一錢半

蝎尾

烏蛇肉焙乾硃砂

天竺黃

射香各一字

右為細末生蜜和成膏每服半皂子大或一皂子大月中

兒粳米大同牛黃膏溫薄荷水化一處服之五歲已上同

甘露飲服以鐵本有天麻無大青按

○牛黃膏治熱及傷風壯熱引飲

雄黃

甘草

甜硝

寒水石錢半

右為細末和勻蜜和成膏薄荷水化下半皂子大食後服

○耳露飲治心胃熱咽痛口舌生瘡併瘡疹已發未發皆可服

又治熱氣上攻牙齦腫牙齒動搖含漱併服方見痘疹門

○白餅子餅子又各玉治小兒腹中有癖但飲乳嗽而生痰

滑石

輕粉

半夏

湯泡七次

南星各一錢

木道

○秘旨

人參半其又

建扶甘草

當取陳皮

乃安樂耳

嚴東仁

○秘製保嬰湯

今泉

蘇子甘肅

陳皮當歸

月夢草集

黃

卷之四

賜安便秘

巴豆二十粒 黃水盡 為度去皮膜 用水三升 升

右研勻巴豆後入衆藥以糯米飯為丸如菴豆大押作餅
子三歲已上兒三五餅已下一二餅煎薄荷湯下臨卧服

○塗顙法

射香

蜈蚣末

牛黃末

青真末字一

蝎尾去毒為末五分薄荷葉五分

右同為細末研勻熱棗肉劑為膏新綿上塗勻貼顙上四方可出丁指許火上炙手頻熨百日裏外兒可用此及浴法

○浴體法治肥胎併胎怯胎熱

烏蛇肉酒浸末白礬

青黛各二錢

天麻

蝎尾去毒為末 硃砂各五分

射香一字

右同研為細末每服用三錢水三碗帶葉煮披下握同煎

脾田用美桂
 黃連香甘草
 少夜子百香
 陳陳而仇
 源勝正金壽
 疫建安李博
 大九用妙之
 人參白木
 法冷甘草
 陳皮半食
 神曲三三升
 桑寄生子
 之三一
 傷食下利
 人參白木
 法冷木香

至斗數沸溫熱浴之勿浴腎

伍癇三

○凡治小兒五癇皆當隨臟治之每臟各有一獸所屬如犬
 癇反折上竄大叫肝也○牛癇目直視腹滿牛叫脾也○
 雞癇驚跳反折手縱雞叫肺也○猪癇如戶吐沫猪叫腎
 也○羊癇目瞪吐舌羊叫心也○伍癇重者死病後甚者
 亦死治法並用五色丸主之

○五色丸

硃砂另研 珍珠末 硃五 水銀二錢五分 雄黃一兩 一作
 黑鉛二兩 同水銀 按用黑鉛二兩 為是無疑矣
 右煉蜜丸如麻子大每服三四丸煎金銀薄荷湯下

杞子

宿沙

冬

青肺湯

四時感冒

陳皮

茯苓

川芎

防風

白朮

黃芩

小兒

咳嗽不止

當歸

黃連

白芍

細辛

止。當兒四日。凡
製有哮喘

不止。至妙

外。麻方。系

苜蓿根。活香

陳皮。蘇子

寸。平。中

生薑。曲。如。生

消。心。傷。食

利。二。後。木。香

白。木。枳。實

葛。根。黃。連

五。味。子。小。人

芍。藥。加。凡

諸疳証四

論

內經曰：數食肥令入，肉熱數食甘令入中滿。蓋其病因肥甘所致，故名曰疳。若夫襁褓中之乳子，與四五歲之孩提，乳哺未息，胃氣未全，而穀氣尚未充也。父母不能調攝，惟務姑息，舐犢之愛，迷令恣食肥甘，與夫瓜果生冷及一切烹飪調和之味，朝飧暮食，漸成積滯膠固，以致身熱脾瘦，面色痿黃，或肚大青筋，或吐瀉，後以藥正之，致脾胃虛損，亡津液而成。蓋以証實由愚醫之所害耳。斯言也，特下端耳，未可悉以為然。其所謂木病吐瀉，豈非飲食之所致與？夫仲陽為兒醫之祖，豈有誤耶？其所論諸疳形証治法，斑斑可數。學者不可不審。如疳在肝，則膜遮睛，法當補肝，地黃丸主之。疳在心，則面頰赤，身體壯熱，法當補心。

○消見大人
痰中焦
隔中
氣上喘
亂上至妙
厚上相
花子黃連
半其多
方內
大加用
方內
二

安神丸主之。疳在脾則脾黃腹大，好食泥土，法當補脾益黃散。主之。疳在肺則氣喘，口鼻生瘡，亦當補脾益黃散。主之。以虛者補其母也。疳在腎則極瘦，而見生瘡，亦法當補腎。地黃丸主之。筋疳則瀉血而瘦，當服補肝地黃丸。骨疳喜卧，冷地當服補腎地黃丸。內疳則目腫腹脹，利色無常，或沫青白，漸而瘦弱，以冷証也。宜服木香丸。外疳鼻下赤爛，自揉鼻頭有瘡，不結痂，連目而生，當用治瘡爛蘭香散。白粉散等藥。法曰：諸疳皆依本藏而補其母，則子自安。假如日中潮熱，是心經虛熱也。肝為心之母，宜先補肝，肝實而後瀉心，心得母氣則內平，而潮熱愈矣。餘皆倣此。大抵疳病當辨冷熱肥瘦而治其初病者為肥熱，疳久病者為瘦冷，疳冷則用木香丸，熱則當用胡黃連丸。冷熱疳並宜用如聖丸之類。惟小兒之府藏柔弱，不可痛擊，太下必亡津液，而成疳証。為兒醫者常當以幼幼之心為心，而善調之，毋縱巨膽。

○治兒脾虛

咳喘大兒

入少白木苓

甘草陳皮

半其葛根

熟地黃

又黃芩

咳不止

桑葉

○治兒草

○治兒草

○治兒草

○治兒草

○治兒草

○治兒草

妄為施治以絕人之嗣續其

脈法並見前總章

方法

○地黃丸補肝腎

治肝痺白膜遮睛筋痺瀉血腎痺身瘦瘡疥

骨痺喜卧冷地又治胃怯不言解頤小兒年長不能行者

專服神効

熟地黃酒洗

牡丹皮

山茱萸

白茯苓各三錢

乾山藥

澤瀉

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大三歲以下兒三九至五

丸熟水空心化下年長者量增丸數

○安神丸治邪熱驚啼心痺面黃頰赤壯熱方見驚風門

○益黃散又名補脾散治小兒脾胃虛寒脾痺躄黃腹大好食

泥土肺痺氣喘口鼻生瘡等証

小兒因大人
 喘咳病之症
 人多果茶參
 甘草陳皮
 半其又吉更
 柔白杏仁
 前乃又少泡
 傷風咳嗽
 痰盛吐痰
 喘脹面赤
 胃弱氣虛
 口苦舌乾
 肝火上升
 足冷腹痛
 青白痢疾

陳皮一錢 青皮 訶子皮 甘草 炙各五升
 右作二服細切水一盞煎至六分溫服愚每於本方加

木香丸治瘦冷痺
 射香一錢 續隨子去油 木香 青皮
 肉苳蔻 檳榔各二錢 蝦蟇大吐者一各膽酥俗作
 右為細末煉蜜丸如棗葢大每服三五丸至一二十九丸薄
 荷湯送下

胡黃連丸治肥熱痺
 胡黃連 宣黃連各半 硃砂 二錢半另研
 右為細末和勻填入續隨子膽肉用淡漿煮以杓子如銚子
 上用線釣之勿著底候一炊時取出研入苧薈射香各一
 分飯丸如麻子大每服五七丸至一二十九丸米飲下○丁
 方去足蝦蟇半兩焙乾不燒

人々白果
茯苓甘草
陳皮厚子
苦練皮下

○山嵐瘴氣
目創畏
明所經
寒火
渴清丸
甲子渴之
久病
目創畏
明所經

○蘭香散治外痔鼻下赤爛

蘭香葉燒存性二錢 銅青

輕粉各半錢

右為細末乾附之

○白粉散治痔瘡

烏賊魚骨末一匙 白芨末三匙 輕粉一匙

右為件和勻先用清漿水洗瘡拭乾付之

○如聖丸治冷熱痢瀉

史君子去壳 胡黃連 川黃連

白蕪荑去皮炒 射香半錢 乾蝦蟇五箇酒

右為細末以蝦蟇膏和丸如麻子大二三歲兒五七九已

上十九至十五丸入參湯下不拘時服

○香蟾丸治痔消食積虫積肉積及治腹脹大

三棱 蓬莪朮 青皮 陳皮 神曲炒

也見之
地黄丸
用之
腎補
症

麥藥麴炒

草龍膽

棋榔錢五

木香二錢

川練子

去核

史君子

胡黃連

川黃連

各四錢

白朮一兩

乾蟾五箇

右以白朮以上藥俱研為細末以乾蟾用醋煮爛成膏和藥如乾再加醋糊為丸如麻子大每服十五丸清米湯送下

○荊薈丸治小兒疳氣腹脹骨熱

荊薈

木香

棋榔

各二錢

蝦蟇酒浸炙

黃連

各一兩

蕪荑去皮

青皮

陳皮

各五錢

巴豆

三七粒

炒去壳同

右為細末猪膽汁丸如小豆大二歲兒三十丸米湯下

○又方治疳積腹大

胡黃連

去穢子積一云

阿魏

醋浸去

肉寸

香

當門子

川黃連

炒去熱積又去酒積

神麴

炒去食積各一錢

右為細末猪膽汁和

如麻子

大每服三十丸白木湯送

下○一方有蘆薈半錢

○又方治小兒疳病

黃連

白木

山查肉

各五錢胡黃連

芎藭

各二錢

蕪荑

二錢五分

神麴

二升

右為細末猪膽汁為丸如麻子大量兒大小加減丸數與

之

○祖傳經驗秘方換柳丸小兒疳病積氣成塊腹大有虫等証

其効如神

換柳

一兩

三稜

煨去毛

蓬莪朮

醋炒各半兩

青皮

去穢色炒

陳皮

去白半兩

蕪荑

二錢半

雷丸

去壳五錢

鶴風

三錢

乾漆

五錢

木香

二錢

良姜

二兩

陳壁

砂仁

一錢

麥蘖麪

五錢

胡黃連

三錢

甘草

炙三錢

神麪

五錢

黃色炒

山查肉

五錢

右為細末醋糊為丸如黍豆大每服三五十九空心淡姜湯送下

治吐瀉

人參白朮木香

活香陳皮

白朮

白朮

白朮

白朮

白朮

白朮

白朮

吐瀉五

論

內經曰諸嘔吐暴注下迫皆屬於熱又曰濕勝則濡泄夫小兒之吐瀉皆由乳食過度傳化失常蓋食鬱則成熱熱鬱則成酸酸而成吐成瀉以必然之理也又曰食滯於胃口者為吐食滯於大小腸者為瀉有生下而遂吐不休者胞胎中穢惡流於腸胃而為吐也丹溪曰錢氏五補五瀉之法俱可選用謹遵而依法具錄如左

脈法

方法

錢氏曰小兒初生下吐蓋拭掠兒口中穢惡不盡嚥入喉中故吐木瓜丸主之

九生子於未發聲之先急宜取口中惡血以補拭令淨後以黃連甘草二味等分煎汁灌之聲一二匙則無已上等病出痘疹亦稀少若帝一發則熱下矣亦當用黃連甘草汁飲之

○同前性治

腹痛脈數者宜之

陳皮青皮

訶子皮甘草

木香活香

枳殼

○治兒表寒

裏虛年

足寒有汗

息了了利

下

米麻芍藥

不可忽也

○木瓜丸

木瓜末

木香末

射香末

膩粉即輕粉也

栴櫚末各一字

右再研勻麴糊為丸如黍米大每服三二丸甘草湯送下

○初生三日內吐瀉壯熱不思乳食太便秘乳食不消或白色知

是傷食當下之而後和胃下用白餅子和胃用益黃散二

方俱見前

初生三日已上至十日吐瀉身不熱或乍熱乍涼不思乳食

大便青白色乳食不消以上實下虛也更有五臟兼見証

宜詳○肺病則睡中露睛喘氣○心則驚悸飲水○脾則

困倦饑睡○肝則呵欠頓悶○腎則不語畏明當先見貌

燕藏補脾益黃散主之○此二証多病於夏秋也常先見

百白根草
 活香陳皮
 乳養
 曰性大
 瘡未出前
 大製有妙
 蘇麻
 葛根
 活香白陳皮
 各
 日傷食與
 刺
 妙

其義未詳恐有脫
 簡以俟知者正之
 ○五月二十五日以後夏至後吐瀉身壯熱此熱乃藏腑中十
 分中九分熱也或因傷熱乳食吐乳不消瀉深黃色玉露
 散主之
 ○玉露散一名甘露散

石膏 寒水石 各半兩 生甘草二錢半
 右為細末每服一字或半錢溫水調下

○六月十五日以後大暑後吐瀉身溫似熱臟腑六分熱四分冷
 也嘔吐乳食不消瀉黃白色似渴或食乳或不食食前少
 服益黃散食後多服玉露散

按丹溪用去桂五苓散倍白朮加蒼朮甚者二朮炒用或
 入益元散和勻米湯調下甚効
 ○七月七日以後立秋後吐瀉身溫涼三分熱也
 不能食乳多

白木 枳殼
 葛根 黃連
 芍藥 甘草
 月赤 白痢疾
 又下血 毛妙
 白木 當歸
 黃連 山花
 肉桂 甘草
 芍藥 枳殼
 年下
 日久 渴妙
 陳皮 青皮

似睡悶亂，噎氣長出氣，睡露睛，唇白多噦，欲大便不渴食，前多服益黃散，食後少服玉露散。

八月十五日以後，秋分吐瀉身冷，無陽也不能食，乳乾噦瀉，青褐水當補脾黃散，主之不可下也。

吐瀉泄黃傷熱乳也，吐瀉瀉青傷冷乳也，皆當下白餅子主之。傷熱乳者，玉露散傷冷乳者，益黃散。溫中丸並於下後服之，亦有不須下但服此藥愈者。

溫中丸

人參 甘草多 白朮各一兩

右為細末，薑汁麴糊為丸，如菴豆大，每服一二十丸，粳米飲下。

虛弱脾胃不和，不能食乳，致肌肉消瘦，亦有因大病後或吐瀉後，脾胃尚弱，不能傳化穀氣也，有冷者，時時下利，唇白青。

訶子肉豆蔻

乳姜蘇

桔梗

冬下

日屋勞

人參白朮

茯苓

木香陳皮

冬下

日不合

瘦倦

白有熱者身溫壯熱肌肉微黃此冷熱虛羸也冷者木香

左夏月不可服如有熱者胡黃連丸冬月不宜服木香丸

胡黃連丸二方並見前

○吐瀉調脾平胃散入熟蜜和蘇合香丸名萬安膏米飲調服

○一方治吐瀉黃疸

三稜

莪朮

青皮

陳皮

神麴

麥蘖麴

黃連

甘草炙

白朮

茯苓各等分

右為細末溫水調服傷乳食吐瀉加山查時氣吐瀉加滑

石發熱加薄荷

○夏月吐瀉用益元散極効當表而出之

△附證

愚按小方脉科惟急慢驚風與夫痘疹等症最為酷疾以

子

熱

四痰蒸

八脫肛

十二尾骨痛

八肱風擗口

四十歲腦故金入

夫腹脹由脾胃虛氣攻作也亦有實者必悶亂喘滿可下之宜

用紫霜丸白餅子不端滿者虛也不可下若誤下致脾虛氣

上附肺而行肺與脾子母皆虛肺主目胞腮之類脾主四肢

母氣虛甚則目胞腫也色黃者屬脾也治用撮氣丸補消

木香活香

肉豆蔻根

右二下

日時氣不

足之腫氣

有陳皮

人多白木

茯苓甘草

木香活香

枳實

日時氣弱

不令長元

之未愈漸加丸數不可以丁香木香桂皮荳蔻大溫散藥治

之蓋脾虛氣未出腹脹而不喘者可以溫散藥治便上下分

消其氣則愈也若虛氣已出附肺而行則脾胃內弱每生虛

氣入於四肢面目矣小兒易為虛實脾虛不受寒溫服寒則

生冷証服溫則生熱証當識以不可也胃久虛熱多生疽病

或引飲不止脾虛不能勝溫隨肺之氣上行於四肢若冰狀

濕氣浸浮於肺則大喘也以當服擲氣丸而愈

○擲氣丸治小兒虛脹如腹大者加蘿蔔子名褐丸子

胡椒一兩 蝎尾去毒半兩 一方二味各四十九箇

右為細末麵糊為丸如粟米大每服五七丸至一二十九丸

陳米飲下不拘時○一方有木香一錢

○治小兒腹虛脹先服擲氣丸不愈腹中有食積結糞小便黃

微喘脉伏而實時欲飲水能食者可下之宜消積丸紫霜

人多白果

茯苓

白朮

白朮

白朮

白朮

白朮

白朮

白朮

白朮

白朮

白朮

○方腹脹
九蓋肺初虛而後結有積所治宜先補脾而後下之後又
補脾則愈也不可補肺恐生虛氣

蘿蔔子

紫蘇梗

乾葛

陳皮 各等分

甘草 少許

右為切水煎服食少者加白朮

○腹痛多是飲食所傷

白朮 一錢半

陳皮 去白

青皮 去穰 各七分

神麴 炒

麥芽 炒

砂仁 各一錢 甘草 炙五分

有寒加藿香吳茱萸

有熱加黃芩

右為細末每服一錢七分清米飲或白湯調下

○腹痛口中氣溫面黃色目無精彩或白睛多及多睡畏食或

大便酸臭者當磨積宜消積丸甚者用白餅子下之後和

茶不進食

人々白木

茯苓

陳皮

右是之要

同納熱煩渴

石香知母

痘出後內熱煩渴

人々

甘草

同傷食

脈遲

吐瀉不止

胃用白水散

○白餅子 方見發搐條下

○白朮散 方見驚風門

○消積丸

丁香九粒

砂仁十二箇 巴豆二箇去皮心

右為細末麪糊為丸如黍米大三歲已上三五九已下二

二九溫水下

○心腹痛面皸白口中沫沫及清水出發痛有時當作蛇虫治

又曰凡積痛食痛寒痛虫痛大同小異惟虫痛者當只淡

而沫自出小兒本怯故胃寒冷故虫動而心頭痛與癰畧

相似但目不斜而手不搐耳安虫散主之

○安虫散 寶鑑用孝糊為丸各安虫丸
黃粉炒黃色 檳榔 川練子 去核 鶴風 各二兩

次、建製有
 咽氣渴不
 陳皮青皮
 訶子皮土黃
 白木活香
 木香杏仁
 冷咳嗽不止
 肉豆蔻炒善
 五味子少乾
 下利不為
 炒乾美切

白礬一錢半火枯

右為細末每服一字大者五分或一錢溫米飲送下臨痛
 時服

○集効九治虫痛

木香

鶴風炒

檳榔

訶子煨去核

蕪夷

附子去皮脂乾薑

大黃一兩半

烏梅去核二錢半

右為細末煉蜜丸陳皮湯下或醋湯下一方加黃芩黃連

一方治虫用雞子炒白蠟陳酒糊丸服一云殺寸白虫

一方治蛭虫作痛用二陳湯加苦練根煎服或只以苦練根

向東南生不出土者刮去麤皮取白皮細切濃煎汁

徐徐飲之不回飲多先以糖蜜或炒肉食之引虫頭向上

然後服之看兒大小斟酌與之

治六歲

曾腹痛

五痛

九痛

黃連

血氣活香

陳皮枳實

炙甘草

尚之嗽

白果當散

苗連花

白果根

○小兒吃粽腹痛用白酒藥加黃連末合研湯調服之即愈

○一方治小兒腹痛

甘草

乾姜各二錢 伏龍肝一兩

人參

茯苓

百草霜

白朮各五錢

右為細末粥丸如梧桐子大每服二十五丸陳皮湯下

○小兒夜啼作心經有熱有虛治

人參

黃連

甘草

竹葉

二十片

右細切分作二貼每貼加生薑一片水煎服之本無入參

○錢氏曰小兒夜啼者脾藏冷而痛也當以溫中之藥宜益黃

散及以法襪之花火膏之類一遇按上二說不同一日心熱

○花火膏

燈花三顆以乳汁調抹兒口或抹母乳上令兒吸之

○治驚啼邪熱寒心也安神丸主之方見前

乾姜甘草

五味子要之

但云云

上咳下利

又妙

小兒痰

疳積

要當飯脾瀉

茶黃芩水

神黃連

木通

白木

白木

中陳皮

○小兒風痰壅盛用

南星五錢切以白礬湯泡晒乾

白附子 二兩

右二件共為末麴糊為丸如芡實大每服一九姜蜜薄荷

湯化下

○小兒痰熱骨蒸用

二陳湯半兩

加升麻 二錢 葛根

白芍 各一錢半

人參

五味子三十粒

右細切分三貼加姜棗水煎服

○又方治前証用

胡黃連

栝榔 各一錢 陳皮

雷丸 各一錢半

神麴

半夏麴

史君子

白花蓼 各二錢

右為細末麴糊為丸如黍米大每服三五十九白湯下

○小兒解顛顛也

因母氣虛與熱多也錢氏曰生下而顛不

合腎氣未成也雖長必少突更有目白睛多面黃白色瘦

○治風有下
嗽不止
吉更細辛
仙根 茯苓
前胡 五味子
其根根
是之西時
ヨリ外至三
製有軟大
用吉
又諸此皆見
氣虛無
○內傷口氣
大不食
脉大緩者
胃氣凡

者多愁少喜也丹溪用四君子湯合四物湯有熱加黃連
酒炒煎服更以帛緊束及以白欬末付之

○小兒吃泥胃氣熱也用軟石膏黃芩陳皮茯苓白朮煎服

○小兒脫囊陰囊腫大墜下而不收木通甘草黃連當歸黃芩
煎服囊爛者以野紫蘇葉面青背紅者是為末香油調付皮脫兩

丸露者外以青荷葉包之付藥後自生皮

○脫肛肛門下也用陳壁土泡湯先薰後洗

○又方治前証用五倍子為細末付而頸托入之

○又方治前証用鬚頭燒存性香油調付一云以吳物燒烟

○小兒赤瘤俗名赤以蓋熱毒氣客於腠理搏於血氣發於皮

外赤如朱也用

生地黄

木通

荆芥一本有芍

若寒帶表之藥外以芒硝泡湯洗之又以芭蕉油塗之錢

每

其為胎毒也。謂其母孕時多食辛熱物。遂以入參連翹黃

少要

消脾胃

飲主法

泉 茯苓

陳皮半其

神曲麥芽

甘草

消熱有喘

利下脈數

陳皮青皮

訶子皮吉更

如白朮安細辛

消長病肉面

吐汗下之固

○尾骨痛屬陰虛有痰

連耳草陳皮川芎芍藥木通濃煎入竹瀝与之數日而安

陰虛用四物湯加炒黃柏酒知母少用桂為引或以前胡

木香為引如痛不止加乳香沒藥○痰用二陳湯加知母

黃柏澤瀉必用前胡木香為引蓋陰虛故痰盛也如痛不

正亦加乳香沒藥○二法必先以玉燭散或通經散痰小

胃丹大下後用之或神祐九十棗湯皆可與治帶同

小兒弄舌因脾藏有微熱令舌絡微緊時時虛舌

冷藥及下之少與瀉黃散徐七服之有欲飲水者非熱也

脾胃中津液少也不可下若大病後弄舌者凶

瀉黃散

藿香葉七分 梔子一錢 石膏五分 甘草七分半

防風 去芦四分

內外淫氣
根本竭手足
頂俱亡委已
多力用妙之
又長利下根
體虛之
人參黃芪中
白木甘草
當般陳皮
藥胡來森
肉桂但此
藥用護脈
河之遲行
陽虛外寒
陰虛內寒
陽虛外寒
陽虛外寒

有細切作一服用蜜酒炒香熟以水一盞煎至半盞去粗
時時黃之

○龜胸乃肺熱脹滿攻於胸膈即成龜胸又乳母多食五辛熱
物亦成此症宜鴻白散加黃芩

○鴻白散

桑白皮蜜水拌炒地骨皮一錢甘草炙五分加黃芩一錢

右作一服水煎

○龜背兒生下客風入脊逐於骨髓即成龜背治之以龜尿點

骨節即平○取龜尿法用蓮葉置龜於上尿自出

○重舌木舌乃小兒舌下生舌也

用三稜封於舌下紫脈刺之出惡血即愈

○又一方用竹瀝調蒲黃末付舌上神効

○又方治小兒木舌塞口欲滿者用紫雪二錢竹瀝半合細研

。治心食積

黃腫或黃

疽生スル

則土氣有餘

病ナリ 治法

蒼朮 厚朴

香附 陳皮

用テ土氣敷

阜ツ平青皮

甲ツ木氣有

餘ツ平神麴

麥芽如丁助

胃消積退方

黃之是則定

好法ナリ

均和勻頻付口即愈

○治小兒口瘡用鹽白梅燒存性紅棗去核燒鉛丹火飛

人中白火飛龍腦少許

右共為細末服之神効

○治小兒鵝口瘡因白屑滿舌及兩脰故名鵝口用髮纏指頭

蘸井花水拭口令淨用濃漿粟米汁以綿纏指頭拭之更

以煨過黃丹搽之即愈

○又方治鵝口瘡不能食乳用地鷄搗水塗瘡即愈地鷄即雞

磚石下

○治小兒口瘡瀉心湯用黃連為細末蜜水調服

○治小兒口瘡用黃栢細辛各等分為細末付之

○治小兒額上生瘡痛痒難忍用白楊木枝燒於刀上出煙付

之及治鵝口瘡神効

治小兒下利
 白礬炒
 黃丹飛
 京棗
 共為末付之
 又方治牙疳用白礬置於五倍子內煨過為末付之
 治小兒疳風撮口因疳斷傷風或尿在胸中遂成疳風發熱
 面赤啼聲不出名曰撮口風
 赤脚金頭蜈蚣一條
 瞿麥五分
 蝎稍四箇
 蠶蚕七箇
 右細末鵝毛管吹些少入鼻中如噴嚏叫聲可治後用蓮
 荷汁調與服之
 治小兒下利
 白礬炒
 黃丹飛
 京棗
 共為末付之
 又方治牙疳用白礬置於五倍子內煨過為末付之
 治小兒疳風撮口因疳斷傷風或尿在胸中遂成疳風發熱
 面赤啼聲不出名曰撮口風
 赤脚金頭蜈蚣一條
 瞿麥五分
 蝎稍四箇
 蠶蚕七箇
 右細末鵝毛管吹些少入鼻中如噴嚏叫聲可治後用蓮
 荷汁調與服之

治小兒下利
 白礬炒
 黃丹飛
 京棗
 共為末付之
 又方治牙疳用白礬置於五倍子內煨過為末付之
 治小兒疳風撮口因疳斷傷風或尿在胸中遂成疳風發熱
 面赤啼聲不出名曰撮口風
 赤脚金頭蜈蚣一條
 瞿麥五分
 蝎稍四箇
 蠶蚕七箇
 右細末鵝毛管吹些少入鼻中如噴嚏叫聲可治後用蓮
 荷汁調與服之
 治小兒下利
 白礬炒
 黃丹飛
 京棗
 共為末付之
 又方治牙疳用白礬置於五倍子內煨過為末付之
 治小兒疳風撮口因疳斷傷風或尿在胸中遂成疳風發熱
 面赤啼聲不出名曰撮口風
 赤脚金頭蜈蚣一條
 瞿麥五分
 蝎稍四箇
 蠶蚕七箇
 右細末鵝毛管吹些少入鼻中如噴嚏叫聲可治後用蓮
 荷汁調與服之

木香金鈴丸
 大人小兒疳積
 三外胃腫
 痛治之
 木香乳香
 沒藥大蘇子
 小茴香全蝎
 玄胡川練子
 人參各半
 右好藥研
 丸入每百
 丸分服
 見之十五
 丸之用

痘疹 六

論

內經曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火。夫小兒痘疹之證最為酷疾。不
 日之間死生反掌。蓋因胎毒藏於命門。遇歲火太過。熱毒流行。
 之年則痘毒因之而發作矣。一發則出於心肝脾肺四藏。而腎
 無留和者為吉。若初發便作腰痛見點則紫黑者多死。蓋毒氣
 留於腎間而不發越故耳。錢氏雖有百祥九大下之法。然活者
 十無一二。大抵痘瘡之法多歸重於脾肺二經。蓋脾主肌肉而
 肺主皮毛。故遍身為之斑爛也。其為証也宜發越不宜鬱滯。宜
 紅活凸綻不宜紫黑陷伏。瘡出之後醫者當察色詳証以辨表
 裏虛實用藥。其吐瀉不能食為裏虛不吐瀉能食為裏實。灰白
 色陷頂多汗為表虛。紅活凸綻無汗為表實。又諸痛為實。諸痒
 為虛。外快內痛為內實。外虛外痛內快為內虛。外實裏實而補

小兒痘疹
 甘草木香
 苗運當歸
 茯苓肉桂
 枳實陳皮
 右各等分
 若久生痘
 人少下子
 川芎紅花
 又婦人通
 白木桂心
 川芎和葱
 シカル
 味以反名
 杏仁湯云
 香附子青皮
 大黃小黃連

則結癰毒表實而復用實表之藥則潰爛不結痂也如表虛者
 瘡易出而難靨表實者瘡難出而易收裏實則出快而輕裏虛
 則發遲而重表實裏虛則陷伏倒靨裏實表虛則發慢收遲治
 之之法三日已前未見紅點必用升麻湯參蘇飲之類以發其
 表務令微汗為度若未汗如表猶未解雖累見紅點隱約於肌
 肉間而升散開發之劑尚未可除凡見出遲發慢者根窠欠紅
 活者便當憂慮調攝切勿袖手待斃夫古人用藥寒熱迥別主
 意不同醫者再宜臆度寒暄推詳運氣而治如陳文中之木香
 散異効散用了附姜桂等峻熱之藥而與內經病機不合丹溪
 特發揮其誤亦有用得其當者屢獲捷效若劉河間張子和輩
 悉用芩連大黃等寒涼之劑丹溪亦曰酒炒芩連各解痘毒依
 法用之而獲安者亦不少也今之醫者往往不同依陳氏而行
 者多用熱藥宗劉張而治者多用涼劑是故不偏於熱則偏於

宿砂三棱

桃仁地黄

乳香白芷

右加丁香

清自湯云

夜帝不乳

當飲之

吉更陳皮

人多甘

中下後

傷寒

聖訓

五子香

老人

寒以刻舟求劍之道也愚按內經有曰寒者熱之熱者寒之微者逆之甚者從之又曰逆者正治從者反治從少從多觀其事也陳氏用從治之法權也劉張用正治之法常也然皆不外乎參朮芪草歸苓芍藥等補氣血藥為主治焉亦當有時令寒熱緩急施治固不可執一見也楊氏曰痘瘡發於肌肉陽明胃氣主之脾土一溫胃氣隨暢決無陷伏之患湯氏曰如痘人籠蒸之法但欲其鬆耳潘翁呂復折衷衆說著方立論適中用藥寒熱攻補斟酌時宜未嘗執一治也學者能遵守其法而行之庶無一偏之患矣

○丹溪治小兒痘瘡方法凡三十條

夫小兒痘瘡大抵與傷寒相似發熱煩燥臉赤唇紅身痛頭疼乍寒乍熱嘔噎可欠喘嗽痰涎始發之時有因傷風傷寒而得有時氣傳染而得有因傷食發熱嘔吐而得有因跌撲驚恐畜

身痛用之
小兒疳積
葛根木通
葛根木通
葛根木通

血而得或為目窻驚搐如風之証或口舌咽喉肚腹疼痛或煩燥狂悶昏腫或自汗或下利或發熱或不發熱証候多端卒未易辨必須以耳冷尻冷驗之蓋瘍疹屬陽腎藏無証其耳與尻俱屬腎故腎之所部獨冷又不若視其耳後有紅脉赤綫為之真如此可以稽驗矣治療之法首尾俱不可妄下但溫涼之劑無而濟之解毒和中安表而已虛者益之實者損之寒者溫之熱者清之是為權度昔人有喻云於啗人籠蒸之法但欲其鬆耳蓋毒發於表如苟妄汗則榮衛益虛重令開泄轉增瘡爛由是風邪乘間變証者多矣毒根於裏如苟妄下則內氣益虛毒不能出而返入焉由是土不勝水變黑歸腎身軀振寒耳尻返熱眼合肚脹其瘡黑陷十無一生汗下二說古人深戒以此觀瘡疹証狀雖與傷寒相似而其治法實異傷寒從表入裏瘡疹從裏出表故也解肌之法葛根升麻紫蘇之類可也其或氣實

煩躁熱熾太便秘結則與犀角地黄湯入參敗毒散又或紫草
飲多服亦能利之故雖云大便不通者少與大黃丸宜仔細斟
酌不可妄用猛浪如小便赤澀者分利小便則熱氣有所滲而
出凡熱不可驟退但輕解之若無熱則瘡反不能發矣

○凡痘疹春夏為順秋冬為逆

○凡痘疹分人清濁就形氣上取勇怯

○凡痘疹但覺身熱証似傷寒疑似未明便當先與惺惺散或
參蘇飲熱甚者升麻葛根湯入參敗毒散若見紅點便忌
葛根湯恐發得表虛也

○凡痘瘡初欲出時身發熱耳尻冷呵欠咳嗽面赤必是出痘
之候便宜服升麻葛根湯加山查大力子其瘡出必稀少
而易愈

○凡痘瘡初出時或未出時宜服後藥多者可少少者可無重

者可令輕也方以絲瓜俗名天蘿近蒂三寸連皮子燒存性細研少糖拌乾吃八味砂尤妙○又方以硃砂一味為細末看兒大小或半錢或一錢蜜水調服亦云多者可少少者可無

○凡痘瘡發熱之時更以惡寶子為末蜜調貼額門上免眼障之患

○凡痘瘡初出之際須看胸前若稠密急宜服消毒飲加山查黃芩酒洗紫草減食者加人參

○凡痘瘡初出之時色白者便當大補氣血參朮芪芩升麻乾葛甘草木香丁香酒當歸白芍如大便泄加訶子肉豈蔻○凡痘瘡初起發時自汗不妨蓋濕熱薰蒸故也甚者當以參芪等實表之藥以防其難靨也

○凡痘瘡初起發時煩躁譫語狂渴引飲若飲水則後來靨不

○瘡急以涼藥解其標如益元散之類

○凡瘡瘡已出可少與化毒湯出不快者加味四聖散紫草飲子紫草木香湯快斑湯絲瓜湯之類

○凡瘡瘡出稠密甚者人參敗毒散犀角地黄湯

○凡瘡瘡疎則毒少密則毒甚宜以清涼之藥解之酒炒芩連之類雖數服亦不妨庶無害眼之患

○凡瘡瘡灰色白淨者作寒紫黑色者作熱湧者煩躁者作熱者黑屬血熱涼血為主白屬氣虛補氣為主中黑陷而外白起得遲者則相兼而治

○凡瘡瘡當分表裏虛實吐瀉少食為裏虛不吐瀉能食為裏實裏實而補則結癰毒陷伏倒靨灰白色者為表虛紅活凸綻者為表實表實而復實其表則潰爛不結痂也表虛不起發者或用燒人尿驗

○凡痘瘡須分氣虛血虛用補藥氣虛者人參白朮加解毒藥血虛者四物湯加解毒藥酒炒芩連各解毒蓋芩連為瘡以酒炒以制其酸寒之性獨存清涼解毒之能是故痘瘡之症當用以殺其毒耳

○凡痘瘡雖分氣血虛實未抵多屬氣血不足然當於不足中以別其優劣而以補氣血藥中分輕重為用以平為期耳有夾外邪而實者少加防風等藥

○大法活血調氣安表和中輕清消毒溫涼之劑兼而治之以平治之法也溫如黃芪當歸木香葦涼如前胡乾葛升麻葦佐之以川芎白芍枳殼桔梗蒼朮通紫草之屬則可以調適矣

○黑陷二種因氣虛而毒氣不能盡出者酒炒黃芪紫草人參等藥

○凡黑陷甚者亦用燒人尿別用無病小兒糞燒存性蜜水調

服一方用入猪猪大四錢於臘月燒灰名萬全散

○痒塌者於形色脉上分虛實實則脉有力氣壯虛則脉無力氣怯痒以實表之劑加涼血藥實痒如大便不通者以大黃等寒涼之藥少與之下其結糞氣怯輕者用淡蜜水調滑石末以鵝翎刷蒼上潤之

○瘡乾者宜退火止用輕清之劑荆芥薄荷升麻乾葛之類

○瘡濕者肌表間有濕氣也宜瀉濕藥白芷防風之類蓋風藥能勝濕也

○咽喉痛者如聖散鼠粘子湯

○喘滿氣壅者麻黃黃芩湯

○煩渴者甘草散烏梅湯

○下利嘔逆者木香理中湯

○顏色正者以前法平治則安將欲成就脚色淡者宜助血藥

用當歸川芎酒芍藥之類或加紅花以潤血色將成就之際脚色紫者屬熱用涼藥解其毒升麻葛根湯炒本連及連翹之類甚者必用犀角蓋犀角大解痘毒

○將壓時金白色如豆殼者蓋因初起時飲水多其壓不齊名曰倒壓不好宜服實表之藥及消息大小便何如太便秘宜利太便小便秘宜利小便如小便之赤澀者大連翹湯甘露飲大便秘結內煩外熱者小柴胡湯加枳殼最穩當或小便服四順清涼飲子

○夫瘡疹用藥固有權度大小二便不可不通其大便看所下黃黑色其毒氣已盛不可多與熱劑但小用化毒湯可也或不用亦可若大小二便一有秘結則腸胃壅遏脉結氣滯毒氣無從發泄目閉聲啞肌肉黧黑不旋踵而變矣陷入者加味四聖散更以胡蔓酒薄付其身厚付其足順其

床帳衣被併以厚綿衣蓋之若未起獨聖散入木香煎服
若其瘡已黑乃可用宣風散加青皮錢氏云黑陷青紫者
百祥丸下之不黑者慎勿下余知其所下者瀉膀胱之邪
也又云下後身熱氣溫欲飲水者可治水穀不消或寒戰
者為進涂知其脾強者土可以制水也百祥丸恐太峻當
以宣風散代之瀉後溫脾則用人參茯苓白朮等分厚朴
木香甘草各減半為妙蓋瘡發肌肉陽明主之脾土一溫
胃氣隨暢獨不可消勝已泄之腎水乎此錢氏不刊之秘
典也

○其懷瘡者一曰內虛泄瀉二曰外傷風寒三曰變黑歸腎

○近時治痘瘡者悉宗陳文中木香散異功散殊不知彼立方

之時必運氣在寒水司天之令及值嚴冬大寒為因氣鬱

遏痘瘡不得起發紅綻故用辛熱之劑發之其宜也今人

不分時令寒熱二藥施治誤人多矣或有雖值溫熱之時山野農家貧賤之人其或偶中一二不可以為常法也

○愚按陳氏木香散異功散二方乃素問從治之法又謂之熱因熱用者也蓋痘瘡熱毒拂鬱于內而不得起發故用丁附木香桂心荳蔻等辛散却鬱之劑一二服却而開之使鄉之鬱于內者盡因藥氣而發越乎外故痘子陷伏灰白色者皆翳然紅活凸綻而內無遺邪矣切勿過劑如一二服後却不起者亦不可多與多則反助其毒轉增黑爛咽閉聲沉而死近世儒醫悉引內經病機諸痛痒瘡瘍皆屬心火之語以正陳氏之失此知常而不知權之論也故使後學孤疑不決當用而不敢用是以袖手待斃哀哉

○痘瘡初發時五藏形証一

面及腮頰赤噴嚏

屬肺

呵欠頓悶

屬肝

時發驚悸屬心

○痘瘡五藏形色二

肝藏發水疱色微青以液為淡故

肺藏發膿疱色多白以液為淡故

脾藏發疹或如糖狀其形小如斑

心藏發斑其形小如斑

腎藏居下獨不受穢毒故無候但耳尻冷耳者痘瘡里陷

耳及尻反熱者為逆

○斑痘所發之源三

夫嬰兒之胚胚腫也必資胎養以長其形焉緣胎失節慎

縱欲恣食感其穢毒之氣藏之藏府近自孩提遠至童非

值寒暄不常之候瘡疹由是而發因其所受淺深而為稀

稠焉其原實係於心云云相火之氣所為故入於肺則成

膿胞俗名碗蓋亦名麻蓋以相火乘金故破肌也入于肝

糖本作糠

則成水疹俗名癰瘡入于脾則成癰疹入于心則成斑以
火處于子母之分不傷皮毛彰君之德也或云瘡發掀腫
於外者屬少陽三焦火也謂之斑色小紅而行于皮膚中
出者屬少陰君火也謂之疹楊氏曰痘瘡發於肌肉陽明
胃氣主之脾土下溫胃氣隨腸土可勝水決無陷伏之患
辨內外因四

○凡瘡欲出而未出因發搐者是外感風寒之邪而內發心熱
也宜王氏惺惺散或升麻葛根湯木香參蘇飲○凡瘡欲
出未出而吐利者是中焦停寒或夾宿食也宜四君子湯
加砂仁陳皮或和中散如夾宿食者用紫霜丸

○王氏惺惺散

白朮炒

桔梗去芦

細辛

人參

茯苓

甘草

括萎根各三分

○升麻葛根湯
右細切作二服入薄荷葉三片水一盞煎七分時時與之

葛根 升麻 芍藥 甘草炙各半

右細切作一服水一盞煎七分溫服無時

○木香參蘇飲
木香半一分 半夏四分

人參三分 蘇葉 桔梗 乾葛

前胡各四分 陳皮 茯苓各五分 枳殼炒三分半

右細切作二服加生姜三片水一盞煎七分溫服

○四君子湯

人參 白朮 茯苓各一錢 甘草五分

右細切水一盞煎六分食前溫服加宿砂陳皮名六君子湯

○和中散

厚朴姜汁制一錢 白朮五分 乾姜炮 甘草炙各二分

右細切作一服加生薑一片水一盞煎六分溫服

○紫霜丸

杏仁去尖煅赤石脂另研巴豆三枚代赭石煅碎
右各另研為末和勻湯浸蒸餅為丸如黍米大二歲以下
兒二三九八歲以上十數丸食前米飲或乳汁送下

○辨形氣病五

如瘡已出而聲不變者形病也瘡未出而聲變者氣病也
宜補肺散加生黃芪○瘡出而聲不出者形氣俱病也形
病身溫者宜解毒防風湯大便閉者宜當歸丸○形氣俱
病小兒稟賦素弱者宜預服十奇散倍歸芪少木香煎服

○補肺散

阿膠炒錢半牛旁子炒三馬兜鈴五分甘草二分半
杏仁三粒去糯米一錢炒加生黃芪五分

十奇散之聖水余見
之如何不備 抄云

○鮮毒防風湯

防風去芦一錢

地骨皮

生黃芪

芍藥

荆芥穗

單粘子炒各五分

右細切作三

服水煎或為細末溫水調服亦可モ

○當歸丸

當歸半兩

黃連炒一錢半

大黃二錢半

甘草一兩炙

右先以當歸熬成膏以下三味研為細末以膏和為丸如胡椒大三歲以下兒十九七八歲兒二十九食前清水飲下漸加至以利為度

○十奇散即托裏十補散又名十宣散出和劑方

黃芪

人參

當歸各二錢厚朴姜製

桔梗去芦一錢

各桂心三分

川芎

防風去芦

甘草

白芷 各一錢

右為細末每服一錢或二錢溫酒調下細切水煎亦可

○辯三陰三陽經候

太陽病寒身熱小便赤澀出不快宜荊芥甘草防風湯少

陽病乍寒乍熱出不快宜連翹防風湯

陽明病身熱目赤大便閉實瘡遍肌肉出不快宜升麻葛

根湯加紫草

太陰病自利四肢逆冷宜附子理中湯木香散

少陰瘡瘡黑陷口舌燥宜四物湯加紫草紅花

厥陰病舌卷卵縮時發厥逆宜異功散

三陰病法當救裏故宜以溫劑助之

○荊芥甘草防風湯

荊芥

薄荷

牛蒡子

防風

甘草 炙各六分

右細切作一服水一盞煎六分溫服之

○連翹防風湯

連翹

防風

瞿麥

荊芥穗

木通

車前子

當歸

柴胡

赤芍藥

白滑石

蟬蛻

黃芩

紫草茸各二甘草

時氣

右細切作三服水一盞煎七分隨病大小量數輕重與之

大小便自利者不宜用

○升麻葛根湯 方見前條

每服加粳米五十粒紫草五錢煎之

○又一方升麻湯治斑在內

升麻一錢

犀角

射干

黃芩 酒浸焙乾

人參

甘草 各五分

○理中湯
右細切作一服水一盞煎六分食前溫服

人參

甘草炙

白朮

乾姜 炮各八分

右細切作一服加泡附子三分甚者五分量兒大小加減
水煎食前服

○木香散

木香

大腹皮 酒洗 人參

桂心

青皮

赤茯苓

前胡

柯子 燻去核

半夏 姜製

丁香

甘草 各三分

右細切作一服加生薑二片棗一枚水煎量大小加減分
數與之

○異功散

木香

當歸

酒洗去芦

桂心

白朮

楚炒

陳皮

厚朴

姜製

人參

肉果

麩裏罌

半夏

湯泡七次

附子

泡

茯苓

丁香

各三分

右細切

作一服加生薑二片大棗一枚水煎服

○辯

三陽証治

凡痘疹春夏為順當純陽之時也古人治法與傷寒同

七

足胫熱

兩腮紅

大便秘

小便澀

渴不止

上氣急

脉洪數

已上七証不宜服

熱藥

便

布

瘡疹一發有密如蚕種者或如糠粃者合清表宜連翹升麻湯或未出而先發搖是熱外感風寒之邪宜茶湯下解毒丸及犀角地黄湯瘡出不快清便自調知其表當微發散升麻葛根湯若瘡青乾黑陷身不大熱大小便澀滯是熱蓄於內宜煎大黃湯下宜風散若表太熱者不可下

黑陷甚者百祥丸○若瘡已發稠密微喘渴欲飲水宜微下之當歸丸及龍氏地黃膏外以黃栢膏塗之固佳

值盛夏暑熱正熾適瘡大發煩渴大便實者宜玉露散及甘露飲子或昏冒不知人時作搐搦瘡倒壓黑陷者宜猪

心龍腦膏

○連翹升麻湯即升麻葛根湯加連翹一分是也

○犀角地黃湯

犀角鎊

生地黄

牡丹皮

赤芍藥

各等分

右細切水煎服

○解毒丸

寒水石研

石膏研

各一兩青黛五錢

右以二石細研如粉入青黛和勻湯浸蒸餅為丸如茨實大每服一丸食後新汲水化下或細嚼姜水下亦可三歲

兒服半丸量歲數加減服之

○宣風散

換柳二枚

陳皮

甘草

各半兩

黑丑

各四兩取頭

右為末量兒大小以蜜湯調服

○百祥丸

紅牙大戟

不拘多少陰乾漿水煮極乾去骨日中曝乾復納汁中煮汁乾為細末

右一味以湯浸蒸餅為丸如粟米大每服三十九丸研赤芝麻湯下量兒大小加減丸數與之

○龐氏地黃膏

生地黃

四兩

豇豉

半升

雄黃

一錢

射香

五分

右以猪膏一斤和勻露一宿煎五六沸令三分去二絞去下雄黃射香攪均稍稍飲之毒從皮膚中出即愈

○黃栢膏

黃栢

皮一兩去酒炒

景豈

去一兩

甘草

四兩

右為細末以生芝麻油調從耳前至眼眦並厚塗之日三二次如用早能令瘡不至面縱有亦稀少

○玉露散

古見前吐瀉門

王海截云非腎熱相火盛者不宜服此藥利北方

○甘露飲子

生地黃

熟地黃

並用酒浸 天門冬

麥門冬

枇杷葉

去毛

枳殼

炒黃

黃芩

石斛

去苳子

山茵陳

甘草

右細切作一服水一盞煎六分食後溫服

○猪心龍腦膏

梅花腦子

一字研

右取新宰猪心血一箇為丸如芡實大每服一丸或半

丸量見大小與之紫蘇湯下或井花水化下亦可

○辯三陰証治凡瘡發於秋冬為逆當先陰之時也

足脛冷 腹虛脹 面眇白

嘔乳食 目睛青 脉沉微 已上七証不宜服

寒藥

瘡瘡盛出四肢逆冷或自利係在太陰脾經宜急溫之用
異功散附子理中湯調中九○瘡瘡平塌灰白色不澤然
是正氣不足宜十補托裏散倍黃芪加熟附子○或四肢
厥逆時作搐搦係在厥陰宜溫之異功散加防風青皮或
和中散去乾葛藿香加附子肉桂心

○調中九

白朮半兩炒 人參五錢 甘草炙五錢 乾姜四錢

右為細末煉蜜為丸如黍豆大每服多不過二十九溫水

醫學正傳
卷之八
食前送下

辨形氣不足九

肺主氣氣不足則致後三証

自汗聲不出

瘡頂陷塌

不綻肥

並宜十奇散

自汗倍黃芪聲不出倍桔梗

心主血血不足則致後三証

灰白色

根窠不紅

不光澤

並宜芎歸湯加芍藥紫草紅花良驗

○芎歸湯

川歸

川芎

各二錢半

右細切水煎服

辨表裏虛實十

表裏俱實其瘡難出而易壓

表裏俱虛其瘡易出而難醫

諸痛為實

內快外痛為外實內虛
內痛外快為內實外虛

諸寒為痛

凡瘡發身痛不為外寒所折則肉腠厚密宜分
而治之若紅腫方見為寒所折而肉腠有熱宜

諸痒為虛

湯肉腠密者宜活血散併均氣散
補血氣不足多痒以証所謂諸痒為虛也宜十
宜四君子湯及木香散加丁香官桂胃主肌肉尤
能忌口因食毒物兒作痒者二物湯百花膏或
四君子湯加解毒藥

○消毒飲

牛旁子

三錢炒一名犀粘
子一名大力子

荊芥

錢

甘草

五分生用

防風

去芦五分

右細切作一服水煎

煎加生犀角尤妙

○葛根升麻加芍藥湯

升麻葛根湯
倍芍藥是也

○活血散

白芍藥

右為細末每服一錢溫水調下止痛用酒調尤驗玉海藏
云四肢出不快加防風一方用赤芍藥

○勻氣散即濟生方八味順氣散加木香也

白朮

白茯苓

青皮

白芷

陳皮

烏藥

人參

各半錢 甘草炙一分半

木香一分半

右細切作一服水一盞煎七分服或細末酒調亦可

○二物湯 蟬蛻洗淨二枚 甘草炙二兩

右為末水煎時上服之

○百花膏

石蜜不拘多少 用湯和時上以錫餅刷之瘡亦易落

○平治諸方以平為期萬天一

石壁胡氏曰小兒難任非常之熱亦不可任非常之冷如
熱藥太過輕則吐利腹脹重則陷伏倒靨是宜溫涼適中
可也仁齋楊氏曰諸熱不可驟去宜輕解之蓋痘瘡無熱
則不能起發史氏曰比之種痘值天時暄暖則易生
○凡值天時不正鄉隣痘瘡盛發宜服禁方不出方

三痘湯

油飲子

鳳龍膏

○凡初覺痘瘡欲發當先解利與傷寒相類疑似之間兼用解
表胡氏云非微汗則表不解解表當於紅斑未見之時宜
用

王氏惺惺散

錢氏惺惺散

張氏防風湯

升麻葛根湯

張氏四物解肌湯

參蘇飲

○三痘湯

赤豆

大黑豆

豇豆各一升甘草三兩

又以三豆淘淨用冰八升煮豆熟為糜逐食空心任意飲
豆汁七日永不出

○油飲子

真麻油一升 逐日飲盡永不

已上三方出扁鵲倉公方

○鳳龍膏

烏雞卵一個地龍一條活者細小者

右以雞卵開一小竅入地龍在內夾皮紙糊其竅飯鍋上
蒸熟去地龍與兒食之每歲立春日食一枚終身不出痘
瘡覺隣里有此証流行時食一二枚亦好

○錢氏惺惺散

方見前條與王氏同但方有防風川芎減半

○解毒防風湯

方見前

○四物解肌湯

白芍藥

茯苓

枳殼

葛根

各七分

右細切作一服水一盞煎六分溫服不拘時

瘡出不快十二

○活血散加防風湯右方

○龐氏紅花湯

紅花子一合

右以水半升煎百沸服之

○紫草湯治瘡出不快及大便自利紫草湯

紫草

木香

茯苓

白木

各一合

甘草五分

右細切作一服入糯米一百粒水一盞煎六分食前服

○四聖散

紫草

木通

各一合甘草

枳殼

各五分炒黃色

右細切作一服水一盞煎七分溫服不拘時

○樺皮飲子

樺木皮二兩用水一升煮取半升時時細飲

○凡痘瘡出不快者有五症臨病審覈調之

一證天時嚴寒為寒所折不能起發宜散寒溫表冬三月寒甚

紅班初見宜五積散正氣散參蘇飲楊氏調解散陳氏木

香散

○五積散

白芷 川芎 各三 桔梗 法華一芍藥 茯苓

甘草 炙 川歸 各二 肉桂 去粗皮半夏 各二 陳皮 去白

枳殼 去穢 炒 麻黃 節 去根 蒼朮 米泔浸乾姜 炮 厚朴 姜制 各

右除肉桂枳殼二味另為粗末外一十三味細切慢火炒

令轉色攤冷次入三三味末令均作一服水一盞半入生姜

三片煎至一盞去粗稍熱服

○正氣散

甘草炙三分

陳皮

藿香

去梗

白朮各五分

厚朴

姜製

半夏

姜製各錢半

右細切作一服

加生姜三片大棗一枚水煎服

○調解散

青皮

陳皮

枳殼

麩炒

桔梗

去芦炒

人參

半夏

泡七次

川芎

木通

乾葛各四分

紫蘇各二分

右細切作一服加生姜三片大棗一枚水煎服一方加紫

草糯米

一証炎暑隆盛煩渴昏迷瘡出不快宜辰砂五苓散煎生地

黃麥門冬調服身熱甚者小柴胡加生地黄煩渴而便實

者白虎加人參湯輕者人參竹葉湯加生地黄煎服

○辰砂五苓散

五苓散加辰砂細研為末是也

○小柴胡湯

○人參白虎湯

○人參竹葉湯方俱在傷寒門

一証服涼藥損傷脾胃或胃虛吐利當溫中益氣宜理中湯吐

利甚者加附子或陳氏異功散木香荳蔻丸

○肉荳蔻丸

木香

砂仁

白龍骨

訶子肉各五錢

赤石脂

枯白礬各七

肉荳蔻

五錢溫麩裏煨熟

右為細牙麩糊為丸如黍米大每服三十丸至五十丸煎

異功散送下

○一證或成血痢

一半尚是紅點以毒氣發越不透必不能食

大便如常者宜半溫裏半助養之劑用四聖散加減及紫

草木香湯絲瓜湯阮氏萬全散湯氏安斑湯

○四聖散○紫草木香湯方並見前

○絲瓜湯

絲瓜 不拘幾箇

右連皮子煨存性為末每服一抄時時用米湯調服此物發痘瘡最妙或以紫草甘草煎湯調服尤佳

○阮氏萬全散治痘瘡出不紅潤

防風 人參

蟬蛻 各等分

右細切每服四錢水一盞入薄荷三葉煎六分溫服熱而

實者加升麻

○湯氏安斑湯

一証外實之人皮膚厚肉腠密毒氣難以發泄因出不快宜消
毒飲透肌散如大便秘實於消毒飲內加大黃枳子仁煎
服瘡出太稠宜澤角地黄湯張氏解毒防風湯血氣不足
宜十奇散咽嗑不利宜如聖湯加薄荷枳殼口中氣熱咽
痛口舌生瘡宜甘露飲子驚風搐搦宜抱龍丸煩渴宜獨
參湯黃芪六一湯

○透肌散

紫草茸

綠升麻

粉甘草各一錢

右細切水煎服或與消毒飲同煎服尤妙

○如聖湯

桔梗二錢

甘草一錢

一方加牛旁子

麥門冬錢二

右細切水煎時時服之

○抱龍丸 見驚風門

辯外証逆順十二

身熱溫煖者順

能食大便實者順

寒涼者逆

不能食大便利者逆

辯外証輕重十四

輕者耳作三次出

重者耳中無治

大小不一

根窠紅活

頭面稀少

肥滿光澤

辯痘瘡初末形證十五

微者其邪在腑發為細疹狀如蚊蛭所螫點點赤色俗名

麤瘡○甚者其邪在藏為痘瘡狀如豌豆根赤頭白色出

膿水俗名疱瘡二三日始見微微欲出如粟如黍或如菜

莖或如水珠光澤明淨者佳四日太小不等根窠紅光澤

者輕如稠密陷頂併瀉者重六日七日瘡形肥紅光澤者

輕如身熱氣喘口乾腹脹足指冷者重八日九日長足紅

辯不藥而愈十六

滿瘡蠟色者輕如寒戰悶亂腹脹煩渴氣急咬牙者重之至也十日十一日瘡當結靨如欲落之時將愈十二十三日當壓而不靨者為逆身稍利之以防其餘毒身不壯熱或腹脹或瀉渴用十二味異功散救之

痘脚稀疎

根窠紅綻

不瀉不渴

乳食不減

四肢溫和

身無太熱

已上六証並不須服藥惟宜善加調護須使房室溫密諸穢氣忌見外人毋犯房色及往來婦人月水併腋臭者皆不可近帷宜燒大黃蒼朮以辟惡氣勿宜燒沉檀降真乳香腦射帷帳之內宜懸胡荽或以胡荽漬酒噴床帳併燒木香為佳夫痘瘡之毒最怕穢惡之氣觸犯切不可信僧道看經解穢况無纖毫之力而反恐被其穢惡之氣觸

犯亦不可恃其能解而不預防戒之戒之

辯五不治証十七

痒塌寒戰咬牙渴不止

灰白色陷頂腹脹

氣促泄瀉渴

辯疹有陰陽二証十八

赤疹屬陽遇清涼而消

傷寒時氣發斑附十九

溫毒發斑宜玄參升麻湯重用荊防敗毒散

胃爛斑因陽明胃實失下或下之太早所致宜化斑湯龐氏石

膏湯○時氣斑宜石膏湯○陽毒斑胃實之人誤服熱劑

或加以風暑宜陽毒升麻湯

○玄參升麻湯

痘紫黑色喘喝不寧
頭溫足冷悶亂飲水

白疹屬陰遇溫煖而滅

玄參洗去

升麻

甘草各一錢半

○荆防敗毒散

柴胡

甘草

人參

桔梗

川芎

茯苓

枳殼

前胡

羌活

獨活

荆芥穗

防風各四分

右細切刀作三一服

水一盞煎七分溫服或加薄荷五葉

○化斑湯

即白虎湯加玄參也

○龐氏石膏湯

香豉一合

葱白五錢

石膏一兩

梔子一錢

生薑五錢

大青

升麻

芒硝各一錢半

右細切刀作二一服

水升半煮取七合去粗下芒硝放溫徐徐服之

○陽毒升麻湯

升麻

犀角 鎔

射干

黃芩

人參

甘草 各一錢

右細切作二服水一盞半煎至一盞食前溫服
辯瘡後餘毒二十

一毒氣流於陰陽脾經則癰發四肢手腕併膝臍腫痛宜
消毒飲重者十六味流氣飲加附子或酒浸大黃煎服及
必勝膏規子水等付之

○消毒飲

方見前

○十六味流氣飲

川芎

川歸

芍藥

防風

人參

木香

黃芪

桂心

桔梗

白芷

枳殼

厚朴

烏藥

甘草

紫蘇

枳殼

各四分

右細切作一服水一盞煎七分服氣血虛而自利者加熟附子大便實加大黃

○必勝膏

馬齒莧 杵汁 猪膏脂 石蜜

右以三味共熬為膏塗腫處

○蜆子水

蜆子不拘多少活者以水養五日旋取此水洗手面漸生肉無痕迹

毒氣留于太陰肺經則癰內併手腕腫流為赤癰毒宜消

毒飲如聖湯五福化毒丹雄黃鮮毒丸鮮之氣血虛者干

補湯加桔梗枳殼犀角煎服咽喉不利或腫痛宜薄荷如

聖湯

○五福化毒丹方見驚風門

每兩分作十二丸一歲兒一丸分作四服用薄荷水化下

瘡餘毒上攻口齒涎血臭氣以生地黄自然汁化一九用

翎刷入口內

○如聖湯方見前

○雄黃解毒湯

鬱金

雄黃研 巴豆去皮膜油

右為細末醋煮麪糊為丸如菰荳大每服二三丸熱茶清下量兒大小與之

一毒氣流入大腸則便膿血或下腸垢或大便秘結宜犀角地黃湯身煩熱渴宜黃連解毒湯熱熱盛者小承氣湯下利者黃連解毒湯黃連阿膠丸駐車丸

○黃連阿膠丸

黃連二兩

阿膠炒成珠

右以黃連茯苓同為細末水調阿膠末搜和為丸如梧桐

子大每服二十九溫米飲送下

○駐車丸

阿膠醃者當歸去各十五兩黃連三十兩乾姜泡十兩

右為末以阿膠和成餅丸如梧桐子大每服二十九食前清米飲下日三服小兒丸如麻子大量見大小加減

一痘瘡入眼宜決明散密蒙花散撥雲散蛤粉散

○決明散

草決明

赤芍藥

天花粉

甘草

右各等分為細末每服五分七食後茶清調下

○密蒙花散

密蒙花

青箱子

決明子

車前子

右各等分為細末用羊肝一片破而為三摻藥入肝內合均却仍舊合而為二以酒水溫紙七重包裹於燭灰中煨

熟勿令焦焙乾研末入射香少許每服二錢重食後米飲調下

○撥雲散

羌活

防風

柴胡

甘草各等分

右為細末每服二錢水一盞煎七分食後卧服薄荷汁茶清或菊花苗煎湯調皆可忌藏鹽鮓醬濕麪炙煨炊氣及一切發風動火之物

○蛤粉散

穀精草

海蛤粉各等分

二兩

節葉本
作竹葉

右為細末每服二錢七用獺猪肝許以竹刀批開搽藥在內捲了外以青箭箬包裏麻線扎縛定用水一碗煮令熟

入小口瓶內薰服候溫取食之日一服不過十服遂退一熱毒流於三陽之後經則腮項結核腫痛宜荆防敗毒散

十補湯減桂服消毒飲倍加忍冬藤煎服

○荊防敗毒散

十補托裏散

即十奇散也消毒飲方並見前

○祖傳經驗秘方凡痘後不問癰毒發於何經初起紅腫時却用黑葦赤三豆以酸醋浸研漿時時以鵝翎刷之隨手退去其効如神

一小兒痘後二十日不大便其糞燥作痛垂死曾用大黃芒硝枳殼巴豆等藥及用蜜導法及服香油一碗許俱不通愚令一婢以真麻油含口內用小竹筒一筒納穀道中吹油入腸內須臾即通真良法也

古人拯治痘瘡要法二十一

王氏指迷云痘瘡亦時氣之一端一人受正傳染其餘又云瘡疹有熱則易出一出遍及於肌膚○張氏渙曰痘子

氣均則出快蓋血隨氣行氣逆則血滯○王氏疹者脾所
生脾虛肝旺乘之木能勝土熱動心神而生驚○錢氏曰
肝風心火二藏交爭而致搐又曰痘症未形而先搐大忌
涼心蓋瘡屬心心主血心寒則血不能行痘欲出而不可
得也切須慎之太抵治驚推乎肝利小便均氣最妙仁齋
楊氏曰大熱當利小便宜五苓散導赤散小熱當解毒宜
消毒飲四聖散

○陷伏倒靨黑陷

一証變壞歸腎黑陷宜錢氏百祥丸宣風散

一証外感風寒所致冬時宜五積散減麻黃加桂心紫草春
時不換金正氣散加川芎白芷防風或風和所襲宜消風
散加紫草蕪服

一証乳食所傷內氣壅遏宜楊氏調解散或四君子湯加縮

砂木香川芎紫草大便自利宜附子埋中湯

一証或因父母不謹犯房事月水及乳母腋氣穢濁諸忤所致宜阮氏辟穢丹焚而薰之仍以胡荽酒與樟帳及懸胡荽於床帳中甚者以胡荽湯洗下蘇合香丸薰塗薰亦妙聖製再甦散神効

一証毒氣入裏黑陷宜猪尾膏神驗

○不換金正氣散

厚朴姜製 藿香去梗 甘草 半夏湯泡七次去皮

蒼朮米泔浸 陳皮各五分

右細切作二服加生薑三片棗二枚水一盞煎七分服

○辟穢丹

蒼朮 北細辛 其松 川芎

乳香另研 降真香

右為細末烈火焚之 今世俗例以黃茶燒烟薰之最好

○再甦散治痘瘡觸犯毒氣入內

明白礬

地龍去土炒各一兩

右為末每服五分用猪尾血一椀斗許用新汲水少許調下不拘時

○猪尾膏即前龍腦膏錢氏用小猪尾取血研用之

凡痘瘡膿汁不乾蓋瘡出太盛表虛難靨以致膿水粘衣著席濕痛不能轉側宜白龍散敗草散等附之

○白龍散

黃牛糞日乾火煨成灰取心中白者為末帛裹撲之

○敗草散

用蓋屋及牆背上遠年腐草洗淨焙乾為細末帛裹撲之鋪床蓆上佳

○馮氏天花散治痘後失音

天花粉

石膏

甘草各等分

桔梗

白茯苓 去皮

訶子肉

右為末用永調半匙在碗內外以小竹七葉黃荆七條縛作一束點灰在碗內煎臨卧服

凡孕婦身發痘瘡宜馮氏單胎散若胎動不安宜獨聖散安胎飲身熱甚宜木香參蘇飲或瘡稠密宜十奇散倍加藥當歸減桂加香附為藥如胎已五月則半夏桂心之屬俱不必禁

○單胎散

赤茯苓

白朮

川歸

白芍

赤芍

北柴胡

乾葛

人參

桔梗

條芩

防風

陳皮

荊芥

枳殼

紫草

阿膠

糯米

白芷

甘草

川芎

縮砂

大熱加鬱金各三分

右細切作一服水一盞半煎至一盞乾蒜蒂七箇野苧根
七寸甜瓜蒂一箇用銀器煎以荷葉蓋定熬至八分去粗
仍用荷葉蓋覆空心溫服

○獨聖散用連殼縮砂慢火炒去殼為末每服半匙熱酒調下

胎動則服服後覺胎熱則安矣

○安胎散

大腹皮酒洗極淨焙乾

人參

陳皮

白朮

白芍

川歸

川芎

香附米薑便砂仁

紫蘇

茯苓

甘草各五分

右細切作一服水一盞半燈草七莖糯米一撮煎一盞食
前溫服

滑洲翁先生跋云凡乳嬰之與童非當岐為兩途以治之乳嬰
當兼治乳母俾其氣血清和飲食有節投以調氣通榮之劑
以釀其乳使兒飲之則其瘡心肥滿光澤無陷伏之憂童非
之子必當脩切其脉審其表裏虛實以汗下之苟不實不虛
則但保其冲和使脾氣流暢則肺金藉母之助易於灌膿速
於成痂無倒塌之患或至壯盛而膚腠厚密尤須預為汗解
或太便結與溲澀者尤宜下之利之庶無患也餘証則當於
藥內倍其分兩百無一失學者宜致思焉

萬曆丁丑冬月金陵吳松亭繡梓

小兒痘胎

出苗大

要賢有妙

世麻方集

葛根甘草

活香陳皮

小兒痘出

要不快痘

平自利

也人者妙

白木茯苓

醫學正傳後再叙

天有六氣曰陰曰陽曰風曰雨曰晦曰明淫則

為蓄有寒疾熱疾末疾腹疾惑疾心疾而人之

氣血流注有循有經有至有抵有會有過有行

有達而又有所謂三百六十有五之絲絡六百

四十有七之隧穴醫非淺於其學者之所能盡

其秘也今天下之言醫者衆矣安得有如至靈

默然陰陽之太少明決六脉二經之周流變化

木香
紫
○
自汗
出
頂
不
是
用
人
吉
富
防

者而興之論素問諸經方藥之宜攻補之功虛
實之變鍼灸之法耶蓋嘗思其人不可作矣以
醫名多以名醫名少也醫學正傳侍御東崖
公叔祖恒德老人所著也觀其書可以知其人
矣東崖即其書校之侍御枳田蔣公序之予喜
其書而閱之以為得其人矣閱之且久以為非
恒德老人所著也老人之志欲自附於名家之
後故其書集諸家之成而會之者也天下

桂心甘草
痘出下
白色根
不赤不紅
不赤澤
是六氣不足
當散川芎
芍藥紫葢
紅花金銀
痘出下
陷惡者
木通
枳殼

之事皆可以試其能而醫則有不可以
明者自裁農至今不知歷幾千百代及幾人之
手而其書始大行皆相祖述傳習增減異同殆
未有自售其能者故曰醫不三世不服其藥是
書也使其盡出於恒德老人之手則發揮出於
肯憶湯液特以已見予未敢以為盡然也惟其
參之諸家之秘而斷之以聰明之真則所以握
氣機佐陰陽疏脉絡者皆有所受而立言垂後

又方是痘
 出下板粟
 不紅白也
 十者三用
 白芍芍藥
 防風
 痘出後毒
 氣里
 身大不熱
 大小便通
 下
 大黃
 下
 下
 下

可與諸經並傳無疑也醫學正傳予固喜其孝
 之博而擇之精也學之博則有所據擇之精則
 有所見有所據則方藥必求其當有所見則攻
 療必速其功天下之病率不能出其範圍之內
 而世之習其書傳其方者未有不收十全之功
 矣則是書可以傳矣東崖屬予言予為之書其
 槩以質于今之醫之名者

嘉靖辛卯仲春之吉莆田史梧識

杉本

メ
リ

海

四

し
こ

八冊
五
廿四

